





O B E R T
—
D E
V E N E S E C T I O N




AUDOMARETTO












EPB/A

7419/A

Call 208







DE
VENÆ SECTIONE
IN PLEVITIDE,

PARÆNESIS SECUNDA;
*Contra paradoxam Fucciꝝ & Fer-
nelij doctrinam.*

SEV

Anacephalæsis omnium penè Controuersia-
rum, quæ Parænesis prima & pro ea scripta
Apologia atque Analysis contra D. Lud. du
Gardin Med. Professor. Duacens. contine-
bant, sicut & nouissimæ illius declamationes
quatuor.

ACCESSIT

De Venæ Sectione in Variolis administranda, contra
popularem errorem, assertio.

AUTHORE M. A. OBERT
Audomarensi Medico,



AVDOMARI,

Apud Viduam CAROLI BOSCARDI, sub signo
Nominis IESV. Anno 1635;

人 己 心 中 有 一 个 小 人

[Faint, illegible handwritten text]

1. 544p

75280 in 1952-54

ЯНОВА

7-243 + 084000112000 574

1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342

AMPLISSIMO

AC

REVERENDISSIMO DOMINO

D. PHILIPPO
GILLOCQ,

MONASTERII S. BERTINI

Abbati Religiosissimo,

Sacrae Theologiae Licentiato,

Archarum Comiti. Poperingarum
Toparchæ, &c.

*In submissi, ac devoti animi Testimonium,
debita gratitudinis Symbolum, perpetua
observantia Monumentum. D. O. C.*

M. A. OBERT.



ECTE', ut mihi quidem
videtur, Euripides

Αἱ δὲ ὑποκρίσεις πρὸς τὴν φύσιν ἀποκρίσεις: In Hippo

nam ferunt antiquitus frequenter

*

2

in

EPISTOLA

in sacrificijs à veteribus obserua-
tum, vt si cæsa priore hostia ritè
Dijs perlitatum non fuisset, sacra
repererent, secundâ victimâ lon-
gè meliora ominantes; Non ab-
simili ratione, R.^{mc} Præsul, me-
cum impræsentiarum agendum est,
nam cùm non ita pridem Paræ-
nesim primam præcipiti ac rudiori
calamo vulgassem, aduerti post-
modum in eâ multa scitu expli-
catuque necessaria à multis desi-
derari, nonnulla etiam concisè
dicta, pleraque indiscriminatim;
Quare secundam hanc practico
pulvere sordidus, maioris diluci-
dationis gratia, bonique publici
causa conscripsi, Vestroque no-
mini velut alteram victimam me-
lius ominatam litari æquum esse
duxi memor Homerici,

Odiss. 8.

Πάσης ὃ θεὸν χεῖρος ἀνδραγαγεί.

Cui-

DEDICATORIA.

Cuinam verò mortalium hosce ingenij mei foetus potiori iure sacrandos obtulerim, quam D. T. cuius perpetua beneuolentia in dies fouemur? Iam enim à viginti & amplius annis, à foelicis memoriae prædecessore tuo Loemelio Celeberrimi Monasterij, cui modò præses, Abbate integerrimo in Medicū assūptus sum, atque ab eo tēpore cōmissam sic peregi curam, vt D. T. religiosorumque omnium fauores varios supra meritū sæpius expertus sim; Quibus, vt aliquatenus respondere valeam, nullum gratitudinis promptius occurrit argumentum, quam hæc opellæ meæ appensa tessera, in qua præter bonum commune Reipub. spectro nihil; In eo sanè, R.^{mc} Præsul, ardentissimum tuum studium æmulatus, quo in publicam vtilita-

EPISTOLA

rem omni cura, virtute, auctoritate fortiter incumbis. Hinc fit, ut Te huius Sanctomariae Urbis, cuius muros B Fulco etiam Cœnobij vestri Abbas olim condidit, egentiores veluti stellam alteram polarem clarissimo fulgore coruscantem, & liberali ac quotidiana liberalitatis influenza miseros recreantem publica voce deprædicent; nempe prædecessorum tuorum vestigijs constanter insistis, qui & Pietatis & Iustitiæ summi cultores Dei beneficia cumulatissimè in suos subditos congeslerunt. Verùm hæc decora cum Maioribus Tuis utcumque sunt communia, maiora cerno & noua, tibi que singularia. Atque in primis Viros appello cuiuscumque ordinis & instituti religiosos, quos tanto hæctenus, tamque constanti affectu

DEDICATORIA.

fecta profecutus es vbivis locorum, vt Te inter primarios patronos iure meritissimo numerent; Nominatim verò D. Francisci familia statim ab inauguratione tua Poperingas euocata, ibique peridoneo stabilita Domicilio eximium tuum Pietatis ac Religionis ardorem commendat; Quid referam quantis impensis sacram Ignatianam molem in cœlum erexeris? vt castissimum D. Bertini Templum marmoreum reddideris? ornamentis pretiosissimis illustraueris? maiorem aram auro argentoque locupletâris? Monasterij claustra peristylijs elegantibus auxeris? Magna sunt illa & talibus operibus Heroas estimari gloriosum est; vereor tamen ne dum his lucem adferre studeo, tenebras potius calami mei nebulis offudisse

EPISTOLA


videar. Venio nunc ad alteramque potiore causam, quæ scripti-
onem hanc meam ad Te iubet
excurrere, scilicet magnum au-
thoritatis ac eruditionis tuæ pon-
dus; Siquidem hisce velut firmis-
simis duobus propugnaculis arma-
tus in arenam liberrimè descen-
dam; Eruditionis quidem tuæ mu-
nimine, quia cum litteratis ar-
duum mihi est negotium: autho-
ritatis autem præsidio, quia cum
maleuolis mihi dissidium.

Neque enim ignoro quam ple-
num alicuius opus suscipiam, in quo
noui quid introducere dum vide-
bor, plurima mihi sustinenda erunt
quæ debacchari in me volēt à qui-
bus nouitatis insimulabor. Vides
igitur, R.^{me} Præsul, quam meritò
ad declinanda obtrektorū scom-
mata in Protectionis tuæ asylum
inuo-


DEDICATORIA.

inuolem: Quare si qua humanitate, si qua beneuolentia cordatos viros & litteratos omnes amplecteris, me, licet illorum infimum, fauentibus oculis intueri, atque hunc meum qualemcumque factum, quem candidissimo pectore Nomini Tuo velut tutelari Angelo venerabundus inscribo, benignissimo tuo, quo soles, affectu æternum fove, ac tuere.

Andomaropoli è Musæclo nostro
15. Aprilis 1635.



In



In Parænesim secundam Doctissi-
mi Expertissimique Domini,
D. ANTONII OBERT,
Audomarensis Medici.

D*Um venam vacuas geminum tundenda
lacerans,
Euacuas quidquid sanguine pleura dolet;
Dum vacuant alij directâ parte secantes,
Vulnus alunt venis, pleuraque lesa manet.
Perge age, Oberte, feri latus hoc modo, vel
latus illud,
Turma licet dictis Ferneliana fremat:
Clamet Gardinus, varioque Academicus ore,
Clamet Apollinei liuida turba chori;
Sola morata suos flebit Libitina clientes,
Dum melius ciues Vrbs benè sana colet;
Quin modo Obertinus fiet meliore palestra,
Qui prius in fatum Fernelianus erat.
Si sapias, ô Medice, hac palinodia dicta placebit,
Despici, hunc quisquis sic sapuisse negat.*

Accinebat D. IOANNES DE FLANDRES
Monasterij Sancti. Bertini Religiosus
& Oeconomus.

LECTORI BENEVOLO. S.

N non meritò tibi dolendum videtur, medice lector, hoc sæculo cum Celso, Galeno, ne dicam Hippocrate longè inferiores floreat medicum, medicinam tot erroribus popularibus laborare? Quippe & indignum prorsus & detestandum sit, Agyrtas & personatos medicos, quibus audacter mètiri & splendidè vestiri volupè est & incautam plebem decipere, in pretio haberi, dum interim veri probatissimi- que medici, qui imperium sibi cum dignitate retinent, sæpè contemnuntur. Quorum causam dum perquiro, tanti mali tantique contagij fructus & seminia vt plurimum Gallis scriptoribus adscribenda esse comperi: Horum enim plurimi dum ingenij ruditate, vel laboris impatienria Reipub. med. nil noui addere possunt, quod præclaris & in arte Apollinea exercitatis viris probetur, studentque nihilominus corticarij Doctores, quid aureæ barbæ condecorum producere, & apud imperitam multitudinem, cuius marsupio cautè insidiantur, excellentis medici nomen, quo plura emungant, obtinere, quamplurima medicorum volumina vernacula reddiderunt, & neruose scripta in immensam garrulitatem auxerunt, atque vt sua esse putentur turpi mangonio deformarunt: Quod scribendi cacoëthes sacram
Theo-

LECTORI BENEVOLO, S.

Theologiam cerdonum & lixarum iudicio sic etiam prostituit, vt tot animarum mortes per hæreticos, quot corporum interneciones per pseudomedicos patratæ sint. Nouissimè Heluo ille Paracelsus vernaculis scriptis totam Germaniam, & huic vicinas prouincias eiusmodi bullatis medicastris & nebulonibus impleuit, dumque se medicinæ nouæ monarchiam gloriatur, antiquam & Galenicam se euersurum profitetur, bona quæ habet pauca ab Hippocrate, tria illa chymica principia à Ioanne Valentino & Isaac, de Gradationibus librum ab Arnolfo & Lullio, de Arcanis à Rupescissa, Synonyma ab Arlando, varia à Tritemio, Chyrurgiam à Lanfranco surripuit, quæ omnia, suis maledictis, contumelijs, magicis, superstitiosis & horrendis in Deum blasphemijs conspersit. Quis credat Ludouici mercatii Hispani animam admiranda metempsychosi in Laurentium Gallum foeliciter transmigrasse: ni doceret Gallus Riolanus? & reuera F. Vallesij etiam Hispani ingenium gallicam metamorphosim ab eodem passus est. Quot Galili Vesalij anatomem suam furto fecerunt & ex æquo erroris falsò insinularunt? At verò quid his annis nouissimis inutilius facere potuit *Abraham Framboisere*, quid nocentius quam, quæ compilauit, paraphrasi Gallica vulgare? Cum enim Typographus qui latinè excuderat lucro sperato fraudaretur, quod ab artibus peritis tales rapsodix non emerentur, & à Professoribus Parisiensibus in cathedris floccifuerent,

Ansbrop.
Lib. 1.

LECTORI BENEVOLO. 5.

ferent, vernacula reddidit, ut quæ medicis
 non placebant, Agyrtarum, barbitonorum, at-
 que myropolarum manibus coempta tere-
 rentur: Similis ferè calamitoso Luciani, qui *Luci. in*
 truncatis frigore pedibus, appositos ligneos, in- *indeb.*
 muratis foccis vestiebat, iisque subinde renou-
 nis aliorum humeris innixus infelicitatem suam
 gloriosè solabatur: Porro & qui aulici fieri
 non possunt se citharedos etiam fieri glorian-
 tur. Enimvero dum lectoribus & epistola ad
 D. le Maître ambrosiam se quandam Chy-
 micam edoctrum pollicetur & Paracelsum
 malæ fidei Agyrtam deprædicat, eo ipso se a-
 gyrtam clarè profitetur: Dum ambrosiam il-
 lam venditans, qua Principes & Optimitates &
 delicatulae, mellitæque, nec non aulicæ Heroine
 titò, tutò & iucundè purgari vel minima quan-
 titate possint, fumos vendit; dum, inquam, om-
 nes ad se hac arte euocat & emungit, ipse sibi
 scientiæ suæ, veriùs dicam inscitæ arcanum
 recondens, quod agyrtarum proprium est, tur-
 piter imponit: nempe grana aliquot scamoniæ,
 guttæ gambæ aut huiusmodi hipercathartici,
 aut fortè metallici validioris & venenati tra-
 gematis, pastæ regiæ & similibus bellarijs &
 decipulis callidè immiscet. Quod autem hic
 & similes prætexunt Hippocratem & Gale-
 num vernaculè scripsisse, admittimus: tunc e-
 quidem typographiæ defectu, calamis laborio-
 sis hæc duntaxat in scholis aperiebantur; Porro
 pagina sacra sic scripta, germana facta infini-
 tos prostravit; Dum verò medicis regijs He-
 roardo

Epistola roardo & Magistro se sic sua gallicè vulgastice
ad Hero. scribit (malefacti conscius) vt, plurima latinè
 & *Mag.* interserendo, solummodò doctis vtilia esse possint,
 sint, omnibus pariter illudit, etenim vti scribitur

In pref. F. Vales. *medicus latino sermone cavere non*
cont. lib. possit sine magna turpitudine; græco nō sine tur-
 6. *pitudine solūm, sed ne quid sine magno ar-*

tis dispendio. Cum verò fitetur sibi doctora-
 tum incunt, clausum primò librum mox aper-
 tum oblatum vulgi docendi gratia, an non ip-
 se periurij arguendus est? qui contra Hipp. iur-
 iurandum quæ ὁρκισμένοις νόμῳ ἱσχυρό, ἀλλὰ
 ἔσθαι propalare debuit, Agyrtis, è myropo-
 lio & tonstrina doctoribus impudenter expo-
 suit, & impotentiam industrii laboris ostendit

In lege. Cur? quia inquit, Hipp. τὰ ἱερὰ ἔοντα πρὸς μα-
 ῖστον ἀνθρώποις δεινύσαι: βιβλικοὶ δὲ
 θίμω πρὶν ἢ τελεθῶσιν ὀργίσις ἐπισέως. Pre-
 11. *ter*

Lib. de clarè vt verè apud Cardanum Socrates, qui
Soc. stud. medicinam inquit, communicant populo mor-
 te digni sunt, nec simplici eorum enim facti
 periti medici acceperunt iudicem populum v-
 errare cum illis cogantur, aut si rectè agenda
 perdurare velint atque resistere, casus infeli-
 ces illis tribuantur: Ex quo maximè fonte er-
 rores populares pullularunt. Quæ mecum seriò

Anno reputans Parænesim in lucem edidi de Reuul-
 1613. *sione* in Pleuritide contra paradoxam Fucci-
 & Fernelij doctrinam; Deinde contra Gardi-
 num Duacensem Professore Parænesim im-
 pugnantem, apologias; periculosum enim cen-
 sui eos, qui cathedras occupant, discipulos pra-

LECTORI BENEVOLO. S.

ua hæresi imbuere, à qua postmodum non facile dimoueri possunt: Nam

Quo semel est imbuta recens seruat odor et Testa diu.

Verùm cum nec his sibi satisfieri putaret ille imò ignorantia notam inuri, Rursum in Doctorum Duacensium confesso, quatuor quodlibeticis declamationibus summa contentione non parænesim perstrinxit, sed paræneticum contumelijs lacerauit, eas declamationes iniuriarum & scommatum plaustra vulgavit, quibus ego dissimulatis (neque enim rationibus agentem calumnijs terri deet) noua ibi passim conspersa sophismata refutare æquum esse duxi, ne neophyti medici perniciosissima hæresi imbuti obuios quosque innocentem prosternerent. Cum autem in Morino nostro tractu popularis error inualuerit, variolis affectis venæ sectionem mortalem esse, errorem & illum celeri calamo etiam tetigi:

Neque miraberis, lector, si tot citationibus & authoritatibus te fatigo, quãdoquidẽ enim mihi cum academicis sit disputatio, quibus graue videtur à practicante medico suas conclusiones refutari aut in dubium reuocari, sic citationibus agere coactus sum productis verbotenus etiam Clarissimorum Professorum sententijs; Neque enim velim me huius doctrine inuentorem existimari, quo mihi gloriolam aucuper, ingenuò quippe profiteor eam doctrinam esse perantiquam, à multis sæculis receptam, à doctissimis quibusque receptam, & experientia quotidiana

diana confirmatam, contrariam autem nouam
& paradoxam à tramite veritatis deuiasse am-
bitione eorum, qui dogmatis nouitate apud ru-
diores aut quamplurimos famosi haberi vo-
luerunt: Dolendum sanè, quod scribit F. Vales.

Prof. in de cathedrarijs quibusdam *Nostro seculo cate-*
lib. 4. c. 5. nus gloria cupido processit à virtute seiuncta,
ut ambitiosè gloriam aucupemur succatis ver-
bis tyronibus imponentes. Vobis itaque candi-
dis medicine sectatoribus excutienda damus
Prof. in praeordia, non quibus quod ait Ant. Vales.
Holl. intonsa sit velut Aesculapio barba,

Quibusque retortum
Paonium in morem senior sit forma Capillo,
qui terendo calceos potitis quam mentem ex-
ercendo, medici syngraphistæ nomen apud
vulgum & credulos sibi compararunt, Sed &
nostra hæc qualiacumque, seniorum Apollinis
mystrarum censura propono. Et verò,

Quid de prima Paranesi senserint Varij, præ-
ter aliorum medicorum litteras, quas apud ser-
uo; Clarissimorum medicorum dictitant se-
quentes Doctissimi Fieni Professoris primarij
in academia Louaniensi, & Excellentis viri
D. Andree Treuisij Albertij Pij Principis no-
stri protomedici & Consiliarij, Epistolæ;

Ornatissimo Eruditissimoque viro, D.
A. OBERTO Urbis Audoma-
rensis medico. S. P.

Omnatissime Domine, Recepi litteras tuas
una cum Paranesi tua, inuicem mitto tibi
librum

librum hunc meum gaudebo, si intelligam ita
tibi meum placere sicuti tuus placet mihi. Of-
fendit te virum esse doctum, & eruditionis ac
studiorum amantem, qualem in minoribus vr-
bibus & extra Vniuersitates non putabam re-
periri. Heri post prandium eum recepi, nunc
rescribo tibi, itaque leniter eam percurri, sed
non exacte adhuc examinavi. Cum maiore at-
tentione breui legam. Vale Lonanij 5. Apri-
lis 1629.

Tui studiosissim⁹ THOMAS
FIENVS.

Clarissimo atque Expertissimo Domino
ANTONIO OBERTO Audo-
maropoli medico,

Clarissime atque expertissime Dñe Do-
ctor & festinanter tuis humanissimis res-
pondere debeo propter subitum discessum D.
Procuratoris Regij Tassini, & propter occu-
pationes continuas & ingentes. De tua dispu-
tatione cum Clarissi. D. du Gardin pluribus
cum ipso egi, ostendique te potuisse merito su-
stinuisse illam opinionem de vena secanda in
pleuritide, tibi que datam non lenem occasio-
nem fuisse contra illum inuehendi. Responsum
ab ipso à multis mensibus non habui. Et ni fal-
lor ex litteris meis conciliationem variarum
sententiarum de venis diuersè secandis ra-
tione pleuritidis occasionem arripui. *idea*

ideò summoperè fui legere postremam tuam
analysim, quod viderim breui resolucentem.
Vale & me amare perge, Bruxellis 19. Nouem-
bris 1631.

T. D. Addictissimus eternum
ANDREAS TREVISIVS.

Clarissime atque expertissime Dñe, Inter
chartas enolendum mihi inciderunt in
manus litera, quibus Clariss. D. Professoris du
Gardin redarguebam in te conuiciandi ni-
miam libertatem. Eas quin ad te mitterem in
tanta difficultate ut posteritati prodessem, o-
mittere non potui: quia & faciunt ad tua exi-
stimationis integritatem. Viue igitur & vale,
Bruxella 3. Maij 1633.

T. D. Addict. AND. TREVIS.

*Copia litterarum D. Andreae Trevisij ad cla-
rissimum virum D. du Gardin in uni-
uersitate Duacenâ medicina re-
gium professorem.*

Clarissime atque expertissime Dñe;
duorum tantum dierum intercape-
dine tuas & D. Obert Audomarensis Me-
dici clar. mi cum gaudio, & non sine tri-
stitiâ amicas litteras accepi. Tuas cum
quæstione medicâ, an in pleuritide vena
eiusdem lateris perpetuò sit secanda, cuius
affirmatiuam M. Eustachius du Pire (quod
melio-

melioribus auspicijs fecisset, si cum ag-
nomine *du meilleur loco du pire* in are-
nam descendisset) sustinuit. A Domino
autem Obert suas habui cum Apologia
contra te pro defensione suæ parænesis.
Vterque apud me conqueritur de sibi in-
fiatâ notâ magnæ acerbitalis & contu-
melia. Inuenio autem vos in facto (vt in-
quiunt, *causidici*) cōtrarios esse. Siquidem
tu scribis te theses tantum discipulis dis-
putandas in nullum stringens acumen de-
disse; immeritoque te offensum ab illo
fuisse. Is verò in litteris ad beneuolum le-
ctorem, & ad me, non parum inculcat, se
nescire quo pulsus genio, multis scomati-
bus suam parænesim exceperis, & vulga-
to decreto iactantiâ & dieterijs suffulto
condemnaueris.

Doleo inter doctos viros & amicos
meos ingenia exulceratis mentibus acui,
quæ moderatis animis deberent ad Reip.
bonum conferri. Epistolam porrò tuam
lego, quod cum ipsis thesibus ad illum mi-
sisti, breuissimum quidem, sed prudenti
virorum indicio, longè, latèque in def-
pectum, contumeliam, ac derisionem
eruditi D. Obert exaratum. Sic enim scri-
bis: *Ornatissime Dñe, remitto has the-
ses pro tuâ paranesi spongiâ magnificam*

Augusti nempe vel Caligula, utere vale-
bis. Vix credi potest te sine magnâ aliquâ
animi perturbatione ad illud venisse, nisi
enim D. Obert antea occasionem aliquam
sibi sic in eum inuehendi dederit, liquidû
constare potest te sponte illum percellere
voluisse. Sed quid? Senescentis huius mû-
di pruritus talis in disciplinis deprehen-
ditur, vt vix aliquid sine contentions as-
peritate traducatur. Et tamen disputatio-
nes præsertim medicæ, agitari debent ad
hominum salutem, non ad aliquam osten-
tationem, minusque ad alterius famæ pro-
scindendam integritatem.

Neque illum prorsus excuso, potuisset
enim & ipse suspensis (si non blandis) ver-
bis, iniuriam quam sibi factam obtendit
soluisse, & non tantum amaritudinis ef-
fundere, sed & formicæ inest sua bilis.
Ambo igitur in inuestigandâ reuulsionis
per sanguinis missionem natura, sermonis
intemperantiâ exundantes fuistis. Auer-
sione igitur & diuersione pungentium ver-
borum pectus à plethorâ iracundiæ ad gra-
tiarum aram reuocare debetis. Quando-
quidem non modo virtutis non est, sed po-
tius immanitatis omnem humanitatem
in tumidum eos velle repellere.

Porro vult ille quod aliquando cum
ratio-

ratione & vtilitate debeat fieri in pleuride sanguinis missio ab opposito latere: Tu nunquam ab ipso faciendam esse, sed ab eodem semper constituis. Is reuulsionem dari sectâ oppositâ venâ propter basilicæ communionem subclauicularium venarum: Tu eam inficis, & per Anastomosim præstari osculis venarum intercedentibus astruis. In secundum rectitudinem ab inferis & superas, & è conuerso, partes, reuulsionem tantum haberi statius. Ille verò secundum latitudinem considerato vasorum ab vno caudice in duas partes diuisionem benè contendit; qua ratione potest retrahi sanguis ab vnâ ad alteram. Vterque habet & suas authoritatibus & rationibus vallatas opiniones: Ita vt si in thesibus (vt ad me scribis) mansisses, & non spongiam atramento repletam Dño Obert misisses, nihil amaroris, nihil contumeliæ exortum fuisset.

Attamen vtilem fuisse & acrem concitatamque de sanguinis missione in Pleuride vestram contentionem sentio. Quia reuulsionis, deriuationis, & euacuationis considerationes exactè fuerunt expensæ, & iam laxatis animis ad maius bonum sunt dirigendæ: quandoquidem ex vestris sedatis laboribus (nisi mutuo odio cor-

rumpantur) subtilioris doctrinæ atque experientię fructus excipientur non pœnitiendi. Bilis enim ad grauiorem mentem excitat, sed nimis æstuās ipsam perturbat.

Nisi autem intercederet doloris vrgentia, quæ sæpè habet rationem causæ, nisi impetus fluxionis simul aliquando postularet cum euacuatione reuulsionem, nisi virium imbecillitas aliquando impediret: multiplicatas venæ sectiones, nisi ætas, nisi locus, affectus aliud præstandum indicarent: nisi partes, vel partium transmittentium ratio aliter esset habenda: nisi occasio in Pleuritide tam præceps & varia se offerret arripienda Medico, in tuam propè: venirent sententiam.

Verùm cum tam variè hæc omnia se offerant, considerandū cum D. Obert existimo aliquando ab opposito latere sanguinis missionem cum vtilitate fieri posse, cum scilicet beneficium euacuationis cum magna reuulsione statim requiritur, sæpè etiam vocato medico cum magnâ ex parte iam factus est confluxus: & vel maximè quia vires sunt expendendæ non tantum ad augmenti inflammationis impeditionem, sed expectorationem, cuius solo defectu non pauci pereunt. Vndè potest ad sanguinis missionem ex proprio

la-

tere deueniendum, quia sanguinis missio ex pede ad diuersionem in tantâ vrgentiâ nullum prorsus aut tardum præstat auxilium. Si Galeni sententiam admittimus ex opposito latere vel obscuram, vel post temporis interuallum percipi vtilitatem solâ scilicet considerata doloris acerbitate illud excipiendum.

Quid si à plenitudine capitis propter in sole moram in pleuram defluat sanguis, reliquo corpore minimè plenitudine laborante? An non reuulsio cum euacuatione meliùs ac vtiliùs fiet secta vena ex cubito oppositi lateris, quam ex pede? vt & virium habitâ ratione, quod multiplicandæ perperam ob dictas rationes non sint sanguinis euacuationes.

Ita vt non semper secundum rectum & in maiori distantiâ secta vena in pleuritide opportunam reuulsionem faciat. Quorum omnium ratione, & aliorum similium existimandum est præstantissimos Medicos ob inexpectatos euentus in cōtrarias abiisse sententias; quia omnibus etiam tempestiuè adhibitis remedijs, & ex quauis venâ educto sanguine præter ipsorum opinionem, nullo commisso ab ægrotantibus errato, non paucos obiisse animaduertent, suspicione apud eos persisten-

te, quod ex coniecturis non satis certis de plethorâ totius & partis, de motu ipsius sanguinis, de plusquam par esset educto sanguine curationem exercuerint, perpetuæ enim eadem ad remedia non possunt esse indicationes. Vnum enim celeritatem auxilij postulat, aliud maiorem securitatem, inter quæ & quantitas remedij, & occasio adhibendi varia, & medico non omninò certa. Vndè omnia cum circumspeditione consilio Hippocratis sunt facienda.

Firmatur quidem iudicium ex adæquatis in medicina rationibus, sed rationes in praxi medicâ propter dictas coniecturas, & varias occasiones experientiam non rarò castigatricem habent. Experientiam autem sibi quisque constituit pro sui non solum ingenij acumine, sed occasionum ex euentibus susceptâ indagine quæ medicos in hæitationem adducunt. Sumpto enim argumento à iuuantibus & nocentibus in medicinâ non parum valido, ex accidenti aut non benè ab ipsis percepto variè de causis, & de morbi essentia, vel statu iudicant. Sicque de Venæ Sectione in Pleuritide opinio habuit, habet, & habebit ad utramque partem rediuiuos ingenuos assertores.

Propter

Propter quod & Aristoteles subtilis ingenio, naturæque magnus interpret, opinionum (& aliarum rerum) circulum statuit esse. Ex torrente siquidem renascentium in animis notionum usu atque exercitatione consuetarum opinionum conditione fastidita mente, sensim variæ inducuntur opiniones. Quod in ipsiusmet Pleuritidis facile obuenit curatione. Diuersis enim sæculis contrariæ præualuerunt sententiæ. Ex varia etiam si velimus Cœli constitutione. Ad quam Galenus etiam illud Hippocratis obseruandum. An aliquid Diuini insit in morbis ordinarias eleuat resolutiones.

Neuter igitur alterum tamquam ineptum & indoctum arguere potest, cum vterque suos habeat præstantes authores, & cum generosi conatus nunquam sint inficiandi. Boni consule ea quæ ad conciliationem inter vos amicitia comparauit, & vale vt valeas Rempublicam literariam ad medicinæ decus, atque vtilitatem promouere, Bruxellæ penultima Maij 1631.

QVÆ TOTO OPVSCVLO
continentur.

ARTICVLVS PRIMVS.

STATIONE PRIMA.

Continet Authores & eorum sententias
qui directa sectione reuulsiōem facien-
dam asserunt. Pag. 1..

STATIONE II.

Producit authores qui oppositam. pag. 5..

ARTICVLVS II.

Primò continet aphorismos ex Hippocrate,
& Galeno in quibus reuulsiō ad opposita fun-
datur. pag. 13..

Secundo, Canones undecim ex aphorismis
concinatos. pag. 17..

ARTICVLVS III.

Opposita sectionis ideam canonibus & apho-
rismis conformem adaptat. pag. 20..

Quamdiu reuulsiō ad opposita conueniat. p. 20..

De scarificatione topica. pag. 23..

De thoracis perforatione. pag. 24..

ARTICVLVS IV.

Idea precedentis fundamenta & conclu-
siones representat. pag. 27..

Quid sit Reuulsiō. pag. 28..

Quid

Quid pleuritis & eius differentia. pag. 28.

Quo morbi tempore reuulsio conueniat. p. 33.

ARTICVLVS V.

Aduersa sententia fundamenta declarat.

pag. 40.

De Anastomosibus disquisitio. pag. 41.

Anastomosis triplex Originalis, terminalis

& per coitionem siue unionem. pag. 41.

Originalis causa finalis. pag. 41.

Terminalis finalis causa. pag. 47.

Unionis siue coitionis. pag. 50.

An arteria cum venis coeant & quomodo;

*& an sit ex his in illas materiarum refluxus
per anastomoses. pag. 50.*

*An sanguis ex pulmone vena sectione re-
fluat in canam. pag. 61.*

*An arteria epigastrica ascendentes & ma-
millares descendentes anastomosi uniantur ita
ut sit ex his in illas refluxus mutus. pag. 62.*

*An vena extremitatibus uniantur & co-
eant anastomosi. pag. 63.*

*An vena porta & caua apices in hepate
anastomosi uniantur. pag. 69.*

*An in placenta siue iecore uterino, matris
& foetus arteria & vena anastomosi uniantur.
pag. 82.*

*An foetus in utero viuat propria vita, an
matris. pag. 102.*

*An motus cordis pendeat à motu pulmonis
& an pulset in foetu dum utero geritur. p. 103.*

*Pus empyicorum quibus vijs purgari possit.
pag. 102.*

An per Anastomoses lac & sanguis ab ute-

re ad mamillas refruere possint. pag. 121.

Partium omnium consensus unde. pag. 125.

An Azygota orificio & alijs quibusdam venis
nis sint valvula. pag. 131.

ARTICVLVS VI.

Secundum directam secantium fundamentum
tum examinatur. pag. 137.

An in reuulsione oporteat criticas enacna-
siones imitari. pag. 137.

Quid crisis quando & quomodo fiat. pag. 138.

An communio directa pendeat à fibrarum
reclititudine. pag. 143.

An critica directio & vacuatio fiat per oc-
cultas anastomoses. pag. 146.

ARTICVLVS VII.

Directam & saphenas secantium ad reuul-
sionem rationes examinantur. pag. 256.

Καὶ τίς ἂν quot modis dicatur. pag. 162.

Excursio ad Querelas Gardini. pag. 205.

Prima, Paracelsi titulum defendit. pag. 207.

Secunda, ostendit Galenum ad reuulsionem
in pleuritide nunquam saphenas secuisse. p. 212.

Tertia, saphenarum sectiones ad reuulsio-
nem condemnat. pag. 216.

Quarta, docet saphenarum sectiones, non ita
prodesse ut oppositam sectionem ad reuulsio-
nem. pag. 220.

Quinta, ex venarum communione originali,
oppositam melius secari quam saphenam ad re-
uulsionem. pag. 222.

Sexta, Communionem originalem ad re-
uulsionem permultum interesse asserit. pag.

227. sicut

Sep-

Septima & Octava, in qua discutitur quam-
liu reuulsio ad opposita fieri possit sicut & va-
uationis quantitas. pag. 239.

Nona, ostendit in pleuritude non esse cum-
bandum, nec nimis sanguini parcendum. p. 251.

Decima, explicat Galeni locum art. med.
5. sanguinem impactum & extrauenatum
vena sectione retrocedere non posse. pag. 257.

Vndecima, reuulsionem cum derinatione
ammixtam non esse reuulsionem contendit.
pag. 257.

Duodecima, morbum in fieri duntaxat,
morbum malè dici disputat. pag. 269.

Decima tertia, Gardinum malè dinisisse san-
guinis euacuationem in suas species, sicut &
ualè definisisse reuulsionem ostendit. pag. 277.

Decima quarta, negat arterias pleuram per-
ceptare. pag. 290.

Decima quinta, Derivationis definitionem
Gardino allatam improbat, & sanguinem in
arte affecta contentum & extrauenatum vena
retrocedere posse negat. pag. 294.

Materiam variolarum extrauenatam re-
trocedere non posse. pag. 297.

Variola à spiritu virulento eleuantur. p. 300.

Lud. Dureti de reuulsione ad opposita con-
clusio. pag. 303.

QVÆSTIONE MEDICA.

An in variolarum cura vene sectio conue-
niat. pag. 304.

An purgatio. pag. 324.

Ausboz

Authores qui hoc opusculo citantur & quorum opera usi sumus.

A		Columbus.
Acachias.	Aetius.	Ioan. Bab. Cananus.
Alexander.	Aphrodisæus.	Christ. à Vega.
Alsaaraius.		D
Albertus Anglicus.		Diocles.
Altomarus.	Alexāder.	Duretus.
Andreas Thurinus.		E
Andernacus.		Erasistratus.
Amatus Lusit.		F
Apollonius.	Arantius.	Fabricius ab Aquapendente.
Aristoteles.	Aretæus.	Franciscus Valesius.
Archigenes.		Fallopium.
Arnoldus Villanoua.		Fernelius.
Archangelus Piccolomineus.		Fienus.
Asclepiades.		Fœsius.
Aselius.	Auerroes.	Fuccijs.
Auicenna.	Auenzoar.	G
B		Galenus.
Bauhinus.	Bartholomeus Eustachius.	Gattinarius.
Barthol. Mōtagnana.		Galfridus Cōdiaceus.
Benedictus Veronēsis.		Iul. Guastauiniuss.
Benedictus Victorius		Gordonius.
Brissotus.		Gentilis de Fulg.
C		Giacinus.
Cardanus.	Carcanus.	Gradi.
Caprius.	Capiuaccius	Guanierus.
Caſerius.		H
Carolus Stephanus.		Halliabbas.
Celsus.	Conciliator.	Hercul.
		Heurnius.
		Herophy.
		Hippocrates.
		Hollern.
		Huartes.
		I
		Ioannes Tornamius.
		Isaac.
		Ioubertus.
		L

L

Laurentius.

Pet. Laurenbergius.

M

Lud. Mercatus.

Hier. Mercurialis.

Massaria.

Marfilus Ficinus.

Mesues.

Montanus Dixmuda-
nus. Mundinus.

O

Oribasius.

P

Paulus. Paracelsus.

Simon Petreus.

Plato. Praxagoras.

Q

Quercetanus.

R

Rhafis. Riolanus.

Mart. Rulandus.

Rufus Ephesius.

Rondeletius.

S

Sanctorius. Scaliger.

Solanus. Sennertus.

Siluius. Spygelius.

T

Themistius.

Thadeus Dunus.

Tostatus Abulensis.

D. Thomas.

Trincauellius.

V

Valesius Tarentinus.

Valeriola.

Iac. Wecherus.

Vesalius. Valuerda.

Vidus Vidius flor.

Z

Zabarella.

Errata.

Pag. 37. lin. 26. lege παροχτείνω.

Pag. 243. lin. 10. lege llama.

Pag. 258. lin. 16. lege ἰκνεῖν.

Pag. 297. lin. 15. lege ἰκχυμῶσιος.

Pag. 135. lin. 4. lege affirmat pro negat.

Pag. 151. lin. 16. lege influxus.

Cætera per teipsum benigne lector
facile corriges.

APPROB

APPROBATIO.

VIdi autographa litterarum huic Pa-
ranesi præfixarum, ex quibus pater-
quid de Authore, & Opere Clarissimi me-
dici Trevisius, & Fienus senserint. Quod
censoris est, testor in eâ nihil contineri
quod bonis moribus contrarium sit, aut quod
saluâ fide Orthodoxâ sustineri non possit.
Actum Audomaropoli die vigesimâ quintâ
Aprilis 1635.

ANTONIUS DE LA DIENE
Ecclesiæ Cathedralis Canoni-
cus, Sedis Vacantis Vicarius
Generalis.

Q V Æ S T I O

M E D I C A.

De venæ sectione in pleuritide.

Quæstionis Titulus & explicatio.

CVM plusquam sexcētis annis revel-
lēdi causa in pleuritide, tam Græci,
Latini, quam Arabes oppositam ba-
siliam ante directā secuisent, Anno cir-
citer 1625. Matheus Curtius Papiensis
professor, novam opinionem primus vul-
garē ausus est, & in pleuritide spreta op-
posita sectione venam è directo lateris af-
fecti continuè secandam asseruit, *Coment.*
in Mundini anat. absolute enuntians citra
ullam distinctionem. Hunc confestim se-
quutus est, Brisotus Parisiensis, quem Fer-
nelius & alij Galli, adfuit & Fuccius Ger-
manus, qui suppresso Curtij nomine, se
huius sententiæ principem gloriatur, titu-
lo doctrinæ novæ & paradoxæ, suorum pa-
radoxorum l. 2. cap. 4 *Contra Arabum in-*
quit & recentiorum ferè omnium senten-
tiam, Huius ergo paradoxæ sententiæ cau-
sa orthodoxam sententiam reuocans, sic
quæro. An

ARTICVLVS I.

ius malos successos, credo ipsum hac opinione, quod notauit Scaliger, iugulasse quam plurimos.

Amatus Lusitanus & Hieronymus Mercurialis, Sclanus Medicus Neapolitanus Amato cōsentit, in Anastomoses apicales ita intenti, vt existiment illas à natura factas, vt qui in pleuram fluxerit sanguis nimius, per eas euacuari possit azigotæ anastomosi originali valvulas applicantes cum Hollerio, quarum ministerio refluxere non possit, quas irridet Fallopius & alij de quibus postea.

Alexander Massaria directam secat tum reuulsionis tum derivationis gratia, quod putet reuellendum simul & deriuandum cum opposita sectio inquit duntaxat, reuellit.

*L. 1. c. 26.
de mor.
inser.*

Hollerius directam etiam secat propter anastomoses & criticas directiones.

Ludouicus Mercatus etiam directam in criticas euacuationes intentus, huic cōsentit Ioubertus in paradoxis.

Ioannes Fernelius inter Gallos coryphaeus th. 2. c. 5. post Brissotum fibrarum rectitudinem cōmentus est & criticas euacuationes pro regula habuit, anastomoses non meminit, dexteris partibus sinistris cunctis

Argem

ARTICVLVS I. 5

Argenterio non esse contrarias asseruit, quem sequuti sunt penè omnes Galli: Achacius, Riolanus, Durerus, Ioubertus, Laurentius, Valeriola, Hollerius. Sectione saphenarum approbat vnus quod sciam Giacinus quem modo sequitur Gardinus oppositam damnans.

Pro opposita sectione sunt sequentes.

STATIO 2.

EX Græcis principes sunt Ætius, qui postquam lib. 3. de re medica cap. 12. ex mente Galeni docuit fluctione sedata directam secandam in fine capitis sic ait. *Oportet autem in omnium inflammationum principijs ab opposita parte sanguinem mittere, quod ex sententia Archigenis confirmat serm. tetra. 8. cap 68. sic In his vero qui acuto morbo ut diximus infestantur siquidem circa mammas & clauiculas hæreat dolor, venam incidere oportet in brachio, non eo quod recta ab inflammato procedat latere, sed opposito.*

Areteus Curat. acut. lib. 1. Cap. x. In pleuriticis inquit eadem potissimum die vena incidenda est, quin & vno die intermisso ra-

zione crapul. sanguinem à vena mitto, quæ in cubito est, non eius quæ secundum rectum incessum inflāmati costis opponitur, maxime enim procul abducere præstat.

Aurelianus Græcorum acutissimus censor lib. 2. acut. cap. 18. Adhibenda inquit phlebotomia, sed ex alio brachio quod fuerit dolenti lateri contrarium, certæ rationis causa quam sæpe in morauimus.

Paulus lib. 6. cap. 4. In partibus recenset inflāmtis ex oppositis partibus vacuationem facere oportet, hos principes sequuti sunt Arabes inter quos

Scrapion tract. 2. cap. 21. cum dolor ascendit in clauiculas oppositi lateris venam secat primum, confirmata verò in statu materia nec amplius fluente eiudem lateris sufficam.

Rhasis lib. diuis. cap. 54. scribit pleuriticis secandam esse venam oppositi lateris & sequenti die ex latere doloris ad Almanf. cap. 57. lib. 9. Si forte inquit vniuersum corpus pletoricum fuerit, tunc ex latere opposito sanguinis detractio celebratur, porro si ad aliquot dies adfluxerit, fluxusque constituerit, sanguis missus ex latere affecto remedio est.

Anenzoar lib. 16. cap. 3. Curatio inquit
huius

huius egritudinis est phlebotomare agrotum ex basilica brachij oppositi: ceteri quibusdam novis medicis nostri temporis minuendum videtur ex eadem parte egritudinis, adductis ad eam rem logicis & sophisticis quibusdam rationibus, id mihi nullatenus videtur verum, certissimumque existimo ita facere, agrotum esse ad mortem precipitare.

Mesue lib. de morb. inter summa 7. cap. de pleu. docet quod Si materia fuerit dilata-
ta ascendens usque ad furculas & nondum ex
soto repserit, sed adhuc est ut repat phlebo-
tometur basilica lateris oppositi.

Halliabbas lib. 6. pract. cap. 13. sic opus
eos in huius passionis dominio, in principijs
si dolor ad furculas ascenderit phlebotomo vi-
manus lateri opposita passionis, quo passionis
materia in contrariam distrahatur partem, ad
quam superfluitas capit declinare & si passio
diuturnior sit, & materia iam corroborata
est, tunc in latere passionis phlebotomo utare.
Hunc sequitur ex neotericis Herculanius.

Isaac pract. lib. 6. cap. 11. Oportet ini-
tio si dolor furculas salieris basilicam per an-
tispasim phlebotomari, ut materia ad opposi-
tum diuertatur, si vero materia quiescat
phlebotomari secundum infirmum locum.

Allaravius pract. lib. 12. cap. ult. Si flu-

xio sit à sanguine, oppositam secat in mor-
bi initio, ægritudine firmata directam.

Arabum princeps Auicennas lib. 3. fen-
10 tract. 5. cap. 10. inquit *Ex rebus cõmuni-
bus est phlebotomia, sed in principio ex late-
re diuerso, et si sit iuuamentum minus & tar-
dius.* Cap. 20. *Operire prohibeas materiam
venientem ad apostema cum euacuatione &
attractione in contrarium,* & hic cap. 10.
primò saphenam quandoque tundit, mox
ad basilicam oppositam, quam tanti facit
vt ea non comparente, quamlibet secet an-
tequam ad directam procedat.

Hi omnes Arabes ante directam op-
positam secuerunt, & si quidam saphenas
ante oppositam aliquando secuerint; qui
700. annis in Hispania & Mauritania
summo cum honore medicinam exco-
luere Latinis & Græcis interpolim, quos
seguutus est.

Auerroes vij. coll. qui in partium su-
periorum phlegmone temper oppositam
secari iubet vbi auertendum est Hos etiam
sequeuti sunt Italix nobilissimi professores.

Arnoldus Valanouanus aph. 10 cap. 7.
reg. de venæ sectione inquit *Phleboto-
mandus est æger per venas longinquiores
vnius diametri, vel multarum si corpus ple-*
sto-

ARTICVLVS I. 9

thoricum fuerit, tempus autem fluxionis diatricto metitur, infra quod rarissimè fluxus cessat & plethoria frequenter occurrunt & postea lib. 4. th. 5. si materia est in fluxu fiat ipsa vaauatio per partem oppositam.

Gnulis de Fulgineo & Benedictus Veronensis, Bartholomeus Môtagnana cum Gradio & Gvaniero, Gittinaria, partim Auicennam partim Meluem sequuntur sicut & Vidus Vidius Florentinus.

Valesius Tarentinus oppositam basilicam secat initio morbi, antecedentem reuellens & euacuans materiam, post tertium directam.

Conciliator dñi 112. corpore plethorico & materia fluente, ad oppositam se confert, fluxu pacato ad directam.

Benedictus Victorius Fauentinus docens anno 1534. in gymnasio Bononiensi edito scripto professus est ex Hipp & Galeni doctrina materia fluente ad partem affectam, ex opposito latere, non ex eodem sanguinem esse mittendum.

Andreas Thurinus oppositam secat cum Brachelio edito opusculo, sicut patet ex paradoxo Fucci 4. lib. 2. quibus accessit Manardus, qui epistola ad Pharrasium affirmat dari occasiones oppositæ secandæ, sicut

sicut etiam saphenæ ob hæmorrhoides & menses suppressos, Sunt & huius sententiæ non ignobiles Galli.

Ioannes Tornamira Montipess. profess. cap. 57. clarificatorij super caput 5 Rhasis & 9. ad Almanf. inquit. *In primis diebus igitur fiat phlebotomia de basilica partis contraria, quia ut plurimum fit complectoria venarum, propter quam sequitur materia ab ipsi venis ad dictas pelliculas, ideo debet fieri de opposita si possibile est, sine complectoria de eadem parte, verum tutius est semper facere de opposita in principio morbi.*

Gordonius itidem Montipess. profess. Lill. parte 3. cap. 9. vetat fieri directam sectionem ante oppositam. *Dua basilica inquit equaliter hauriunt ex puteo (l. Lacuna seu vena caua) & ideo equales sunt quantum ad hoc de phlebotomia de quacunque parte fuerit, quia equalis est distantia. Sed aliud est inquit, quoniam vena capillares quæ nutriunt costas superiores habent colligationem cum venis capillaribus quæ procedunt à basilica, & ita si fieret phlebotomia in principio corpore pleno de eodem latere, fieret tractus ad locum per venas capillares & ita faceret ad augmentum.*

Cappiuaccius recentior cum Trinca-
uellic

ARTICVLVS I. 11

bellio Auicennam sequuntur, saphenam duntaxat tundentes, vbi fomes fluxionis in inferis delitescit, mentibus aut hæmorrhoidibus suppressis aut mariscis.

Alias oppositam & post directam, quod faciunt etiam Heretanus, Iacobus Weckerus ipse etiam Mercurialis, saphenam tundunt ob dictos casus, alias non; Eodem ferè tempore ab Altomari profess Neapol. The. 1. 5. c. 5. *Toto inquit errant cælo, qui iuxta Gal. doctrinam volunt perpetuò pro cura pleuritidis eiusdem lateris venam incidendam esse.*

Et modo superstes Iul. Guastauinius in Pisano Gymnasio sic docet in Contro. Med Select *Missus sanguis ex opposito latere, pleuritico detrimento esse, nec alteri lateri inflammationem adferre potest, & siue ad dextrum, siue ad lauum inclinet sanguis oppositam partem secabimus, contrarium morbum opponentes.*

Agmen claudat doctissimus omnium iudicio Sennertus, Wittenbergæ nunc docens inst. lib. 5. parte 2. lect. 1. Cap. 18. *Si artis opera artificiosam medicationem spectemus, magna reuulsionis ex latere opposito est utilitas.*

Quid pluribus autoritatibus lectorem fati-

fatigo? Celsus, rationibus directæ sectionem videtur docuisse, at contrarium in praxi agens, fatetur experientiam contrarium approbasse. Cap. 10. lib. 2.

Doleo me Galfridi Condiacei apologiam, non potuisse reperire, quam pro opposita sectione contra Giacinum & academiam Florentinam vulgavit, teste Posseuio bibliothecæ selectæ. lib. 14.

Ex quibus patere arbitror, omnes supracitatos authores, ante directæ sectionem oppositam approbasse, exceptis Gardino & Giacino, qui in oppositæ locum saphenæ substituunt.

Opinio igitur nostra à Gardino & Giacino & Arabibus quibusdam dissidet quod saphenas spernat. A Gallis qui directam perpetuè secant, conuenit cum Arabibus qui omnes ante directæ sectionem oppositam tundunt, & cum Gallis quod saphenarum sectiones improbent.

Atque huiusce sententiæ nostræ Hippocrates & Galenus, solidissima posuere fundamenta, quod manifestum fiet ipsorum aphorismis; pro quibus sit.

ARTICVLVS SECVNDVS.

*Perioche, seu aphorismi ex Hipp.**& Galeno.*

I.

E Nitendum est autem vt venæ sectiones quam longissimè fiant, à locis vbi dolores fieri & sanguis colligi solet.

*Hipp. lib.
nat. hum.
& de off.*

I I.

Deriuatio ad latera & vicina, quo maximè fluit, Reuulsio ab ijs quæ supra sunt ad partes inferiores, & ab his ad illas.

*Hipp. lib.
de humo.*

I I I.

Cedentem reuellerè statim, renitenti cedere (id est) impacto prout explicat Gal. lib. 4. th. cap. 6. si fluxio iam cessauit & in membro impactus sanguis sit, deriuare per vicina expedit.

Epid. 6.

I V.

Fluentium humorum reuulsio, eorum qui iam membrum occupant deriuatio modèla est.

*Gal. ad
Glauc. 2.
cap. 70.*

F.

V.

Gal. l. 4. Auertitur sanguis, & ad alia membra
Ther. cap. 3. conuertitur, tum ad proxima deriuatus,
 tum ad contraria reuulsus.

VI.

Gal. Th. 4. cap. 6. Hippocrates iubet nos auertere ad con-
 traria, deriuare ad latera.

VII.

Gal. Th. lib. 4. cap. 3. Ac si perpetuum est, incipientem fluxi-
 onem ad contrarium trahi oportere, fixam
 verò iam in laborante particula vacuan-
 dā, vel in ipsa particula quæ afficitur, vell
 à maximè vicina, in promptu nobis est,
 de sanguinis missione colligere, quod im-
 principio è longinqua, postea ex partibus
 exulceratis sit molienda.

VIII.

Th. lib. 23. cap. 6. Præceptum in contrarium reuulsionis
 in omnibus commune est.

IX.

Th. lib. 23. c. 19. Omne sanguinis profluuium ad contra-
 rium per cōmunes vias auertimus; in vni-
 uersum ad communia membris patienti-
 bus in aduersum trahere oportet, aut ad
 eadem à quibus est fluxionis origo.

X.

Lib. 1. ad Glan. c. 2. Semper enim fluxionis impetum ad cō-
 trarium trahere expedit.

XI.

ARTICVLVS II. 215

X I.

Siquidem longè à tentata fluxione par- *Lib. 13.*
e quod redundat retrahere, nequaquam *th. 6. 11.*
ad eam attrahere expedit.

X I I.

Membris quæ laborare iam incipiunt *Th. 1. 13.*
ucurbitula non est apponenda, sed ijs *6. 19.*
quæ cōtinuatæ his sunt, reuulsionis gratia.

X I I I.

Reuellendus igitur & vacuandus simul *Lib. 19.*
ui ad iecur fluit sanguis, interna in bra- *th. 6. 18.*
chio secta dextra vena.

X I V.

Vt summatim dicam incipientes phleg- *De C. rat.*
monas ἀρσισπασμῶς oportet vacuare, inue- *p. vena.*
ratos ex ipsis si fieri potest partibus. *S. C. 19.*

X V.

Si in manibus phlegmone orta est, cru- *Gal. 1. 18.*
i, sin in cruribus, manus. *th. 6. 13.*

X V I.

Altero crurum dolente scarificabis al- *Gal. th.*
terum. *13. 6. 30.*

X V I I.

In Angina primas in manibus, secun- *Lib. th.*
das eas quæ sub lingua sunt. *13. 6. 11.*

X V I I I.

At ijs quæ in occipitio sunt afflictis, etiā *Ibid.*
in quæ in cubito est, nec non eam quæ
habe-

habetur in fronte.

X I X.

*Hipp. aph.
67. l. 3.*

Dolenti posteriorem partem capitis vena secta in fronte iuuat.

X X.

*Gal. ad
Clau. li
2. c. 2.*

In locis muliebribus in contrarium trahes si in cubito venam secueris & deriuabis fiteas quæ in cruribus sunt, aut tali venam diuiseris.

X X I.

*Gal. de
Curand.
R. per. V.
4. c. 3.*

Quæ sunt ex cruribus vacuationes, non solum reuellunt, sed etiam menses proliciunt.

X X I I.

*Ibid. c.
11.
Gal. l. 1. c. 6.*

Caterum non contemnenda venæ sectionis ratio tanquam non sit auxilium reuulsiuum, cum me sæpè conspexistis in valico sanguinis ex naribus eruptione eo vsu repente fluxionem sedasse secta in cubito vena.

X X I I I.

*Περὶ τῶν
παινῶν
ἀπὸ πρῶτον
τοῦ πρῶτον
τὸ σπ.
ἐπὶ τοῦ
ἐξ αὐτοῦ.*

Quicumque morbi à fluxionibus sumuntur fluxiones primo pacare oportet, postea quod influxum est euocare.

X X I V.

*Gal. l. de
Reuuls.*

Atque ut summa rem complectar, in reuulsio efficitur; in humoribus videlicet partes superiores petentibus, ad inferiores & contra, similiter in anteriorem & posteriorem.

sterium

ARTICVLVS II. 17

steriorem, præterea à dextris ad sinistras, & th. 5.
sicut ab his rursus ad illas. cap. 3.

Ex his assertionibus & theorematibus
nascuntur sequentes canones.

C A N O N. I.

Reuulsio non est nomen inane, cum de
ea Hipp. & Galenus aded præcisè loquan-
tur, eamquè auersionis esse speciem, cum
collaterali sibi deriuatione statuendum.
Canonis veritas resultat ex aph. 4. 5. 6.

C A N O N. II.

Reuulsio duplex est, vna localis, quæ
contrarietatem in membro affecto consi-
derat, sicut in aphorismo 19. hæc reuul-
sionis nomen vix meretur, illa enim à pe-
rito medico non administratur, nisi prius
toto reuulsione vacuato, ne plus ad par-
tem attrahatur, quam vacuetur docente
Galeno, vnde cum in principio damnosa
sit eiusmodi reuulsio, de ea non agimus.

Alia est vniuersalis, de qua disputamus,
quæ contrarietatem obseruat respectu to-
tius corporis, tales reuulsiones in morbo-
rum principijs, laudantur pleno & non
pleno corpore, tam secundum longitudi-
nem, quam latitudinem, fundatur canon
in veritate aph. 1. 2. 7. 9. 11. 15. 16. 17. 24.

*Ad aph.
67. 5. 7. &
6. exid.
com. 2. &
de C. R. S.
per V.
cap. 19.*

C A N O N. I I I.

Reuulsionis nomine Galenus pluribus locis abusus est, quod patet ex aph. 12. 13. 21 quippe in 12. deriuatio est per proximam per aph. 2. & 7. In 13. est mixta, & à parte ipsa euacuatio, non reuulsio. In 21. reuulsio ibi est propriè deriuatio per aph. vigesimi particulam secundam.

C A N O N. I I V.

Reuulsioni vniuersali propriè dictæ cōpetit vt ad distantia loca fiat à parte affecta, ita vt excludat omnem sectionem proximam; fundatur Canonis veritas in aph. 1. 2. 7. 11. 15. 20. 17. 16.

Per hunc canonem sectio basilicæ dextræ in pleuritide dextra, non potest esse reuulsio, quia non potest fieri proximior ad deriuationem.

C A N O N. V.

Reuulsioni proprium est vt ad contraria siue opposita loca fiat per lineam rectam, transuersam & obliquam, firmatur canon aph. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 14. 15. 16. 20. 24.

C A N O N. V I.

Reuulsio non solum partem affectam considerat, sed etiam simul mittentem vbi à fluxionis fonte vacuet: patet huius canonis veritas ex aph. 9. 22. 11.

ARTICVLVS II.

19

CANON VII.

De natura reuulsionis non est, vt à parte affecta influxam materiam euacuet, sed sufficit vt fluxurum & fluentem vacuet: fundatur in aph. 4. 7. 11. 23.

CANON VIII.

Reuulsioni maximè proprium est, vt in principio morbi fiat, dum humores fluere incipiunt & quamdiu fluunt: per aph. 3. 4. 7. 10. 14. 23.

CANON IX.

De natura reuulsionis est, vt fiat ante deriuationem, per aph. 23. Hoc canone vacuatio mixta ex reuulsione & deriuatione non est reuulsio.

CANON X.

Deriuationi proprium est, vt ad latera & vicina fiat, & proxima directa, & ita proximam sectionem connotat, vt excludat omnem remotam: Canonis veritas elicitur ex aph. 2. 5. 6. 7. 14. 17. 20. 21.

CANON XI.

Deriuationi competit, vt fiat fluxione sedata & fluxili existente materia per aph. 3. 4. 7. 14. 23. Hoc canone deriuatio non conuenit in principio materia fluente & fluxura.

ARTICVLVS TERTIVS.

*Opposita sectionis Idea.**Lib. acut.*

V Enarum superiorum sectionem in pleuritide nos edocuit Hippocrates, enim uerò incipiente ea atque etiam urgente sanguinem in partibus superioribus æstare testatur etiam Galenus contra Erasistratum, & natura per hæmorrhagias, sputa cruenta, solet pleuritidis redundantem materiam salubriter euacuare, etiam in principio: At quod op-

*Epid. 6.**sent. 29.**sent. 3.**ep. 2. ad**Glauc. 1.**1. c. 7. de**per V. S.*

posita dolenti lateri vena secanda sit, docet Hipp. ἀντισπᾶν si quo non oportet vergat, & quidem in contrarium cedentem retrahere statim in principio, quam doctrinam sequitur Gal. inquiens fluentium humorum ἀντισπασίς quia nos auertere oportet quod influit ad cōtraria reuellētes unde est fluxionis origo, nempe pars affecta est imbecillior, sicut & tota ea corporis pars è directò, quæ graui illo affectu laborat, quam ob causam, cogimur sanguinem mittere ex

*Gal. th.**l. 13. c. 5.**ad Glauc.**lib. 2. c. 2.*

membris quæ læsa non sunt. Cum autem docēte Galeno fluxio sit pleuritidis causa, & in morbis à fluxione, primum eam pa-

care

ARTICVLVS III. 21

care & sistere oporteat, antequam influ-
 xum vacues oppositæ basilicæ sectio in
 pleuritide tam diu expediet, quamdiu flu-
 xionis metus sublatus sit, maximè verò in
 principio toto, eoque magis si plenum cor-
 pus fuerit, quinimò & absente plethora
 quippe docet Gal. *dolorem & calorem mem-*
bri in quo phlegmone sedet, etiamsi ab excre-
mentis totum corpus fuerit vacuum, fluxio-
nes accersere, porro dolor sanguinem ad se
trahit citra plenitudinem, quo Galeni dog-
mate docemur non esse verum quod decer-
nit Gardinus.

*Aph. 23.
 per Can.
 9.*

*Th. lib.
 13. cap. 5.*

*De C. R.
 per V. S.
 cap. 8.*

*In apol.
 decreto.*

Si citra plethoram vniuersalem oppositi la-
teris venam secueris, plurimū nocueris, sicut
& illa Clarissimi D. Remigij cōclusio hal-
lucinatur, Euacuatio in pleuritide ex aduer-
so dūtaxat bona est, cum magna est plenitudo.

*Conclus.
 3. def. 10.
 Babiſta
 donlceſ
 1633. Sep.
 3. Duaci.*

Fluxionis igitur sedatio prima est & po-
 tiſſima reuulſionis indicatio, cum autem
 pleuriticæ fluxionis fons, sit in lacunæ par-
 te superiore docente eodem Gal. *redun-*
dantia in his partibus quæ post hepar sunt,
ſi quæ erit circa pulmonem erit, & fluxionis
directio ſit à parte potente in debilem ſe-
exonerante, conſentaneè rationi euacua-
bit, qui ſpretis ſaphenis oppositam ſeca-
bit, & citra proritandæ fluxionis pericu-

*Per aph.
 23. arti-
 culi. 3.*

*Lib. 2.
 nat. ſec.
 cap. 1.*

Per aph.

11. Artic.

3.

Per Ca-

non. 6.

Infl. lib.

5. c. 18.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

11. Artic.

3.

lum reuellet, nempè ex Gal.doctrina, longissimè à parte quæ fluxione tentari incipit, sic vt iuuare possit, quia & à fluxionis fonte quam proximè euacuabit & ab anastomosi azygotæ, per quam vt plurimū fit fluxio, sanguinem reuocabit & eum qui per directam subclauiam in prognatas à se fluxisset propagines, in lacunæ biuio intercipiet & in oppositam subclauiam deducet vacui & continui necessitate, & bene omnia faciet, Cui doctrinæ accedit Sennertus. *Reuulsio* inquit cum respiciat humores, non illos qui in affecta sunt parte, sed illabentes, magisque partem mittentem quam recipiētem, omni reuulsioni hoc commune est, vt humori fluenti contrarium motum conciliet, ipsumque ad partem nō in quam vergit, sed in cōtrariam moueat, & ita vt ad partem affectam amplius non fluat, efficiat. Ex quo sequitur ad proxima reuulsionem fieri non debere, si enim ad proxima fieret periculum immineret ne à toto pleno ea irritatione & occasione, ad affectam partem maior fluxio concitaretur: Sed potius vt vera fiat reuulsio & contrarius motus humori fluenti concilietur, ea quæ magnam & notatu dignam à affecto loco habent distantiam, & à membro laborante remota sunt, eique opposita parte eligenda sunt.

Ergo

ARTICVLVS III. 23

Ergo in pleuritidis principio, quamdiu fluxio vrget, siue plethora ad sit, siue non, opposita basilica tuto secari potest, quia reuulsio coniunctam morbi materiam euacuare pro scopo non habet, sed anteccedentem duntaxat euacuare contendit: quod clarè sic iterum edocet Sennertus: *Sed humores aliqui iam actu ad partem aliquam fluunt, metusquè sit ne & reliqui eodem motu concitati in eundem locum ruant, precauendum est, & hos & illos à parte in quam fluunt, vel fluxuri sunt, longissimè auocando: Reuelluntur enim humores non qui in affecta sunt parte (hi enim propriè ex parte affecta aut vicina euacuantur) sed ii qui ad partem aliquam fluunt, aut fluxuri sunt, quæ ratione cauetur & prohibetur ne pars affecta humoribus affluentibus repleatur. Et qui sic operantur non timent ne putris humor reuocetur & puro sanguini permisceatur, quia si à parte affecta retrahitur, cum puro foras euacuabitur, atquè sic vacuata influente materia ad directam sectionem tutò confugere datur, vt proximè secantes afflicta etiam partes quo iam premuntur onere, subleuemus.*

Quibus peractis si nec cesserit malum, cucurbitulas etiam parti affectæ affigere

consultum videtur, profundis scalpello
Lib. cap. iniectis scissionibus. Scio Aræteum post
 septimum id agere, Æginetam decimum
 quartum expectare, verum in his dierum
 numerus præfigi nequit, quod pleuritides
 aliæ alijs sunt acutiores. Ego D. Carolo
 de Miraumont Celeber. Monasterij Sancti
 Bertini in Sithiu religioso Archiarum Præ-
 posito, à sexta in brachijs sectione, vacua-
 tis ferè quinquaginta sanguinis vncijs, ex-
 acerbato subinde malo, post septimum fœ-
 lici successu applicui, pluribus iniectis
 profundis & magnis scarificationibus:
 Quod & in Illustris Domini Vice-Cô. de
 Lieres huius Ciuitatis Gubernatoris, Rhæ-
 dario perseverante malo post reiteratas
 sextum sectiones, subinde sopito & resusci-
 tato, facere coactus sum, euacuata foelici-
 ter reliqua materia.

Alij sunt qui omnibus ex arte factis
 contumaci perseverante dolore, humore,
 ob malignitatem, concoctionem non pa-
 tientem, thoracem perforari consulunt (sicut
 Fontanus, vt materia coniuncta sectione
 vacuetur. Tentatis, inquit Hollerius, om-
 nibus remedijs, siquidem desperatio est &
 vires tolerare possunt, cauterium actuale
 aut potentiale lateri inferendum.

Reue-

*Exercit.
de pleur.*

*Lib. 1. 16.
cap. 26.*

Reuera id multoties fieri posset, nisi remedium vt nouum, & ignorantibus crudele & dubium, calumniae medicum exponeret, quippe vt postea dicitur, cum non omnis pleuritis sit apostema cum collectione, sed phlogosis quaedam erisipelati affinis, aut anthracino tumori simillima, ob humoris prauitatem & ferociam, sit profectò saepe, quod acutissimi dolores à pauca fiant materia, vnde continget, quod perforato thorace è regione doloris, nil omnino effluet, nec dolorem sedari continget cum medici infamia, licet omnia ex arte facta sint.

Sic tamen affecti ex eo dignosci possunt, quod in latus aegrum non melius iaceant, vt ij quibus magna adest collectio, nec in sano melius habent, pulmone ad se pleuram trahente, quae sicca inflammatione afflicta nullam patitur distensionem, sed in dorsum supinos omninò illos decubere necesse est.

Quod si reuera collectiones apostematibus intra pleuram & costas, vbi frequenter fit, vel in mesopleurijs esse conijcitur ex pulsatili & grauante dolore, faciliore in latus aegrum decubitu, difficili in sano, non videtur à ratione alienum omnibus alijs

alijs remedijs irritis, sectionem illam admittere, maximè verò si tumor aliqualis, vel fluctuatio in conspectum, vel tactui se obtulerint, quibus rectè examinatis vel scalpello iniecto, vel pyrotico thorax perforabitur, & parua cucurbitula ad materiæ euacuationē applicabitur. Cōmodissimè in pleuritide notha quod ait Rhasis, in qua rubor in conspectu se dat & tumor, aut simul per sympathiam, interna & vera facta, talis sectio perficitur.

Scissionis & pyrotici loco, Martinus Rulandus vomitoria interna ruptoria excogitauit, sic cēt. 1. cura. 14. & 81. & cēt. 2. curat. 29. & 52. & centur. 3. curat. 18. in pleuritide sicca, lethali & vehementi: & centur. 4. cura. 11. vomituo ruptorio ex aquæ benedictæ vncia vna exhibito, rupto abfessu ægri purulēta, saniosa, & varia spuerunt & sanati sunt.

Ego, vt dicam quod verè sentio, tales ex aqua illa benedicta curas à medico solerte fieri posse existimo, cum enim illa aqua ex mercurij emetici infusione fiat, aut regulo croci metallorum, aut turpeto minerali & similibus emeticis validioribus, accidit quod diaphragmatis validiori contentione & pleuræ consensu, collectio soluatur.

ARTI-

ARTICVLVS QVARTVS.

Ideæ Præcedentis fundamenta & Conclusiones.

Qui in pleuritide directam perpetuò secandam docent in praxi, nec secum, nec inter se conuenerunt. Valesius in renis inflammatione, ad reuulsionem perpetuò saphenam tundit: Fernellius cōtra in cubito, Fuccius in vteri inflammatione stat cum Valesio ex Galeni nō satis intellecta doctrina. Fernellius cōtra. Hic humero affecto, secat in cubito directo, eo affecto, in manu directa, Celsus contra ex opposito: at oppositam secantes perpetuò sibi consentiunt. Missis itaque directè secantium inconstantijs, videndum, numquid possit certum de venæ sectione reuulsiva demonstrari, quod vt assequamur,

*Cap. 7.**lib. 2. 16.**Lib. 2. 6.**10.*

Primò determinandum est quid sit reuulsio. Secundò quid sit pleuritis: tum eius differentia & morbi tempora distinguenda, vt quo tempore reuulsio maximè conueniat & quo non determinetur.

Igitur vacuatio per venæ sectionē ex doctrina

*Lib. 1. th.
cap. 9.*

Strina Galeni triplex est. Vna absoluta vocata, altera quæ reuulsio dicitur, alia deriuatio. Euacuatio simplex vt genus, est sanguinis, qui citra motû vllû peccat, sine vllâ ad has vel illas partes respectu euacuatio. Deriuatio, est eorum quæ partem aliquam obsident, nondum tamen impactorum, sed adhuc fluxilium, euacuatio.

Reuulsio est eorû quæ ex quauis sede, in partem aliquam feruntur & influunt, vel etiam in fluxura sunt, per contrariam partem ad quam feruntur, retractio & euacuatio.

Pleuritis verò propriè, est membranæ costarum succingētis inflammatio, sicut placuit senioribus medicis, Apollonio, Diocli, Erasistrato, Asclepiadi apud Cœlium, definitur sic à Galeno

*Acut. lib.
2. cap. 16.
ad Glauc.
2. cap. 1.*

πλευρις ὁ ἐστὶν ἡ τῆς τῆς πλευρᾶς ὑπεζωκότος ὑμῆνος φλεγμονή. siue per consensum, siue primariò laboret. Hanc similiter definierunt alij principes græci, Ætius. Cap. 6. tetrab. serm. 8. Alexander Cap. 1. lib. 6. Paulus Cap. 33. lib. 3. Orribasius synopsis lib. 9. Cap. 7. Aræteus sic descripsit plenissimè. In hac cum phlegmone suborta fuerit, ignis adest cum tussi & sputis varijs, dolor acutus ad iugula ascendens, decubitus in latus inflammatum facilis est, in sua enim ipsius sede collocatur, in oppo-

*Lib. 1. de
signis
acut. cap.
10.*

ARTICVLVS IV. 29

positam verò partem decubitus dolorem con-
sistat à pondere & phlegmone & suspensione,
omnes membrana continuas partes ad hu-
meros usque & iugula, quibusdam verò & in
erga & in dorsi scapulas dolor protenditur,
tempè quia tenuis membrana robusta ossibus
inharens, cui nomen succingens inditum est,
sub costis, dorso, & internis pectoris, ad in-
gula usque substrata est: perfecta sanè pleu-
ritidis legitimæ descriptio. Nunc ad dif-
ferentias.

Pleura primariò affectu laborante Ga- Lib. 1. de
loc. aff.
leno exquisita dicta est, & primaria, quam
contra apostema posse consistere cōtra Gar-
linum notauimus cum Diocle, Praxagora Lib. 2.
acut. cap.
16. lib. 2.
ad Glauc.
cap. 7.
& alijs apud Celium: rationem reddente
Galeno, *Apostema inquit partium est dis-*
positio, in quibus inuicem distant qua prius
se contingebant corpora, spatium igitur in
medio vacuum fieri oportet, quod substan-
tiam spirituosam, aut humidam, aut mixtam
ex utrisque comprehendat. At pleura cum
simplex sit membrana & tenuissima, illam
unitatis solutionem & diuisionem non ad-
mittit, quæ cogitans Ioubertus inquit,
Costas succingens membrana, tenuissima cum Li. de aff.
inter tho.
cap. de
plura.
sit, multum simul humorem coaceruare & con-
tinere ad phlegmonis generationem non po-
test.

test, & vix crispelati sustinendo sufficit,
unde succingēti membrana non ausim phleg-
monē attribuere, sed phlogosim potius: quam

2. Ad

Glauc. c.

2. path 5.

9. 11.

Galenus à phlegmone distinxit, quod ex-
plicat Heurnius addens, Pleuritico affectu
mortuis, experientia per sensum ad oculum
demonstrauit aperto thorace non semper col-
lectionem apparuisse, nam in primaria pleu-
ritide acerbè dolent à mole non magna, im-
hac dolor non est pulsans, sed tensius &
punctorius, & difficultas magna spirandi.

Enimuerò in quibusdā pleuritide mor-
tuis, pleura valde tumefacta comperta est,
& substrata illi costæ nigræ (vt fulmine
ictis) apparuere, non aliter quam si quiss
tenuissimam aliquam membranam humi-
dam igni exponeret, aut aquæ calidæ im-
mergeret, facile illam tumere efficiet,
quod, se gonfler, dicunt Galli ab Italo Gon-
farsi & hi à Græco ὀγκώδης γίνεσθαι ex qua
animaduersione fortè accidit, quod qui-
dam neoterici, pleuram peritoneo cras-
siorem dicerent. Numquid igitur pleuritiss
est apostema? sanè frequenter, cum inter
pleuram & musculos, aut costas, aut inter
musculos ipsos fit collectio, in ipsa enim
musculorum carne collectionem etiam
fieri posse asserit apud Celium Appollo-
nius

ARTICVLVS IV. 31

nius, sicut & Hollerius, pleuritim veram à *Cap. 13.
li. 2. acut.* loco triplicem faciens, vel enim fit, ait ille, in succingente costas, vel perioftio, aut in musculis intercostalibus, notha in musculis externis.

Docemur igitur à Galeno pleuritidem vnā esse exquisitam (de qua supra) vel primariam & periculosissimā vt plurimum, aliam per cōsensum, distinguit præterea in internam & externam, quam posse in internam transmutari asserit, quod thoracicæ externe apices ad interiora etiā terminentur, tum quod doloris ratione ab internis partibus & venis fluxio facilè proritatur. Internas pleuritides veras vocat Fernelius, externam notham, qui inter- *Lib. 5.
path. cap.
11.* nam ex situ duplicem facit, eam quæ ad clauiculas dolorem exhibet, totum thoracem occupans, alterā quæ ad hypochondria, quas per azygotam fieri contendit.

Laurentius ex quatuor venis per quas pleuritidem fieri putat, quatuor pleuritidum facit differentias, sicut & Duretus, *Comment.
in Com. c.
de pleura* primam per intercostalem, secundam per azygotam, tertiam per mamillarem, quartam per thoraciam; ita intercostalis tres aut quatuor ad summum costas superiores urget, mamillaris sternum & mediasti-

num

num, azygota octo inferiores, thoracica faciet externam & dorsalem.

*Path. lib.
5. cap. 11.*

Heurnius cum Laurentio conuenit, sed pestilētem addit, hæc inquit in diaphragmatis regione, à sanguine prauo & putrido fita est, nasci interdum solet per febres pestíferas, dum malignitate humoris concitata materia, nullo consistere loco potest, tandemquē per phreneticos ramos, in diaphragma eliditur, diaphragma verò vexatum, ilico pleuram in consensum trahit, nam sobole eius, superficies diaphragmatis, qua thoracem respicit, tegitur.

*Emens.
91. in
Mund.
enat.*

Matheus Curtius cum Auicenna 10. tertij tract. 4. c. de pleurit facit mediastinam (quam acutissimam censet) per diaphragmatones ab azygota enatas, non per mamillarem, vt supra Laurentius.

Distinguitur præterea pleuritis in primariam & eam quæ alteri morbo succedit, vel per metastasim vel apodosim: sic ab angina in pleuram fit conuersio.

*Lib. 3. f.
10. tract.
4. cap. 1.*

Distinguitur iterum à materia, quod alia sit sanguinea, alia biliosa, quæ doctente Auicenna frequens est, quoniam inquit *membris tunicosis non penetrat nisi subtilis cholericus* (quod potissimum de exquisita pleuritide intelligendum esset) ex me-

lan-

lanchoha autem putrefacta raro, quandoque
ex phlegmate putrido: Porro per aphor.
Qui acidum ructant, raro pleuritide in-
festantur, quales sunt melancholici; Alia
à pestifero humore; quæ proprijs signis
humorum distinguntur, de quibus consu-
lendus Auicennas lib. 3. f. 10. tract. 4. C.
6. & alij.

Distinguitur vltimò, in dextram & si-
nistram, quòd hæc per experientiam pe-
riculosior habeatur, rationem dedere ali-
qui cordis viciniam, non satis solidè, cum
in pulmonum medio radicetur, alij par-
tes dextras sinistris fortiores, potior ratio
videtur, quod plurimis, quod notauit
Vesalius sinistri pulmonum lobi, cum
pleura coalescunt, vndè anhelitus diffi-
cultas maior consequitur, & talem con-
stitutionem nactis periculosior sit pleuri-
tis necesse est.

Sic enarratis pleuritidis differentijs
dicendum, illam sicut & alios acutos mor-
bos habere tempora quatuor, Principium,
augmentum, statum, & declinationem,
quibus constitutis, quo morbi tempore re-
uulsio ad opposita conveniat, queritur.

Dico primò in pleuritidis declinatione
sanguinem nullo modo mittendum, sua-
dente

34 ARTICVLVS IV.

Therap.
2. C. 3. dente Fernelio, quia inquit: Si quis hoc tempore venam incidere ausit, non secretos duntaxat humores, sed pariter utiles eliciet, quodquè grauius est, eos qui natura vi secreti fuerint, puro sanguini permiscebit, hinc inquinabit & confundet omnia, naturalemque molitionem optimam interturbabit.

Lib. 1. 1b.
C. 13. Dico 2. in statu vacuationem ad opposita non conuenire docente Fernelio, quod natura coctioni, & separationi tunc intenta, ab opere auocanda non est, & cum iam manifesta coctionis signa apparuerint, non amplius vena sectione opus est, præsertim si febris sopita sit, attamen si statum partitum licet, in status principio, maximè si febris adhuc adfuerit, sectio è directo deriuans & à parte affecta putrem materiam euacuans conuenire potest, vt natura partem oneris leuata, quod reliquum est, facilius euincat.

Dico 3. in augmento ferè toto, cum humores sunt adhuc in fluxu venæ sectionem reuulsiuam ad opposita conuenire, siue plethora adsit, siue non, maximè tamen si adfuerit, quoniam tunc febris vehementer vrget, & frequentissimè plethoraadest, in quo opere plurimùm requiritur medici solertia, vt quantum opus sit reuellendo

lendo vacuet, & confestim ad directam sectionem se conferat.

Dico 4. potissimū in principio toto, quod quarto concluderunt authorum plurimi, euacuatio ad opposita reuellens instituenda est, siue adsit plethora, siue non, at illā presente maiori vacuatione opus est, in primis verò, si pleuritis febrē subsequatur.

Hic animaduertendum est, principij non eandem rectè constitui latitudinem, nam vt alij morbi, alijs sunt longiores, sic & eorum tēpora, sunt enim acuti, peracuti, & acutissimi. Propriè autē principium metiri solēt medici, ex humoris cruditate, an sit verò futurum lōgum, conijciunt ex anni tempore, tempestate, ægroti ætate, temperē, excretis, regione, fluxionis motu & celeritate, symptomatum sæuitia & pernicie, sic in Coac. sputum in pleuriticijs, si tertio coqui incipiat, breuiat, si post, contrā. Sic & Auicennas docet: Hinc Fernelius th. 2. cap. 13. concludit: *Quod si metu, aut ignauia, alijsquē occasionibus uena sectio primis diebus administrata non est, quocumque die, etiam vigesimo in agrum incideris, si plenitudinis & cruditatis signa permanserint, hoc præsidiū genus est adhibendum, modo vires ferant.*

Ex aph²
10. lib. 4.
& 22. l. 1

Lib. 3.
tract. 4.
f. 10. C.
de plen²

Quæret quis, cum tot sint pleuritidis differentia, an præcedētia sint obseruanda.

Gal. th. 10. l. 14. Respondeo 1. si materiam spectemus, in pleuritide à pituita putrida, vix prodesse venæ sectionem, sicut & à melancholia, potius enim vitam cum sanguine elicies, quam coniunctam materiam, cum doloris leuamine euacues, & tamen hic ratione ad fluxuræ materiæ, posset etiam opposita secari, maximè si corpus plethoricum febris vrgeat, porrò ratione motus materiæ Hispani & Catellani referente & docente Marsilio Ficino in epid. antidot. cap. 8. etiam in Bubone pestilenti in axilla sinistra, subitò à manu dextra, minuunt sanguinis vncias sex, vel quatuor.

Resp. 2. si pleuritidum differentias ex situ spectemus, in cuiusvis principio oppositam basilicam tutò secari posse.

Primò, in ea quæ superior est, quæ fit per intercostalem tutissima erit reuulsio, quia fluentem ad oppositam intercostalem sanguinem (quod fatetur Gardinus) in lacunæ biuio intercipient, quod de mamillari & thoracica æqualiter asseritur, quippe qui ab ostio subclauia reuellit, quod opposita sectione fit, necessariò ab omnibus illius subclauia propaginibus, quales sunt
mamill-

mamillaris, & thoracica reuellit, contra
 qui reuulsionis causa, respectu stolonum
 subclauæ directæ. in principio directam
 secant, totam sanguinis massam totius la-
 cunæ & partis oppositæ, in ipsam conuer-
 tit: quippe quod sanguis ratione continui
 & vacui, ad basilicam attractus ex lacuna,
 in istarum venarum, seu stolonum ad sub-
 clauiam patentia oscula, facile prono flu-
 xu incurrit, vnde fluxionem & infartum
 augeri necesse est & malū. Et sanè ostio-
 lorum istorum fabrica, à natura sic dispo-
 sita est, vt per maiores alueos fluentem
 sanguinem commodè excipiant, qui alio-
 quin facile præterlaberetur, ostiola illa
 minora eludens, hinc est quod, si ab ad-
 uerso sanguis retrahitur, (quod opposita
 sectione fit,) facile ex illis euacuatur,
 vel ad minimum ab illis auertatur, secus
 autem si directa sectione, inferiori aliquo
 foramine sanguis duceretur, quippe po-
 tius in illa ostiola deducitur, trahentibus
 continuò ad se venis minoribus, à maio-
 ribus alueis, sic qui ex fluminibus, aut
 alueis maioribus per riuos in prata aquas
 deducere (quod παραλείπειν est) gestiunt,
 alueolos ex obliquo ad maiorem aduer-
 so fluxui adaperiunt, & si contra face-

rent nihil vel minimum aquæ reciperent.. In ea tamen quæ per intercostalē fit pleuritide, si non ad sit plethora, nec febris vehemens, è directo venæ sectio fieri potest, sed hæc rarò accidit, nec periculosa est.

Secundò, & in ea quæ per azygotam fit: pleuritide conuenientissima erit opposita reuulsio, confessum est vtramque basilicam ab eius anastomosi æqualiter distare, per quam fit fluxio, & propterea æqualiter: hoc respectu reuellere, cum autem vt plurimum per eam fiat pleuritis, si Fernelio credimus, & vt plurimum opposita erit secanda, allatis supra rationibus insistentes..

Tertiò, in pleuritide, quæ Hypochôdria occupat, siue inferiori, siue lumbali, siue: quoquomodo libeat illam appellare, optimè etiam opposita secabitur, & proderit, nam etsi Hippocrates spreta venæ sectione, quam hic improbare videtur, purgantibus illam adoriatur, Galeno tamen hic adhærere malumus, *vbi inquit non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis, verum & cum febre vehementissima, vitanda est omninò purgantis medicamenti administratio, atquè per sectionem venæ vacuandum magis, etiamsi ad Hypochondrium dolor finiatur, quia nullum ex eo quod per venæ* *sectio-*

*De Viâ.
in acut.
eoment. 2.*

sectionem fit, periculum impendet, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem tentatur. Quia igitur ratione doloris, & febris, periculum est, ne affluxus fiat, etiam citra plethoram hic etiam tutissimè oppositam secamus.

Quartò, & in externa quæ per thoracicam fit, cōueniet sectio ad opposita reuelans, ne directa sectione proritata fluxione, auctis inde doloribus, de externa fiat interior, quod sæpissimè accidisse vidimus cum ægri periculo & morte.

Quintò, & in ea, quæ intersepientes membranas occupabit, quam mediastinam vocant, cōuenit ἀντίπασσις opposita, ^{Vesal.} quoniam ipsis, quæ illæ dorso continuantur ^{Fab. hū. l. 3. C. 7.} ab azygota surculi offeruntur.

Sextò, si pestilens fuerit pleuritis ex praua cœli constitutione, quod το θῆον dixit Hippocrates, venæ sectio vehementer nocere posset, quia tunc ab excellenti quadam & magna putredine sanguis corruptus est, quod notauit Heurnius path. lib. 5. cap. 11. vnde proprijs amuletis & alexiterijs, tam cardiacis, quam sudorificis profiganda est.

Hæ conclusiones vltèrius non probantur, quoniam in aduersæ sententiæ ar-

gumentorum solutione, probationes pro nostra sententia proferemus, sicut & in excursionem ad quærelas cōtrasentientium, & in destructione fundamentorum ipsorum, ex quorum euerfione, nostras demonstrationes eruemus, pro quibus sit

ARTICVLVS QVINTVS.

Aduersæ sententiæ fundamenta.

ADuersæ sententiæ Authores alij, alia cōmēti sunt fundamēta, quidā ad *κατ' ἑξῆς* Hippocratis, tanquam ad sacram anchoram confugerunt & eam suo modo explicarunt, quam quidam per criticas euacuationes, quidam per fibrarum rectitudinem, & ductum regulari voluerunt. At alij, cum ista vana & infirma viderent, anastomoses prætexuēre & in subsidium aduocarunt, & hi sunt nouissimi, quorum primò examinabimus fundamentum, & licet Gardinus his prolatis, gloriatur se quid nouum, & paucis cognitum docuisse, manifestum tamen sit ex Articulo 1. sect. 2. Gordonium illas, in Lilio suo vulgares fecisse. quin & Galenum de his operosissimè, sicut postea patebit disputasse.

Ergo

Ergò opere prætium videtur, quid sit anastomosis, & an vnus sint modi, an plurium, & eorum causas finales, idest cur sint disquirere.

Anastomosis, nihil aliud significat, quam oris aut osculi hiatum, aut apertionem, laxationem, qua significatione Aristoteli de generatione animalium ἀναστομῶσαι πόροι, scilicet terminales, aut venarum apicales, significat etiam arctationem, in fauces compressionem, vnde placet & illius interpretatio de originalibus lib. de mundo ὁκεανὸς κατὰ στυγερὰς ἀνχενας ἀναστομώμενος, oceanus in fauces se comprimens, sic στόμαξά νῆλξ, porrò vt oceanus ex immensa vastitate in fauces, & Nilus in brachia coarctatur, sic microcosmi oceanus, lacuna, quam ventrem κοιλῆν veteres dixere, in binos vtrinque alueos, degenerat & multiplici ramorum serie, microcosmū irrigat.

Originalis anastomosis finis, est illa ab Hippocrate celebrata totius conspiratio, per quam venarum vltimi apices cum lacuna, corde, pulmone, hepate sociantur.

Per has originales anastomoses, totius corporis venæ in lacunam per multas coitiones intermedias coeunt, ab ea sanguinem attrahunt, sicut & arteriæ

Lib. de
alim. &
loc.

Nat. fa-
cul. 3.
cap. 13.

riæ ab aorta, & partibus quibus famulantur, eundem indefesso labore subministrant.

Quinque ad lacunâ præcipuæ sunt principum venarû anastomoses, quippe partes superiore iuxta iugulum, hinc inde subclaviæ duæ ἀναστομῶσαι, parte inferiore iliaca similiter binæ. At verò, paulò supra conazygota ingenti anastomosi dextro lacunæ lateri adaperitur, cuius putealis, siue ramus princeps, seu lacuna, ad octo inferiores costas vtriusquè lateris, progenies multiplici sobole diuisas, distribuit, in quibusdam tamen corporibus è sinistro sui latere progeniem mittit, quæ tria costarum etiam superiorum interualla (intercostalia munere fungēs) enutrit. Talis est azygotæ verus ortus è directò vertebræ tertiæ costæ iuxta iugulû & illius dubia propago. Per huius venæ propagines ut plurimum fit pleuritis (si Fernelio credimus) ex tenui biliosoque sanguine, qui ex vena cava cordi ascendente, in eam quæ azygos nuncupatur, at deinde in tenues costarû venas, impetu quodam incurrit, ex quibus apertis aut disruptis exilit, inciditq; aut in musculos mesopleurios, aut inter costas & succingentem membranam, præter has principes venarum et lacunæ

Lib. de
part.
morb. c.
11.

lacuna progenies, postquam lacuna ascendens azygotam progeniit ad iugulum rectà delata, antequam in duas fauces coarctetur, ab anteriori sede magnæ illius in iugulo bifurcationis, duæ prodeunt venter, quæ secundum xyphoidis latera descendunt (quas mamillares vocant) hæ insigniores aliquot ramos rectis musculis abdominis porrigit, & in plures ramusculos circa vmbilici regionem, in glandulas terminantur & obliterantur.

Hæ mamillares, interdum à subclauia-um radicibus postquam nonnihil à iuguli medio processerunt, oriuntur; Aliquando verò, alteram illarum à subclauia, alteram ab ipsa bifurcatione prognatam obseruabis. Sed etiam non infrequenter solitaria à medio, & anteriori lacunæ sede exoritur, & in duos fisa ramos, vtroque xyphoidis latere descendit. adeo incertus est mamillarium ortus, & anastomosis originalis, ratione cuius tot turbas excitauit Gardinus.

Enimuerò, subclauia statim à principio sui, intercostalem de se promit, qua duas, aut tres costas superiores exilibus admodum ramusculis alit, dum azygota eius munere non fungitur, sed & hæc à trunco lacunæ

lacunæ, etiam aliquando exoritur.

Dum verò subclauia thoracis cavitatem superauit, axillarem constituit, quæ thoracicam progignit, ea secundum latus & dorsum progenies suas spargit ad extralacet licet aliquot eius apices interius penetrēt. Per hanc, inquit Fernelius, si sanguis in externos musculos effusus fuerit, ea materia quidem veram, at ex situ notham pleuritim facit.

Sunt & aliæ, aliarum venarum ad lacunam, aut his proximè enatos stolones anastomoses, porrò lacuna ilicò ac diaphragma tangit, duas illi non vulgares offert propagines, per vniuersam septi sedem multiplici sobole excurrentes (phreneticas vocant) quin & ramulos quoque cordis inuolucro (capsulares dictas) diffundit ubi vero lacuna cordis ipsius ventriculo dextro, anastomosi connascitur; venulam (quam coronalem vocant,) ministrat, quæ cordis basim ambiens, ad conū ipsum progenies mittit.

Enimuerò, azygota diaphratontes dictas venas membranis thoracem intersepiantibus elargitur, qua illæ dorso continuantur.

Multæ sunt aliæ ignobiliore propagi-

ne

es à lacunæ parte superiori enatæ, vt musculæa, thymica, & aliæ; quæ omnes vel in lacunam ipsam, vel eius faucibus, anastomosi iunguntur originali, quas hic recenseri oportuit, quoniam per eas anastomoses, fluxiones ex lacuna fiunt, quæ morbos laterales, siue pleuritidum supra articulo 4. descriptarum differentias, invehunt.

Inferioris lacunæ pars, simulatque ad sacri ossis basim peruenit, iliaci alvei illi aperiantur, ex quibus alveis paulò infra, epigastricæ oriuntur, quæ per rectos abdominis musculos, sursum repentes circa vmbilici regionem, terminantur, vbi mamillaris descendens apices finiri ad glandulas, diximus.

Sicuti vero subclauia ramorum multiplici serie, & diuisione ad manuum extrema per cubitum, vbi basilicam & alias venas constituit, peruenit & finitur, sic iliacæ per crura delapsæ ad pedes terminantur, vbi saphenas, sciaticas, & alias ibidem venas constituunt, sicut videre est in figura prima in fine Articuli 5. posita. Ex quibus patere arbitror, omnes iam venarum progenies, vel mediata vel immedia ad lacunam pertingere, per anastomoses originales.

Has

Lib. de
usu part.
6, cap. 21.

Has verò originales anastomoses etiam
diffimulato termino, exortus velit nomi-
nare Gardinus, anastomoseos termino nos-
edocuit Galenus, vbi anastomoses vaso-
rum in corde assignat, lacunæ, arteriæ
magnæ, venæ arterialis, & arteriæ venæ-
lis, quæ sunt vasorum istorum oscula im-
coriplum hiantia, *Natura inquit, arte-
riam magnam ad crassum quidem & densum
pulmonis, ad tenuè verò & rarum, venam ca-
uam per anastomosim applicat. & vas hoc im-
fætibus ex caua quidem vena sanguinem, per
quandam magnæ magnitudinis anastomosim
recipit.*

Terminales anastomoses, sunt venarum
capillarium insensibiles pori per totum
corpus dispersi, multitudine infiniti, de
quibus Galenus lib. 3. de usu parti. cap. 4.
*Mirabili artificio à natura factum est ut quæ
ex venarum orificijs elabuntur substantiæ
totum cerebrum permeent. Tales sunt por-
tæ propagines chylum in hepar deponen-
tes, tales lacunæ ab eodem hepate chylum
iam in sanguinem conuersum attrahentes.*
Ista venarum oscula path. lib. 5. cap. 3.
extremas arteriarum partes nominat.

Est ergo anastomosis terminalis, porii
apicalis, insensibilis & moderata laxatio,
siue

sive ad deponendam ex ministerio commissam materiam, sive ex officio trahendam. Attamen illa reclusio, sive osculi latitatio, tamdiu naturalis est, quamdiu in laxatione, aut reseratione sua, symmetriam retinet, nam si iustum modum excesserit, morbosa fit passio nomine immutato, sic fluxus ventris si modum excesserit, morbosa fit solutio.

Tales vitiosas anastomoses docet Galenus fieri in sanguinis sputo, *παλιν* inquit *Lib. 7. th. 2. de C. R. per v. s. c. 8.* *ἀναστόμωσιν* τι τῶν ἀγγείων sic & in fluxu hepatico, & licet diapedesi hæc fieri dicat Gardinus, non anastomosi, contrarium tamen sentit Galenus ibidem docens *γίνωσθαι* ἂν ποτὲ καὶ δι' ἀναστόμωσιν μικρῶν.

Patet ergo ex præcedentibus, quod terminalis anastomosis finis, est sanguinis exacuna, ad partem cui famulatur attractio, quippe isto ministerio, omnes corporis partes alimentum recipiunt.

Sunt ergo venarum anastomoses terminales, sunt originales quas sic distinxi doctrinæ clarioris gratia, & vt Gardini Academici captionibus obuiam irem.

Tertiam Galenus dedit anastomoseos differentiam, scilicet eam qua duæ venæ in medio membri cocunt, ita vt ex duabus

Lib. 3.
de anat.
adm. cap.
12.

bus venis vna fiat, quæ rursus in duas aliquando finditur, & huius pars aliquando iterum cum alia coit; per quam anastomosin venæ propriè societatem inire dicuntur, sic Lisa & Scalda coeunt & vnum maiore iunctis canalibus alueum, efficiunt, sic Moenus & Rhenus societatem ineunt.

Huius anastomosis modum per coitionem, clarè docuit Galenus passim lib. de ven. dissect. c. 9. *Coeuntibus inter se venis, συνίόντων ἡ ἐκείνων πρὸς ἀλλήλας. ac quæ ex coitu factæ sunt, rursus concurrentibus:* sic vel neophyto Chyrurgo multiplex conspicitur in brachij flexu cephalicæ & basilicæ coitio, docente Galeno εἰς ἐντάνθα συναντισσόμενας, interdum verò celeriter hic in vnum συνίσσας:

Similiter & de hac coitione egit lib. de vsu part. 4. c. 13. *Natura inquit multas venas illas quæ à ventre & intestinis omnibus, ferunt alimentum, ad hepar cum vniuisset, ad portas rursus in quamplurimas illas diuisit; sic omnes splenis progenies in vnum ramum coeunt, sic in hæmorrhoidali intestinales plures, quod clarè sic explicat. Iam verò, omnium quos retuli terminum ora coeunt, & ex vno quoquè duorum coitu, vas vnum confluxile conflatur, ut quos*
unitæ:

unita coierint, præ multitudine & paruitate ne quidem numerare possis. Loquitur autem de coitionibus venarum ex subclauia descendentium, quæ sæpius diuisæ in multiplices ramos, rursus in cubito & partibus inferioribus coalescunt & anastomosi vniuntur; tales sunt Galeno per coitionem anastomoses.

Quod verò Gardinus aut quiuis alius, in azygotæ ramis cum mamillari, aut thoracica, aut in mamillaris cum exigastrica anastomoses per coitionem ostendet; id est quod pernego, cum sensu & experientia, & præstantissimis anatomicis contrà sentiente Galeno, vt postea dicetur.

Huius anastomosis finis, est venarum corroboratio, quippe cum venæ vasa sint debilia & longam viam ineundo, sensim gracilescant sæpius diuisæ, natura illas sæpius coire fecit, vt sic retis modo cancellatæ & sibiipsis copulatæ, adessent & firmarentur, atque sic tutò diuisæ pluribus & remotissimis etiam partibus communicarentur, tum etsi accideret vnâ diuidi ex toto, membrum, aut pars cui talis vena famulabatur, alterius cocuntis beneficio frueretur, sic docente Galeno de

vsu part. lib. 4. Cap. 7.

His anastomosibus sic stabilitis, restat
examinandum, quod volunt quidam

*An Arteriae cum Venis coeant, & quo-
modo: & an sit ex his in illas promif-
cuis materiarum refluxus per
anastomoses.*

AC primò arterias à venis aliquid
trāsumere posse Galeno visum est,
quod dilatandi se potestatem ha-
beāt, qua facultate carent venæ, vnde nat.
facult. lib. 3. cap. 13. *Qua arteria inquit
parte aliqua ad venas se adaperiunt, quod
tenuissimum, maximèque halituosum in ysi
sanguinis est, attrahunt & Cap. 14. propo-
sitionem suam experimento comprobare
nititur, inquiens Quod autem ex venis in
arterias transfertur aliquid, illud satis eui-
denti argumento est. Si enim multis, amplif-
que præcisis arterijs, iugulare animal vo-
lueris, inuenies eius venas & arterias, va-
cuatas, quod sanè non fieret, nisi haberent in
se altera in alterum ora reclusa. Ergo cum
omne dilatatum ad se trahat, non mirum tibi
videbitur arterias omnes, quæ ad cutem fi-
niuntur*

ARTICVLVS V. 51

aiuntur externum aerem cum dilatantur at-
trahere: per apicales scilicet anastomoses,
 nam coitiones arteriarum cum venis ana-
 stomosi, sicut docet Gardinus orat 4 & fin-
 git figura 2. pag. 62. per ferruminationes
 improbat Galenus *li an sanguis cōtra Era-*
stratum, vbi arterias à venis sanguinem
 assumere negat. Porro cum Erasistratei
 assererent arterias sanguine vacuas, spi-
 ritum duntaxat continere, & contra Ga-
 lenus instans demonstraret ad sensum ip-
 sis præsentibus, punctas cultello, aut sti-
 go medico arterias, sanguinem fundere,
 & illo foramine totas euacuari, ratioci-
 nans, quoniam arteria vulnerata sangui-
 nem egredi videmus, duorum alterum sit
 oportet, vel in arterijs sanguinem conti-
 neri, vel aliunde in ipsas confluere; Quod
 aliundè manifestum est vnicuique, an-
 tequam vnitatis eam solutionem passæ es-
 sent arteriæ, spiritum ipsas duntaxat con-
 tinuisse, Atquè si hoc verum est, oportet
 in vulneratis prius quam sanguis egrede-
 retur, spiritum exire conspiceremus, at
 hoc non, sed contra vulnerata arteria ilicò
 sanguinem egredi videmus, vnde procul
 dubio conficitur, antequam vulnus illa-
 tum est sanguinem in arterijs contineri:

Respondabant Erasistratei ilicò spiritum egredi, nec præ tenuitate videri, & subito ex venis per apicales anastomoses, sanguinem sequi, egresso namquè spiritu, primum in postremis arterijs exinanitionem conspicuam fore necessè est & periculum fit, ne locus inanis reddatur, quamobrem patefactis venarum & arteriarum ostioliis sanguis necessariò spiritum abeuntem sequitur: Quæ consecutio ad vacuum, fieri non potest, nisi arteriæ extremitatibus suis cum venarum itidem extremis osculis vniantur.

Quod si in medio per ferruminationes & contiones vnirentur, sicut docet Gardinus, profecto malè Galenus contra Erasistrateos sùpsisset, perforata stilo arteria incubito, necesse esse omnes arterias spiritum vacuari, donec ad vltimas earum apices in corporis extremitatibus peruentum esset, vbi anastomoses arteriarum & venarum duntaxat agnoscere videtur, sicut & in fine Cap. 10. vbi ait. *Cum verò primum ad vltimas arteriarum partes vacuitas peruenit, è venis in arterias adaperitis ipsarum ostioliis sanguinis transit, partim ex inferioribus membris ascendens in arteriam quæ spinæ adiacet & cor intrat, indequè de-*

num sub alam excurrit, partim à capite descendens in arteriam, quæ sursum procedit & ex ea in ceruicis, vulnerisque arteriam postremo deueniens: in qua ratiocinatione nullam facit venarum cum arterijs coitionem in medio, quia si essent, præsto Erasistrateis erat, quod arteriæ vacuatæ confectione ad vacuum, ab incubis sibi venis & coniugibus in medio sanguinem celerrimè traherent, at contra docuit arterias omnes à collo vsque ad ilia, ab aorta prodeuntes, à venis sanguinem non trahere, sed à corde, neque verò diastole arteriarum sanguinem è venis dumtaxat trahere sed vacui & continui necessitate: cum ante diastole ab illis aerè trahi & halitus, aut tenuissima concesserit.

Quod verò arteriæ per terminales anastomoses à venis sanguinem non trahant, imò nequè spatijs inanibus effusum (contrarium antedictis sentiens) docet idem Galenus. *Sanguinem ex intercostalibus locis in magnam arteriam transferri impossibile est, quippe à spiritu, qui à corde per magnam arteriam ad hac loca transmittitur, repulsus ilicò reijcitur.* Negat hic arterias per terminales anastomoses quod assererat Erasistratus, sanguinem aut pus ex-

3. nat.
fac. cap.
13.

De loc.
aff. lib. 5.
cap. 3.

In orat.
4. quod
et passim.

trauasatum transsumere. Declarauit inquit Erasistratus eas arterias, quæ à magna arteria ad singula intercostalia spatia procedunt (quod & asserit Gardinus) per ora quæ ad inflammatam partem perueniunt, sanguinem suscipere. At inquit si tam facilis est per extremas harum arteriarum partes transitus, ut incidens in eas sanguis, tam celeriter vacuetur, fieri non potest, ut impetus inflammationem excitet, eo quod impingi & excidere sunt contraria: addit arteriarum apices esse durissimos, nec facile aperiri, venas motu carere atque ideo ad sugendum & attrahendum ineptas.

Quæ Galeni ratio valet etiam contra venarum & arteriarum anastomoses, quas in medio per coitionem fieri, siue fermentationem asseruit Gardinus. Quippe si a terminalibus anastomosibus, spiritus impulsus, sanguinem reijcit, profectò in media via potentius id efficiet, vnde frustranea erit talis venæ & arteriæ coitio, vel si patentior fuerit anastomosis, sanguinem arterialem in venas propelli necesse est, atque ita sanguine arteriali cum venolo commixto, frequentes erunt diapedeses & abscessus sanguine sic tenuato. *ἡγὰρ ἀπὸ τοῦ ἐν τῷ σπλήνι ἀντὶ τοῦ αἵματος* sic do-

centes

cente Galeno th. lib. 5. cap. 3. & de inx-
qualit temp. cap. 9.

Enimuero arteriarum per apices tra-
ctioni, obstare etiam videtur Galenus con-
tra Erasistratum, qui cor per arterias in-
testinales celiacam scilicet & iliacam &
mesentericas sanguinem attrahere doce-
bat. *Arteria, inquit, ex intestinis & ven-* Lib. 3.
tre, qua crassum graueque nutrimen- nat. fac.
tum in se continent, non possunt aliquid de cap. 14.
quo ratio habenda sit transferre, cum prius
leuioribus impleta sint, vnde sequitur arte-
rias sanguine subtili & spiritu plenas, san-
guinem è venis crassiore non attractu-
ras, quippe quod illas etiam ratione con-
tinui & vacui tracturas contendit, non
diastole, quoniam sistole ilico cõsequitur,
quæ plura deijceret quam diastole sump-
fisset, per quam externum aerem illas tra-
here docet, vel ex venis si quid trahere
possint, id erit, quid tenuissimum maxi- Lib.
meq; halituosum vt ante monuit, sangui- nat. fa-
nis verò substantia & corpus minimè per cul. 3.
diapedesis modum naturalem ἀπαχυσίαν cap. 13.
τὴν χυμῶν.

His addo, rationi & naturæ partium Tb. lib. 5.
consentaneum non videtur, quod arteriæ cap. 3.
venis possint adunari, ita vnum fiant,

quia cum venæ simplici tunica & debili, arteriæ duplici & firma constant, talis vnio facilè solueretur, arteria quo motu præterea valet, venam paulatim soluente, & lacerante.

Quid ergo ad Galeni experimentum dicemus?

Respondeo primò. Experimentum docet arterias à venis trahere posse, motu dilatationis, venas autem quæ motu illo carent tractiuo, non similiter, cum autem pro reuulsione venæ secètur, non arteriæ, non videtur multum referre, si arteriæ trahant à venis aut non.

De loc.
aff. s. cap.
3.

Si dicât venas ratione vacui trahere, dicetur quod non, quia cum nō sint cum arterijs continuæ, quod requiritur ad illā per vacuum consecutionem, obstat ratio suprà posita contra Erasistratum.

Respondeo 2. Experimentum non concludit constanter illarum venarum in iugulato animante, præcisus multis magnis arterijs exhaustionem fieri per anastomoses terminales, aut intermedias.

Primò, propter supradictas à Galeno ipso rationes, quibus contra Erasistratum negat arterias ex venis, aut locis vacuis sanguinem transsumere posse, atque in
aortam

portam deferre: ex quibus, patet ipsum
tibi non satis constitisse.

Secundò, quia ipse Galenus compen-
siosiorē viam eiusmodi vacuationis edo-
cuit, quippe qui arterias & venas, per ori-
ginales in corde anastomoses maximè v-
ni & inter se communicare asseruit, vn-
de nō immeritò Aristoteles cor venarum,
sicuti etiam arteriarum omnium princi-
pium statuisset videtur, principium in-
quam originis, & principatus, cum hepar
radicationis venarum sit exordium.

Quod verò cor ex lacuna venali san-
guinem trahat per principem illam ana-
stomosim, qua lacuna illi dextro latere
adaperitur, omnibus in confesso est, ar-
terias verò à corde eundem sanguinem
attrahere, contra Erasistratum asseruit Lib. 3.
nat. fac.
cap. 4.
idem Galenus, quomodo autem arteriæ à
lacuna per cordis medium trahant, aper-
tissimè docet nat. facult. lib. 3. cap. 14.
*Pari autē modò in ipso quoque corde, ex dex-
tro eius sinu in sinistrum trahitur quod te-
nuissimum est, habente scilicet in se coram
interposito septo foramina & poros quosdam,
quorum tamen ultimos fines (anastomoses)
tum propter paruitatem, tum quod in ani-
mali mortuo omnia sunt perfrigerata ac con-*
den-

defata, contruerti non licet. Hæc ita esse comprobatur ratio, quia cum lacunæ anastomosis ad dextrum cordis ventriculū multo maior sit anastomosi venæ arterialis, & propterea dexter cordis sinus plus sanguinis recipiat ex lacuna, quam vena arterialis ad pulmonem transferre possit; & propter valuulas in lacunam remeare nequeat, frustra tantam in dextra cordis parte cisternam fecisset, imò periculose & temerè egisset, nisi pars sanguinis, illius cisternæ, per medium eius, ad sinistram ventriculum transiret. Hinc Botallus verò cōmento obseruat porum sanguinis ductorem ex dextro cordis ventriculo in sinistram, quem venam nutritiam arteriarum vocat, licet sint & alij quamplurimi minus conspicui.

Hanc doctrinam sequitur Vesalius fab. hu. lib. 6. cap. 14. & Curtius in Mundini Anat. Coment. 35. & Riolanus in anthropographia. lib. 3. *Per venas inquit Vesal. & arterias mutuu fit materiarum refluxus, cordis insuper membranula, omnium materiarum regressum non occupant.*

Nat. fa-
cul. lib. 3.
cap. 13.

Quæ Galeni doctrinæ conformiter protulisse videtur. Sic enim *non ita claudi possunt ora vasorum in corde ut nihil ex ijs recurrat retrò.*

Ex

Ex quibus euidenter probatur Galenum censuisse arteriam magnam, à lacuna venali sanguinem continuò prolicere, & vicissim ab illa in cauam remeare posse, eadem qua fluxerat via.

Quæ si vera sunt, ad quid anastomoses illæ venarum cum arterijs aut terminales aut intermediae? quippe si cor ex lacuna attractum sanguinem maioribus & principibus arterijs suppeditat, cur non omnibus ex se prognatis propaginibus, sicut lacuna suis, subministrabit quod arteriarum principes & aorta per cordis anastomoses sanguinem habeant, docet Gal. *Arteriarum ea quidem, quæ à corde subit ad columnam & quæ porrigitur per spinam & quacunque* *Nat. fac. lib 3. cap. 13.*
ijs præterea sunt vicinae, quacunque per ventrem & pectus discurrunt ex eo ipso maxime corde: eo modo quo ante dictum est ex lacuna venali per cordis interiores poros sanguine transmissio.

Respondeo 3. Præcisè magnis arterijs, venas posse vacuari, citra prætenfas anastomoses terminales. Quippe probatum iam est, per eiusmodi anastomoses nil nisi tenuissimum posse ab arterijs attrahi: At per originales lacunam posse violenter omninò vacuari manifestum est: etenim

vacuatis repentē & impetu per eam scissionem magnis arterijs, cor vitæ fons omnium venarum sanguinem ad se pari motu trahere potis est, dilatatis etiam per vim internis cordis orificijs, violēto duello, quod accidisse visum est, in quibusdam repentē mortuis, quibus cor disruptum apparuit vehementi pathemate affectum, sicut narratur de peregrino quodam nobili in sacro monte Oliueti, & quadam virgine Christo præsente & quærente amas me, & profectò sacræ illæ historiæ incredibiles non sunt. Quippe simile quid accidisse, Guicardino Hætruriæ ducis apud Gallum legato testatur oculatus testis Laurentius, is enim cum ad regis pedes repentē occubuisset, & alij alias mortis adeo repentinæ causas proferrent, aperto thorace, cor eius in tantam molem excreuisse compertum est, vt ferè totum thoracem occuparet, ventriculis apertis sanguinis ingens quantitas erupit, ad libras circiter quatuor, lacunæ anastomosis lacera inuenta est, sicut & valuulæ triangulares, magnæ arteriæ anastomosis ita ampliata & dilatata vt brachij ferè crassitiem æquaret, vnde tanta facta est repentē in vtroque cordis ventriculo sanguinis

*In specu.
lo exemp.*

*Lib. 9.
quest.
anat.
quest. 10.*

guinis refusio, vt cor suo motu priuatum
repentè Guicardinum suffocari necesse
fuerit.

Quibus historijs & rationibus doce-
mur in violento duello, præcis magnis
arterijs, posse repentè lacunam vacuari,
per vim etiam reſeratis oriſicijs, lacera-
tiſque quæ impediunt valuulis, neque o-
pus eſſe ad impotentes prætenſas anasto-
moſes recurrere, quas adeò repentè lacu-
nam vacuare, eſt impoſſibile.

Huic doctrinæ Galeni & Veſalij con-
ſentire mihi videtur Riolanus, *Si valvula*
ſigmoides inquit *impediunt ſanguinem à pul-*
mone in cordis ventriculum refluere, quomo-
do ſanguis pulmonis poterit per venæ ſectio-
nem ad cauam remeare, quandoquidem venæ
pulmonis, nullam cum caua niſi mediante cor-
dis ventriculo dextro habeāt communionem.
Ego inquit exiſtimo tribus, quatuor, aut
pluribus ſectiõibus (quinimò & vna ſi ma-
xima fiat vacuatio) vacuata caua, ſangu-
nem qui in pulmone inundat, ad cor ipſum con-
fluere, demittentibus ſeipſis ſua ſpontè val-
uulis, vt ſanguini viam faciant, ipſo natu-
ræ motu, quo cauet ne vacuum fiat. Quibus
docemur in ſanguinis ſputo, ſanguinem
tuto poſſe etiam maiore quantitate detra-
hi,

Anthrop.
lib. 3. cap.
11.

hi, contra æmophouorum quorundam peritiam, qui in astringentibus per os sumptis nimium confidunt.

Sic ergo confectum est experimentum Galeni, pro terminalibus anastomosibus arteriarum ad venas nihil concludere, originalium verò potestatē omnino probare.

Orat. 4.

propos. 9.
decrati.

Nunc particulariter indagandum, num quod voluit Gardinus constanter asserti possit, nempe arterias epigastricas sursum ascendentes, cum mamillaribus iuxta umbilici regionē anastomosi coitionis vniri.

Reuera id inficiatur Galenus lib. an sanguis in arterijs. cap. 4. vbi docet arterias mesentericas & abdominis, & mamillares descendentes & epigastricas ascendentes, mediante magna arteria sociari.

Fortassis inquit Erasistrati sectatores, ut sita sic continuitate illas inter se proximas opinantur, non aduertentes ab arteria magna quæ spina incumbit, & omnes illas oriri, quæ ad mesenterium deueniunt & plerasque ex illis quæ inum ventrem occupant: Quamquam nonnulla etiam arteria ex inguinibus ascendentes (idest epigastricæ) partim è pectore descendentes, idest mamillares) per arteriam magnam quæ spina incumbit media
hiscē

hisce arterijs iunguntur quæ in mesenterio sunt, quamobrem ab his ad illas non affectionem, non inanitionem, non denique aliud quidpiam transire contingeret, nisi prius in arteriam perueniat quæ spinæ inheret, hac cuiusmodi sint per similitudinem explicare nitar.

Arteriam quæ spinæ inheret perinde atque truncum vnius arboris esse cogites, alias verò ex ea ortas, veluti ramos, & rursus alias quæ à se inuicem diuisæ æquales protendantur, sicut in ramis germina & folia. Quemadmodum igitur folia è diuersis ramis prodeuntia plerumquæ intervallo sibi propinqua sunt, quamuis longo sint exortus processu copulata (nam trunco folia inter se iunguntur) sic & arteria quæ in imo ventre disperguntur, etiamsi propinquæ spatio sint arterijs mesenterij, longo tamen originis intervallo se contingunt.

Quibus clarè demonstratur arterias omnes, sicut & venas, quarum extremitates ob contiguitatem vniri videntur, originali duntaxat anastomosi sociari. Sed de venarum anastomosis nunc etiam seriò agendum est.

Sunt qui venas volunt coire & sociari, *Therap. lib. 5, c. 2,*
ita vt extrema eorum oscula, osculis iun-
gantur,

The. 1. 5.
cap. 3.

gantur, de quibus egisse videtur Galenus dum ait sanguinem ruentem confestim, ἐπὶ τὸ σπυριον αὐτῶν ex eius osculo egredi. sic azygotæ apices, thoracicæ apicibus iungi, similiter & epigastricam ascendentem cum mamillari descendente, & intercostalem cum thoracica coire contendunt, quod notasse videtur Galenus lib. de venarum dissect. cap. 8. *Est inquit alia venarum coniugatio, quæ per rectos musculos ascendunt, deinde extremis coniunguntur venarum, quas sub thoracis subcartilagineo descendere dixi.*

Illas asseruisse videtur Laurentius anat. lib. 4. quæst. 5. cap. ult. & lib. 9. cap. 7. Hollerius lib. 1. de morbis internis cap. 21. & Sclanus coment. ad aph. 26. lib. 1. Amatus Lusitanus similiter & ante illos Gordonius in lilio, licet eas à paucis observatas, & ut quid nouum eas ventilet Gardinus fortè Laurentio credens, qui anatomiz li. 4. cap. 3. eas paucis cognitas asserit.

Propos. 9.
decreti.

Veruntamen in his asserendis, non satis sibi constiterunt: ipse Amatus Cent. 5. curat. 7. contrasentiens docet azygotæ ramos non omninò iungi & copulari propaginibus venæ mamillaris, aut alterius ab axilla descendentis, sed oscula osculis

ita

ita esse propinqua vt copulari videantur. *Anthrop. lib. 3. c. 8.*
 Similiter Riolanus de thoracica & azygo-
 ta sentit. Laurētius aliquādo tres aut qua-
 tuor ramos copulari, non semper, asserit. *Anat. l. 4. quæst. 5.*
 Ipse Galenus mamillaris inquit aliquot a-
 pices, cum aliquot apicibus azygotæ ἀνα-
 μίχυνται τοῖς πέρασι non vniuntur cap. 7. de *Lib. de venar. diff. c. 3.*
 epigastricis sic scribit: *Quæ ex imò suberna-*
tes, supernè venientibus venis coniungun-
tur, sine arterijs ad glandia quadam eua-
dunt. Ex quibus duo elicio.

Primò, eas venas non terminari per a-
 nastomoses & ad inuicem vniri, sed in
 glandulis eius regionis vt corpore com-
 muni coniungi, sicut portæ & lacunæ in
 hepate.

Secundò, non habere comites arterias
 anastomosi inter se vnitas, sicut docet
 Gardinus, vt sectione saphenæ reuelltat &
 vacuet à succubis & coniugibus arterijs.
Quæ doctrina vt clarior euadat

Notandum est Galenum sæpe hæc con-
 fundere, conflueret, commisceri, coniun-
 gere, copulari: quæ tamen omnia anasto-
 moticam vnionem non significant, sic lib.
 de vsu partium 3. cap. 5. *Venæ inquit & ar-*
terie adeo sūt vicinæ ac propinquæ plerum-
quæ, vt quæ in ventriculum, ieiunum, te-

que intestinum & colon inferuntur, sese contingant, in cerebro propinqua adeo sunt arteria, ut sese mutuò contingant, & de usu partium 9. cap. 5. & 15. cap. 12. commiscetur vena arterijs & utraqùe hac nervis, & his ambobus nervi in toto corpore, & paulo post inuenias arterias quamplurimas veluti fibras exiguas, à crassa meninge extendentes, & ab externis intrò subeuntes, sibi què utrasquè ad ossium commissuras coniunctas, & lib. de venar. dissect. cap. 7. permiscetur autem harum omnium venarum extrema, non modo cum adiacentibus, verum etiam cum è regione positis, eodem enim confluunt venarum ad sinisteriorem existentium partium fines, cum ijs quæ ad dextrum, situm habent. Vbi confluentia, similiter & permixtio nil aliud significat, quam approximationem, qua & nervi cum arterijs permiscetur & venis, quæ anastomosi vniri nequeant. contra Prazagoræ sententiam.

De plac.
lib. 1. c. 7.

Notandumquè interpretes Galeni, sicuti loco supra citato de venar. dissect. cap. 5. sæpè pro permisceri aut commisceri, copulari & cōiungi reddidisse, licet præcisè sumpta sint valde diuersa, sicut & eodem capite 5. de epigastricis apicibus occurrentibus mamillaribus agens, pro mittunt
versus

versus extremitates, reddiderunt, coeunt,
 sic, Harum venarum portiones coeunt cum
 venarum aliarum extremis, textus enim
 habet ὀλίγη μοῖρα αὐτῶν εἰς ταύτῃ ἢ κει πέρασιν
 ἑτέρων φλεβῶν. pauci apices eo loco, obuiam
 eunt extremitatibus aliarum licet & cō-
 misceri aliquādo etiam coitionem impor-
 tet, sicut cap. 3. dum venas à subclauia
 enatas in cubiti fluxu, coitu iungit, & è
 duabus μίχθειςαν αὐτῶν maiorem venam
 facit, εἰς ταύτῃν inquit ἵασιν ἐνέμεναι πρὸς
 ἀμύλας. ibi eandem viam ineunt & co-
 eunt in vnum tubum, quod explicat
 capite sexto συναπσόνσαι μὲν τοὶ διὰ πάντας
 ἀμύλας, quas venarum coitiones coniu-
 gia vocat εἰσὶ τῶν τοιῶν φλεβῶν συζυγία
 quamuis non omnes coniuges venæ, sicut
 nequē omnes quæ confluunt & commil-
 centur, coeant & vnum tubum efficiant,
 sed duntaxat συναπσόμεναι ἀμύλας. Ergo
 extremitatum venarum coniunctio, com-
 mixtio, confluentia, anastomotica vni-
 onem non significant, vnde rectè Rioli.
 Anthropograph. lib. 3. cap. 8. docet thora-
 cicam & azygotam non communicare os-
 culorum hiatus seu anastomosi apicali, sed
 contiguitate vicinæ, ad anastomotica
 verò vnionem, requiritur continuitas.

Gal. de
 venar.
 diff. c. 3.

Enimuerò, has anastomoses, siue apicales venarum vniones, nulla probabili, nedum efficaci ratione asseruntur.

Primò, Amatus & harum vnionum siue coitionum assertores, fatentur se hæc in alijs atquè alijs corporibus aliter atquè aliter inuenisse, cum interim natura nil fecerit frustra, frustra que fecisset, vel in quibus non sic fecisset, errasset; Porro ex Galeno & Vesalio satis constat, finem apicalis seu terminalis anastomosis esse partium corporis, quibus eiusmodi apices famulantur, nutritionem, per nutrimenti ad eas attractionem, quod partes ipsæ per venas ipsas à matrice communi lacuna trahunt, & ab anastomosis exsugunt, ad quem finem impertinentes sunt & otiosæ, ne dicam contrariæ & damnosæ anastomoses præsentæ: Quippè quæ contrarium quam à natura edoctæ sunt motum, tractumquè cierent, imò duplicem & quidem contrarios, nempe à caua & ab oppositis sibi venis: Contra quod edocuit Galenus, dum venarum apices particulis membrorum insertas, pecudum multitudini comparauit, quæ in medio positum fœni aceruum, singulæ ad se trahunt; vt verò quod vicinum animal in se iam con-

trahit,

De usu

part. 4. c.

7. Abat.

lib. 3. c. 2.

Facult.

nat. 3.

cap. 13.

trahit, vicinum ab illo trahere non potest, sic qui in quaque particula iam contentus est succus, hunc alteram particulam reuellere, credibile non est, maximè ubi iam agglutinetur & assimilatur: nempe quia iam venis & communi fonte abdicatus, proprius factus est; At verò, quemadmodum cum communi adhuc in aceruo fœnum est, & vicini dentibus, vicinum animal, trahere potis est, sic qui in venarum adhuc sinibus est succus laxus & liberis in τῶνς, ἐν πύλωσις *Facile τῶν φλεβῶν. qua magis valens, magisque nat. lib.* indigens particula est, validius trahens *13. 6. 1.* eum à proximi quodammodò faucibus, in diuersum ad se reuellit, nempe quia diuersarum partium rami multiplices, & diuersi, in communem & maiorem venam anastomosi coitionis vniuntur.

Secundò, si vllibi in corpore terminales anastomoses vsui esse possent, maximè in hepate vtilis erunt & aderunt, sicuti & in vterino iecore, quam placentam vocant quidam, nempe vt materiæ ex mēseraicis per portam in hepar, & ex in eo lacunam ferantur, tum vt per easdem vias mutuo refluxu, & reciproco ministerio, intestina à caua vena sanguinem ad sui nutritionem habere possint, tum &

peccantes humores medicamentis attrahuntur, vel sponte depulsi vacuentur, tum etiam ut ab utero ad fœtum per umbilicales ramos sanguis deferatur; Ac sicuti hic anastomoses nō adsunt, sic nec in illo esse docet Galenus: *Quinetiam inquit venæ quæ in gibbis sunt, non coniunguntur cum ijs quæ in syma sunt, cui cōsentit Andernacus, Symæ partes hepatis transsumentes chylum, cum ijs quæ gibbam perreptant non coeunt, & Fernellius venæ portæ sectione multiplici in omnem iecoris substantiam exhauriuntur, & quæ ab eius conuexo emergunt à caua, eæ quoque plurimos riuulos per iecoris intimam partem, quasi radicibus diffusis mittunt, & hæc nihilominus, neque illis quæ modo dicebam à portis in singulas fibras distributis continuatæ sunt, nequè ad illas extremitatibus se applicant, nequè aliud quidquam præter iecoris substantiam communem intercedit.* Riolanus sic Anastomosis radicū portæ & cauæ (si verum sit aliquam esse) exilis admodum est, crederem potius humorem sanguineum per portæ apices in hepatis substantiam defluere, & Fallopius fatetur, se quacumque etiam adhibita diligentia & inopportuno labore eas inuenire non potuisse.

De vsa
part. 4.
cap. 13.

Anat. l. 1.

Anat. lib.
1. cap. 10.

Antrop.
lib. 2. cap.
17.

At contra hanc Galeni doctrinam Laurentius, & Spigelius, & alij quidam anastomosēs portæ & cauæ afferentes, arguunt.

Si portæ & cauæ apices mutuis anastomosibus in hepate non coniunguntur, quomodo intestina ab hepate sanguinem ad sui nutritionem habebunt, & illa chylum ad hepar ipsum inferent? at verò quomodo natura peccantes in venis humores per interna venarum in lacunam translatos, & ex ea in hepar, tum ex illo per meseraicas & intestina foras, vel proprio molimine vel medicamento attrahentis potentia vacuabit? *Nat fac. 3. c. 13.*

Ad has & similes querelas iam patebit responsio, dum Aseij commentum de chyliferis venis, seu lacteis ab Herophilo olim assertis, examinabo.

Hic enim prædictis quæstiunculis & difficultatibus irretitus, anastomosibus valere iussis, per alias vias sanguinem ex hepate ad intestina, per alias chylum ad hepar deducit, non intelligens quo modo hepar & intestina, concessis etiam prætensis anastomosibus, per easdem vias & venas sanguinem & chylum reciproco tractu prolicerent, multò minus vt per easdem vias hepatis excrementa vacuarentur.

tur citra laudabilium succorum permixtionem & corruptionem, sicut docet Gal. nat. facult. 3. cap. 13.

Reuera si partes per venas, tanquam per folles vacui duntaxat consecutione traherent, commentum Aſelij aliquam rationem præferret, at verò, quoniam partes omnes magnetismo trahunt, nulla est in huiusmodi reciproco confluxu difficultas, hepar enim amicum sibi chylum, vt hospité gratum, ex officio prædestinata scientia, & potestate trahit, fonetque & excrementa propellit, sanguinem eadem scientia, diadosi ad intestina amore reciproco remittit, intestina simili fato sanguinem ex hepate trahere norunt, & chylum ad hepar mittunt, & sanè, si nemo miratur in macrocosmo lactucam, cucumerem, absinthium, tithymalim ex eadem terra diuersos adeo succos qualitatibus & substantia omnino contrarios contrahere, betam albam & rubram eodem loco, sicut & rosas nasci, cur similia in nobis agentem naturam demiramur?

Enimuerò, vt filtra aquam ex labro deductam in terram deponunt, & in terræ parenchymate coctam & spiritibus terreis imprægnatam plâtarum inferi apices exsugunt,

sugunt, ita omnino radices cauæ in hepate à meseraicis depositum chylum & in sanguinem versum, in lacunâ contrahunt. Vis ergo in hepate tractiua ab intestinis, at omnibus partibus, eadem vis congenita ab ipso hepate sanguinem trahere, quod sanè mari interno microcosmi æquiparari possit, à quo fontes in terræ vberibus prodeunt, venarum modo totum macrocosmum irrigantes.

Sed ad Aselium: qui ex Aristotelis auctoritate absurdum putat vnum organum pluribus finibus destinari, & ideo lacteas istas venas asseruit, maximè quod Galenus ex Herophili sententiâ videatur venas quasdam similes asseruisse: non animaduertens, Galenum eodem cap. epilogismo concludere, eos parû naturæ operum gnaros esse, qui negant per quas venas prius ad hepar facta est anadosis, per easdem rursus benignum sanguinem diadosi recurrere: contra Herophilum eam doctrinam confirmans.

Ad argumentum verò ab absurdo: Dico falsum esse vnum organum vni duntaxat fini à natura destinari, contra, natura nares ad olfactum composuit, & tamen ijs dormientes ore clauso aërem trahunt & spi-

*Polit. 1.
cap. 1.*

*Nat. fac.
4. c. 19.*

*Lib. nat.
fac. 4. c. 19.*

spiritum ducunt, præterea & ijs ad cerebri blenam euacuandam vtitur: Numquid & natura cerebri vetriculis abuti videtur? si verum est (quod falsissimum esse puto) in illis spiritus animales generari quod dicunt quidam, spiritum esse promptuaria imaginationis, memoriæ, sicut & iudicij esse domicilia, quandoquidem in illis cerebri excrementa deponantur, & ex primis per medium, in postremum defluant, vt per infundibulum & solita colatoria foras vacuentur, & reuera istam obiectionem suboluerat Galenus dum docet stomachum in nauseis, *contrario fungi ministerio, unde non est mirum venire ex hepate in ventrem & intestina nutrimentum, per easdem vias, per quas prius ex illis in hepar ascenderat.*

*Nat. fac.
3. c. 13.*

Quæ obiectio iterum dissoluitur à Galeno dum & aliud inconueniens Asclj de hepatis impuritatibus per meseraicas non vacuandis, per quas nutrimentum assumunt intestina destruit. *Natura inquit teste Hippocrate totum corpus purgat, redundansquæ vacuat, per easdem scilicet venas intro latis superfluis, per quas antea in corpus fuere deducta: Atquæ si vnum idemquæ os, geminis quæ in contrarias partes diuersis temporibus trahant*

trahunt potentijs subseruiat, prius quidem ei quæ est hepatis, purgandi verò tempore ei quæ est medicamenti; Quid mirum est in his venis, quæ medium spatium inter iecur & partes circa ventrem occupant, duplex esse ministerium & vsum: ita vt cum in his abundantia fuerit alimenti, per dictas venas sursum feratur in iecur, cum autem vacua sunt nutritiquè auent, per easdem ipsas ex hepate rursus trahatur.

Quibus clarissimè docemur, Galenum meseraicis venis duplex ministerium tribuisse, & vnum organum non solum duobus sed etiam pluribus finibus satisfacere, hic enim anadosis chyli & sanguinis diadosis, tum & excrementorum vacuatio & repurgatio per idem organum asseritur, nequè mirum si quod ait & usu venit, ab *Nat. fac.* ultima etiam corporis parte, vsa ad vsque in. *3. c. 13.* testina & ventriculum aliquid translatum peruenit.

Nec verò valere satis videtur eiusdem *Aselj* experimentum, qui canis saginati viui dissecti edulio multo saturi meseraicas venas lacteo succo, seu chylo plenas reperit citra vllum sanguinis, aut eius coloris vestigium: Quod & Galeno contingit in hædi recenter nati videre mesente-

Lib. an
sang. c. 4.

Docente
Gal. nat.
fa. 3. cap.
7. ventri-
culū sub-
tiliori
parte
chylī nu-
triri affe-
tientibus
Christ. à
Vega th.
lib. 1. cap.
11. &
Ioubert.
Parad. 5.
dec. 2. &
alijs.

rio : quippè experimentum duntaxat
concludit , naturam aliquando coactam,
vno duntaxat operi, quasi alterius obli-
tam vacare , cum enim eiusmodi anima-
lis intestina alimento plena sint & disten-
ta sicut ventriculus & meseraicæ, non mi-
rum si his nullū insit sanguinis vestigium,
sed lacteæ totæ appareant, etenim cum sic
saturata intestina, humore chyloso & nu-
tritio grauata turgeant , in eo duntaxat
illa laborent, vt quo premuntur onere le-
uentur, ad hepar ipsum prædestinato sibi
ministerio propulsa materia, de sanguine
ad se trahendo minimè sollicita, tum quia
non egent , tum quia lassata quietem ap-
petunt, quo tempore hepar ipsum, sociam
sibi que coniugem partem, quanta vi po-
test exonerat , cui conamini intentum ,
dum perpetuò validiusquè trahit, nec ab
intestinis ob satietatem sollicitatur , fit
profectò quod meseraicæ tunc temporis
chyloso seu lacteo succo plenæ appareāt.
At vero, si in ieiuno animali mesenteri-
cas examinare libuerit , non lacteo, sed
sanguineo humore plenas reperies, quod
docet Galenus loco supra citato in hædo
adulto: Iam autem tractionis istius neces-
sitas & aliarum partium otium in potato-
ribus

ribus probatur, in quibus serosa potus portio, mirando conatu, sed vero & sensibili per vrinas traicitur.

Hanc doctrinam confirmat Galenus *Facult.* docens, *Venter ex iecore facile trahit, cum* *nat. 3. 6.* *vehementer nutriri appetit & illud nutri-* *13.* *mento est plenum, ita ut cum in intestinis abundantia fuerit alimenti per iam dictas venas sursum feratur in iecur, cum autem vacua sunt, nutririque auent, per easdem ipsas ex hepate rursum trahatur.*

Iam ergo, si lacteæ sint venæ quales asserit Aselius, commonstrare debuit vias, quibus chyli excrementa vacuantur, absolum enim est lyturgiæ naturali, impurum chylum hepati committi, quippe id cauens prudens natura & prouida, splen ipsi tanquam alterum hepar supposuit & opposuit. Hinc frustra essent tot pori à splene per splenicam ad portam, frustra pori eiusdem portæ ad vesiculam, & natura tot ramos à splenico produxisset canali, quod autem hac, natura frustra fecisset debuit dicere Aselius, aut his omnibus aliud, quam Galenus & omnes medici tribuerunt ministerium, affingere.

At verò dum Sisyphi saxum voluens Aselius, antiquatum iam à multis sæculis

com-

*Antropo.
lib. 6. cap.
12.*

commentum renouat, & venarum chy-
liferarum ministerio, quas per pancreas
non per portas ad hepar traducit, ana-
stomoses à neotericis quibusdam in he-
pate contra Galeni sensum confictas de-
struit, & chylilugis venis Riolanus val-
uulas adaptat, ne chylus retrocedat, neue
quod intendit Aselius hepatis excremen-
ta sponte depulsa, aut medicamentis at-
tracta per eas vacuentur & chylum sua la-
be inficiant, Nos Galeni doctrinæ insiste-
tes, etiam citra Aselij cōmentum, ana-
stomoses in hepate venarum portæ & ca-
uæ nullas esse opinamur, perpetuo om-
nium penè medicorum consensu & vsu,
qui hepatis gibba per renes, caua per por-
tas & intestina vacuari asserunt, neque
verò atomis & insensilibus quodāmodo
poris, sigmoidibus illis valuulis opus erat,
ne chylus retrocederet, quoniam intesti-
na ab hepate eum trahere non didicerunt,
neque si sint, illæ impediunt medica-
menti trahentis actionem, si verum est
(quod Riol. post Vesalium cum Galeno
fatetur in corde fieri) materierum scilicet
regressum per potentiores ibi sitas valuu-
las omninò non impediri, adeo vt, si Rio-
lano in cholidocis poris à Laurentio cō-
fictæ

*Antrop.
lib. 2. cap.
12.*

fi&apost Columbum valvulæ, chymericæ
videntur, similiter, & Laurentio in chy- *Anat. lib.*
lidocis poris à Riolano phantasticæ ha- *9. cap. 7.*
bentur, sicut & in azygota & interco- *& lib. 4.*
stoli positæ. *quest. 5a*

Enimuerò, Galenus suprà, contra hæc
& similia commenta, clarè demonstrat,
chylum & sanguinem per easdem venas
cōmeare, quinimò & ab vltimis vena-
rum in corporis peripheria extremitati-
bus, humores ad intestina retrocedere
posse & foras vacuari, citra prætenfas ana-
stomoses in hepate, pro quarum adsertio-
ne, quæ Laurentius adfert, hic etiam exa-
minamus.

Is anat. lib. 4. cap. 6. & lib. 6. cap. 19. in-
quit, quod etiam obijcit Spigelius. *Radices*
tam portæ quam cauæ dispersæ sunt per hepa-
tis corpus atque inter se confusæ, ita tamen
ut plures sint radices portæ per cauam illius
partem distributæ, quam per gibbosam & è
contra plures cauæ per gibbosam quam per
cauam, quod si est, statuendum pauca
admodum apices portæ & cauæ coire, plu-
res verò non vniri, quo supposito, peto
quid agant quæ non coeunt, omnes enim
suum ministerium propter quod sunt, obi-
re necesse est, apices portæ qui in cauæ
pro-

progenies superiores inferuntur, chylum in illas deponunt, vt in inde ad cauam feratur cum in sanguinem versus fuerit, quæ non coeunt, vbi chylum suum deponent? profectò alium depositionis locum non habent quam ipsum hepatis corpus, at in hepatis corpore depositum chylum & in sanguinem versus ad cauam traduci oportet, quod si est, ab apicibus cauæ, quæ cum portæ radicibus non coeunt, attrahatur necesse est, quod si quædam id possunt citra anastomoses, profectò & omnes id posse fatendum est.

Porrò, sic à natura parenchyma hepatis formatum est, vt depositus in illo chylus, & diuturna mora in eo dispersus & per minima concisus, atque ab ipso omni ex parte contactus in sanguinem vertatur, citra quam accideret, si vel cauitatem habuisset, vel venæ portæ cum ijs quæ à lacuna prodeunt per anastomoses prætensas unitæ, continuæ factæ essent, quod Aristoteles docuit dum cor venarum omnium principium decernere voluit, contrà sentiente Galeno, qui hepar principium radiationis omnium venarum tam portæ, quam cauæ constituit, etsi reuera nullum habeant principium, sed à seipsis sint,

neg

*Aristoteles lib. 9.
de part.
animal.*

*De usu
part. 4.
cap. 13.*

nec cauitatem illi attribuit, nec radicibus cauae & portae continuitatem, ne impurus chylus non satis repurgatus, imò neque satis immutatus in lacunam transiret, celerius inquam, quam a matoseos opus requirit.

Quam Galeni doctrinam (suae quodammodo immemor) amplectitur quæst. 2. lib. 4. ubi inquit, *Chylus attenuatus in plexibus & radicibus portae, rudimentum sanguinis assequutus non in colore, sed substantia & qualitate, facile exsudat, ob acquisitam subtilitatem per tunicas venarum (sunt enim in hepate tenuiores quam in alijs corporis partibus) & fluit per totam carnem huius visceris, contactu cuius continuo rubescit: qui postea per diapedesim, aut anastomosim per cauae radices attrahitur.* Et contra Reusnerum sic ab absurdo arguit. Existi- Lib. de prob. v- rina. mat Reus. absurdum esse sanguinem spirituosum venis excidere, & postea in nervos subintrare, nisi duo ista corpora sint continua, at non videt Reusnerus, quod Laurent. libro 4. quæst. 8. sanguis à porta transeat ad cauae radices per medium parenchymatis & substantiae hepatis: & contra Christophorum à Vega. Certum est chylum non rubescere, nisi contactu parenchymatis hepatis: In qua
F con-

côfessione, apparet chylū à radicibus portæ in hepatis ipsum corpus deponi, depositum & immutatum, per anastomoses cauarum, sanguisugæ modo attrahi, quod si est, patet radices cauarum & portæ anastomosis non vniri, nec continuas esse, quod voluit Aristoteles, nec esse posse, sed mediante corpore hepatis sociari per *σύνκυσιν* & communicare. Nec valet experimentum Laurentij, quo portam insufflâdo, ait: & cauam inflari, nil enim hæc insufflatio arguit, quam vi actum aërem anastomosis apicem portæ egredi, & per hepatis corpus diffundi, ex quo cum erumperet nequeat, nil mirum si apicibus portæ se insinuet & cauam petat, concludit hic Galenus inquiens; *Admiranda natura prouidentia, caua à porta seiuncta fuit, nec eas anastomosi vnuit, ne prima regionis culina colluvies, vena caua sanguinem inficeret, sicque per vniuersa corporis viscera contagium promanaret.*

His sic de anastomosis prætenfis in hepate vbi omninò necessaria videbântur deductis & explicatis, restat iterum disquirendum, Num in iecore vterino, quam nonnulli placentam vocant, vbi anastomoseo par videtur esse, imò maior necessitas;

fitas, anastomoses illæ reperiantur.

Ac primò sciendum carnosiorem illam secundinæ partem, ab Arantio placentam *Lib. de dictam, non esse sordidam, & abiectam foetu.* materiam, quod Gardino asserenti improbrat doctissimus Fienus, quippe, in *De foetus format.* quit hic, est parenchymatica caro, qualis est hepatis, & reuera hepatis ministerio fungi videtur, vnde Archangelus Picholomineus scribit se certò scire, ora arteriarum matris abire seu aperiri & in eam diffundere sanguinem & spiritum vitalem, qui postmodum, à ramis vmbilicalibus trahitur in fœtum. Arantius eam ideo vocauit iecur vterinum, quod iecoris modo, sanguinem tam venosum, quam arterialem attrahat, vt ibi magis elaboretur, relictis crassioribus partibus in eius nutrimentum, vt sic elaboratus & ab omni labe & contagio purus, attrahatur ab arterijs & venis fœtus, cum non habeat vbi excrementa crassiora deponat. *In prælect. anat. sect. 9a*

Et reuera arteriarum vmbilicalium pulsus per ligaturam, qua parte vtero continuæ sunt cessans, manifestè probat arterias matris & fœtus, non esse continuas *Gal. lib. 6. de usu part. cap. ult. & de decretis, 2a* anastomosi, sed duntaxat contiguas, etenim fœtus potentias à semine esse non à

matris vtero perpetuò docet Galenus, ea-
que potissima ratio sufficit, quod fœtus
propria anima vt mouetur & nutrimentum
trahit, sic & viuat necesse est, quoniam
congenitas illas animæ facultates simul
cum semine habuit, adeo vt his omnibus
anima fœtus præsto sit.

Contra quam doctrinam, pro anasto-
mosibus pugnans Fabricius ab Aquapen-
dente lib. de fœtu sequentia obijcit.

*Lib. 7. hi-
storia a-
nimal. c.
8.* Primò ex Aristotele, hæc massa carnea
primis grauiditatis mensibus, multo ma-
ior est quam tempore partus, secus autem
se haberet, si quod vult Arantius, & Pi-
colominus iecoris vterini officium præ-
starent, quod ad corporis augmentum il-
lam augeri necesse esset.

Secundò, verius est materni sanguinis
vltiorem depurationem in fœtus hepate
peragi, quia si in ipsa fieret, excrementa in
ea reperirentur.

Tertiò, arteriæ vmbilicales coniun-
guntur cum matris arterijs, vt ex ijs vita-
lem hauriant sanguinem, ergo & venæ
fœtus cum matris venis similiter vniun-
tur, vt sanguinem venosum habeant, vn-
de inutilis erit illa massa.

Confirmatur, Primò quia sanguis ma-
ternus

ternus citra vllum impedimentum & sine mora, debet continuò à matre ad fœtum peruadere, nempe qui continua nutritione eget, quod perbellè fit supposita anastomosi vasorum matris & fœtus, nulla in placenta facta mora.

Secundò, quia si arteriæ vmbilicales non à vasorum vterinis, vnde vitalem sanguinem haurient? non enim à placenta habere poterunt, quia cum venoso in ea permixtus erit & impurus.

Tertio, si continua nō essent anastomosi, istorum vasorum facilis esset dissolutio.

Hæ sunt Fabricij rationes, quibus negare videtur placentæ ministerium.

Ad primum, Dico non sequi quod intenditur, nam quædam fœtus partes in primo conceptu alijs multò crassiores apparent, quæ tamen postea non augentur ad aliorum minorum augmentum proportionatè, sic caput in fœtu viginti aut triginta dierum circiter, respectu aliarum corporis partium triplo crassius est, quam opus sit ad proportionem, & in nupet natis caput adeo crassum est, vt vix post annum vel minimum accrescat, cæteris corporis partibus plurimum auctis. Quin & in fœtibus primis mensibus pulmones,

corpulentiores sunt, quam postremis, his enim paulatim siccantur & rarescunt. At pancreas maiori mole conspicuum est in nuper nato foetu, quam in adulto: Quid referam de thimi glandulis, enchylomate illo lacunæ qua parte in fauces coarctatur fulcimēto, quod primis mensibus tantæ molis in vitulis conspicitur, ut in obsonium palato gratissimū seligatur? quod ideo Galli *la fagoue* ἀπὸ τῆ φάγου vocasse videntur, per excellentiam: quod ita successit ut vix vllum eius vestigium procedentibus annis appareat, in quibus primis à partu mensibus & diebus magna mole spectabile erat.

Non igitur quod in primis conceptus diebus, in foetibus magnæ molis est, id ad cæterarum partium augmentum augeri necesse est? imò contra decrescere & obliterari potest, quamprimum natura harum ministerio non indiget.

Dico 2. placentam primis conceptus mensibus maiorem esse quam postremis, quia cum primis conceptus temporibus fluores muliebres subsistant, necesse est circa vterum multum sanguinis confluere, cum vero hoc tempore foetus paucò admodum egeat alimento, necessario eam
massam

massam carneam incrementum capessere, quoniam illa in sui substantiam & corpus, impuriorem sanguinis partem conuertit, quo ferè modo molas generari docent medici; At verò, dum fœtus post sextum aut septimum multo eget alimento, fit sanè quod ex illa massa, prout partui vicinior est, potentius semper trahens illam exsugar, vnde illam minui oportet.

His accedit quod primis temporibus, fœtus non nisi purissimo sanguine nutritur, ipsius hepate vix aliquid ad eius perfectionem conferente, corde nihil omnino agente, quoniam cavitatibus idoneis destituitur, vnde accidit massam, siue placentam augeri & plurimum sanguinis in ea permanere, progressu vero temporis, cum & hepar officio fungitur sanguinem à placenta attrahens, & illum cordi subministrat iam cauitatibus instructo, vt arterijs omnibus, vitalis in illo factus influat, non mirum si tunc massam illam potenter fœtus exhauriat, nam etsi non adeo purus vt primis diebus trahatur, non tamen officit, quoniam per ouracum & os excrementa deponit: quod sanè voluisse videtur Aristoteles loco suprà citato, dum de cotyledonibus agens,

inquit, non omni grauiditatis tempore hæc apparent, nam primis conceptus diebus exigua sanguinis portio ad fœtum aut conceptum deferitur, in fine vero in fœtus nutritione totus consumitur. *b. 6. cap. 1. A.*

Coniiciendum igitur, arterialem sanguinem, qui primis diebus defectu cauitatum in corde, per vmbilicales in iliacam & ex illa in aortam, indequè per porum arterialem ad venam arterialem, & pulmonem ad illius tum generationem, tum nutritionem ferebatur, perfectis in corde vasis & officinis, eum ex placenta promiscuè cū venoso adiecur fœtus attractum, ibiquè amplius purgatum, & elaboratum ad dextrum cordis ventriculum conuata anastomosi deferri, & per cordis septum & Botallicum porum, in sinistrum percolari, atque ex eo non solum per aortam toto corpore distribui, sed etiam per arterialem venam pulmoni quantum opus est elargiri, otiantibus primis poris, pulmoni generando à natura constitutis; Quippe si pori isti in lucem edito fœtu relictī, etiam aliquot mensibus otiantur, si etiam post multos annos, in suspenso ca-
Anthrop. lib. 6. cap. 1.
 dauere illos reperit otiosos Riolanus Parisiensis Professor nunc viuens, & quondam

dam præceptor meus, anatomista regius, cur in vtero idem non fiat? Porro si pulmonis duntaxat causa hi pori ab aorta ad venam arterialem, & à caua anastomosis ad venam arterialem facta est, quod deesset pulmoni cum caua & aorta communio defectu cavitatum in corde, profectò illis cavitatibus & officialibus instrumentis ritè adornatis, & eas cavitates, & earum anastomoses suo officio fungi propter quod à natura factæ sunt, consentaneum est naturæ, quæ nihil facit frustra, similiter & illas quæ ministerij sui prædestinata fata explerunt: otari, & tandem obliterari, natura enim partes, quibus non indiget sicut docet Galenus negligit: *De usu part. 6.* Qua naturæ œconomia cauetur, quod aliter absonum occurrit, ne aorta vno eodemque tempore ad extremas omnes corporis partes vitalem sanguinem mittat, & ab extremis per anastomoses terminales contrahat contrarijs motibus, tum ne purus, & ad summum elaboratus, à cordis sinistro ventriculo translatus in aortam sanguis vitalis, impuro permisceatur, ei qui per iliacam à placêta & matris vtero in illam transferretur, quod Simoni Petræo professori regio primario, quon-

Anat. lib.
8. quest.
25.

Nat. fa-
cult. 3.
cap. 14.

quondam etiam præceptor meo, obijcit Laurentius, exercitatione secunda, nec tales contrarios motus esse posse contendit, quippe & hic consentit Galeni dogma, quo asserit arterias vitali & subtili sanguine plenas à venis crassiores sanguinem trahere non posse, *quoniam inquit leuioribus impleta sunt.*

Hinc non omninò videri possit Spygelij ratio absurda, ita vt responsionem non mereatur Riolo, qui perfectis in corde instrumentis, negat per iliacas, ad aortam fieri ex placenta confluuium, sed contra potius, ab aorta per iliacas ad placenta aliquid feruidioris subtiliorisque sanguinis deferri, vt quo calore vitali & penetrante potens est, iecori vterino auxilietur, sanguinemque ibi tam arterialem, quam venalem promiscue stagnantem incidat & tenuet, vt forte si quid impurius transierit, noua circulatione elaboretur, relictæ impuriore in placenta parte, vel si hoc non fit, vmbilicalium arteriarum ad iliacas, anastomoses otari censendum est.

Ad secundum, Dico hepar fœtus secundo sanguinem depurare, excrementa verò in sanguine materno ad placenta delato, pauca esse, nec multa & crassa, ita
vt

vt impurius eius pars primis mensibus, in
eius augmentum concedat, quod fatetur
iple Fabricius, quo tempore fœtus pauco
vt dictum est, sed purissimo eget alimento.

Ad tertium, Dico falsum esse antece-
dens, sicut & consequentiam, quod probat
Galenus, quando ligatura interceptis um-
bilicalibus arterijs, qua parte matricem
tangunt non pulsant, quas etiam pulsare
necesse esset, si continuè essent motu ab
arterijs maternis communicato, unde sic
Riolanus. *Verissimum est arterias matricis* *Anthrop.*
non habere tot ramos, quot in placenta re- *lib. 6. cap. 2.*
periuntur, quodque hac vasa ad matricis
fundum non pertingant, qua parte illis pla-
centa adhaeret, quoniam eorum substantia &
natura, omnino ab uteri corpore diuersa est,
& ideo sanguis tum arteriosus, tum venosus,
matris effunditur per totam uteri substan-
tiam, ramusculus ad id à natura comparatis,
unde manifestum fit venas & arterias um-
bilicales, non uniri anastomosibus cum arte-
rijs uteri, quodque illa non trahant ab his
singulis singula suum sanguinem, sed quod
hauriant illum ex placenta, in qua confusus
est cum arteriali venosus.

Ad probationes; Dico placentam non
impedire, quo minus alimentum conti-

nuo & sine mora ad foetum feratur, sicuti in nobis, iecur non impedit continuum alimenti à meseraicis ad cauam & omnes corporis partes confluuium, et si chylus ut dictum est, per hepatis ipsius parenchyma diffundatur, antequam à caua attrahatur, imò sic melius fit in placenta, quam si anastomosi vnirentur predicta vasa, quia sicut nobis in iecore moram trahens perficitur sanguis & elaboratur, & depuratur, qui datis anastomosibus impurus celerius quam par sit pertransisset, pariter & in placenta materno sanguini accidit, ex qua arteriæ & venæ vmbilicales, congenium sanguinem prædestinata scientia, hæ venosum illæ arterialem trahere norunt, ea inquam potestate & scientia, qua quod familiare sibi est & utile trahunt, & peregrinum respuunt, toties ab Hipp. & Galeno proclamata doctrina. Quod si continuæ fuissent, solutionis periculum facile incurrissent, à quo incommodo & periculo se tuetur, dum placentæ corpore ut communi parenchymate confociantur.

Sed contra eam quam posuimus de vteri anastomosibus pro Arantio doctrinam, Laurentius sequutus Fabricium eas

om-

omnino necessarias asserit. &

Primo, negat viuente matre posse ligari vasa vmbilicalia nisi vterus aperiatur, quo casu vanum erit Galeni experimentum, tunc enim foetus adspiraret; & eo modo se haberet atque à partu;

Verum huic obiectioni satisfacit Ri-
lanus, qui ouis prægnantis viuæ vtero a-
perto, ligatis vmbilicalibus vasis foetus
naribus & ore compresso, arterias mo-
ueri prout Galenus asseruit, expertus est.
At verò præter hæc cordis pulli in ouo
pulsus absente matre trās membranam in
conspicuo est, quod testatur se vidisse A-
ristoteles in oui conceptu trium dierum,
vbi cor puncti sanguinei crassitiem non
superaret, nihil autem hic vteri aut ma-
tris cooperatur pulsifica virtus. Hinc Ga-
lenus asserit foetus potentias à semine esse,
non a matris vtero, vnde Praxagoræ opi-
nio non improbanda videtur, qui pulsa-
tilem facultatem arterijs, vt cordi inna-
tam assererat, quippe certum est & illas
antequam cor formatum perfectè esset
pulsasse, nempe antequam illud cavitates
haberet ad pulsandum necessarias, hæ per-
fectæ erant, id ipsum docente Aristotele L.
de spiritu cap. 4. qua de causa illas nec à
corde

*Anthrop.
lib. 8.*

*Lib. 3. de
part. ani-
mal. c. 4.*

*De usu
part. 15.
cap.*

corde oriri, sicuti nec venas ab hepate dici potest, sed potius cor pulmonem & iecur ab illis exordium habuisse consentaneum est, sunt enim parenchymata, ex sanguine coagulato anastomosibus apicalibus exsudante genita, quomodo fere in arboribus resinæ, vel fungorum materiæ per poros sèsim elapsæ, ramusculis adnascuntur, vel plantis & floribus βρύα adnatæ lanugines, vnde forte ἐμβρύον. Coniiciendum enim est, partes omnes spermaticas primo statim die à conceptu prolifico adornari, inter quas venæ & arteriæ primas omnium suam configurationem habere necesse est, quoniam per illas paucis à conceptu diebus sanguinem ab utero trahi oportet, consumpto ante spirituosum, quod simul cum & in semine adueniat alimento, & quoniam partes solidæ in conceptu quæ nutriantur nondum distinctæ sunt & corporeæ, officiales primò formari perfectè oportuit, quarum ministerio illarum, sicut & cæterarum partium alimentum præpararetur, quo & nutriantur & augeantur, hinc primò per ἀπόχυσιν locis suis, pulmonis, hepatis, cordis, splenis & renum περιχύμαςα vel ut Erasistratus docet παρρυχύμαςα fiunt, quo in opere vena-

venarum οἱ πόροι διαχέονταj. Si ergo arteriæ ante cordis perfectionem & motum pulsarunt, Galeni experimentum non satis destruit Praxagoræ doctrinam, nam etsi adductis hinc inde super fistulam intromissam arteriæ sectæ labijs, ita vt sanguis vitalis ad sectæ arteriæ scissam partē pervadat, pars scissa non pulset, sed ea duntaxat quæ cordi vnitur, & continua est, nihil aliud experimentum concludit, quā arterias non moveri per sanguinis influentis impulsu, quod cum Erasistrato existimavit Aristoteles, sed per spiritus insitos simul cum semine delatos, eorum substantijs à primordijs inhærentes, quos in conceptu nondum suas extensiones & cōfigurationes habente pulsare docet Hippocrates, & Aristoteles id se vidisse testatur vt iam dictum est. Quod autem non pulsent est continui solutio, quippe continuitas secundum philosophum causata est cur totum mouetur mota parte, Spiritus autem ille insitus, proximum animæ 4. omnia mouentis instrumentum, cum vno momento, tanquam radio cor & arterias per omnes partes à summo ad extremas moueat, non mirum si motus ibi finitur & terminatur, vbi continui solutio est, quod

Lib. princip.

Hist. animal. 3. l. 4. Et de part. animal. 3. c.

quod & accidit in vmbilicalibus poris facta ligatura, etiam corde nondum perfecto. Quibus reuera docemur principium motus arteriarum maxime è regione cordis vigere & has potentias motrices à semine esse, non ab utero.

Iam vero experimentum Galeni à Laurentio improbatum rectè concludit, quippe si anastomoses sunt inter arterias matris & fœtus, & vis pulsifica per eas anastomoses à matris corde communicatur, perpetuò verum erit ligatis vmbilicalibus arterijs eas quæ à parte vteri sunt, vel pulsare, vel motus principium à matre non esse, quippe viuentē matre ista fieri in partu Cæsareo faciliè possunt, & in brutis secto utero & viuentē matre experiri.

Enimuerò, si à matris corde vis illa & facultas vitalis pulsifica, non solum arterijs fœtus, sed & cordi ipsius, quod contendit Laurentius accederet, fœtus certè propria vita non viueret, sed aliena, non enim quod Stoici putabant fœtus est pars matris. Quæ cogitans D. Thomas, concludit fœtum propria viuere anima, quia (inquit) non esset animal per se, nec haberet propriam formam, at habet propriam qua omnes vitæ operationes exercet,

Plutarch.
de plac.
lib. 5. cap.
15.
Contra
gentes c.
8. 9.

cet, non solum auctricem & nutricem, sed etiam motrices quæ cum animalis virtutis actiones sint, à matre illas habere non potest, hic enim deficiunt anastomoles quibus nervi matris cū fœtus nervis uniuntur, & nolente matre imò etiam quiescente fœtus diuersimodè mouetur, *siquidem fœtus à semine non ab utero, facultatum ipsos administrantium est origo.* Gal. 6. de plac. cap. 6. Quibus fundamentis Fienus conformatricem potentiam principio interno vitali fœtus addixit, nempe animæ rationali embryonem iam informanti, omnis actionis vitalis principio. Li. de fœtus for.

Nos verò & post mortem matris, etiam longo satis interuallo, fœtus ex utero vivos extraximus, & superstites manserunt, quos à matris morte nondum lecto utero propria vita vixisse certum est. Nec valet quod hic regerit Laurentius, facultatem vitalem per arterias fœtus à matre dispersam seipsa ad aliquod tempus conservari, quia si facultas illa vitalis sit à principio vitæ, & ab anima matris irradiatione per arterias ut dictum est agens, ilico separata anima & irradiationem & motum simul cum vita in instati perire necesse est, quod si motiones quædam conspiciuntur,

in mortui animantis corpore, vt in capite
 abscisso saltitante, os aperiente, oculos ro-
 tante, sicut & in corde de pectore auulso
 & in ignem coniecto, ter aut quater ab ig-
 ne subsultante, & resiliente, tales sanè mo-
 tus ab anima non sunt, nec animæ ope-
 rantis vitales actiones dici possunt, nisi
 vel è cœlo, quod ipsummet non habet, vel
 è Platonis seminario à formarum archeo
 subito aliqua vegetosensitiua Gardini aut
 alterius speciei anima mittatur, quæ ani-
 mæ rationalis locum ad tempus occupet,
 vel sanè, quod velle videtur Laurentius, di-
 cendum instrumenta ab anima separata
 agere posse eo modo quo coniuncta, quæ
 opinio falsissima est eorum, qui cōtra Fie-
 num illa separata in virtute formæ absen-
 tis vitaliter agere posse voluerunt, opina-
 ti potentias animæ ab anima separabiles,
 contra receptam ab Aristotele doctrinam,
 qua docet facultates animæ, cum sint eius
 proprietates ab eius essentia propria ema-
 nantes, inseparabiles esse qualitates & il-
 las citra illius præsentiam agere non pos-
 se, nam dicere spiritus & calidum innat-
 um animæ operantis proxima instru-
 menta illa absente vitæ fonte, tanquam
 præsentem, vitales easque nobilissimas ope-
 rati-

2. de gen.
 animal.
 cap. 3.

rationes exercere & perficere, vt facilè dicitur sic & leuiter asseritur, quod non minus solidè quam acutè, contra Sanctacrum *Apol. 2^a
pro for.
fœtus* demonstrauit Fienus.

Ex quibus docemur non esse verum, quod ait Gardinus quæstione prima de animatione fœtus, *calorem natium & spiritus vitales matris per cotyledones ad funiculum propagationes ex matre ad fœtum deferri viuificandi illius gratia.* Falsum enim est quod pro vero supponit quæst. tertia. *Massa prolifica fundi vteri venis & arterijs per pediculum quendam (sunt vasa vmbilicalia) ex illa massa & materno sanguine genitum agglutinatur quemadmodum pyra, poma, cerasa, per pediculum siue per caudam ramis sue arboris adhærescunt: inuerso etenim modo hæc se habent, quippe pediculus fœtus siue conceptus, docente Galeno est pars fœtus, non vteri aut matris, sicuti nec fœtus pars matris est, pediculus pomi & pyri pars arboris est sicut & pyrum ipsum & pomum, ergo pediculus conceptus est tanquam radix seminis se conformantis & adornantis propria vita & anima viuientis in terram implantata, quæ terræ pars in quam implantatur nullo modo est.* *Pag. 79^a
De plac.
s. cap. 15.*

Neque verò quod ait postea audacius omnibus, qui anastomoses hic constitunt, *pediculus ille à matrice ortum habens trans secundam fertur usque ad locum umbilici fœtus futuri*, sed contra ut dictum est ab umbilico ad fundum vteri: sicut radices seminum aut stolonum in matricem terram: quas omnes falsitates & absurditates securè admodum declarauit in amplissimo Doctorum Duacensium confesso, quod ignorarit placentæ siue iecoris vterini dignitatem & officium, hinc massam illam naturæ arcanum sibi ignotum turpissimis elogijs dedecorat, appellans:

Quaest.
3. de ani-
mat. fœt.
pag 81.

natura recrementum, quod in utero nisi vice sacci aut sentina functum est, inutilem flammis aut latrinis demandandam massam, vilem, crassam, carneam membranam, molam non excellentiorem, ita reuerendam & præcipuè à medico in operibus arcanis naturam studio contradicendi Fieno, fœdissime deturpauit. Nec mirum Gardinum in abdita generationis liturgia lapsum esse, qui in crassa adeo & obuia materia cæcutiuit; & si per se subsistentem formam quam ipse restitutam à se gloriatur aduersarij sui prostratione & morte adeo impotentem esse voluerit, ut brutam quæ citra

Orat. 1.
quod pag.
14.

mater

materiam sustentari nequit, maioribus potestatibus, ijsque magis actiuis condecorarit, contra Hippocraticam doctrinam, duabus aut tribus ab inconuenienti quæstiunculis irretitus, impotentem inquam adeo esse voluit vt qua excellunt plantarum & brutorum confirmante sibi suum domicilium potestate, eam animæ rationali deneget atque ideo in cōceptum prolificum à Deo non infundi antequam corpus sit organizatum, cum interim absurdo commento, animam sensitivam à progenitore primo statim conceptionis momento infundi aut induci asserit, quod & de brutorum conceptu expressè intelligit, & quidem de brutorum conceptu aliquo modo rectè opinatus est, quoniam primo statim à conceptu, imò & ante in semine inest anima eiudem speciei à quo decisa est propria, non vniuersalis sensitiva Gardini, quæ nusquam per se subsistit nisi in indiuiduis, vel in idea Platonis, rectiusque sensisset infinitis difficultatibus se liberans, si plantarum & brutorum semina animata in debitas matrices à mare plantari intellexisset, ideæ Hippocraticæ conformiter, quod & sensit Aristoteles, & clare apud Plutarchum declarauit Epicurus

Quest.
1. de animat. fœtus pag. 16. 15 & 39. & ali. bi passim.

2. de generat. animal. cap. 1. & 2.

curus semina esse ψυχῆς καὶ σώματος ἀποσπασμα, proprijs, inquam, formis individualibus nobilia naturæ arcana, non tertiaræ coctionis, quod aiunt, excrementa, sed totius microcosmi admiranda compēdia, nunquid scriptura docet brutorum animas in sanguine esse? cur ergo cum nobilissimo semine traduces non sint? Et si quod voluit Aristoteles ὡς διαφέρει τιμίωτητι καὶ ἀτιμίᾳ αἱ ψυχᾷ ἀμείνων. ἔσω καὶ ταύτῃ διαφέρει φύσιν, statuendum, nobiliores substantias, seminibus & conceptibus prolificis coxuas, non alias quam proprias sibi que à summo moderatore proportionatas à prima origine formas concipere.

3. de gen.
animal.
cap. 3.

De fac.
anima c.
11.
Exercit.
6. sec. 5.

Si ergò propria cuiusque seminis individualis tradux anima & forma, suum sibi domicilium architectari potens est, prout post Themistium, Zabarellam Scalligerum & plurimos alios docuit Fienus, cur eam cōformandi sibi suum corpus potētiam animæ rationali brutā sapientiori & potētiori denegabimus? quippe sēsitua illa quam à genitore induci contēdit Gardinus, vnde veniat dicere non potest, nisi de foris forte è Platonis seminario, quoniam sēsitua in homine virtus est duntaxat à rationali profluens ab ea non nisi

ratione distincta, cum nihil sit aliud quam rationalis anima sentiens, sed his in aliud tempus dimissis ad Laurétium redeamus, & quæ pro anastomosibus afferat examinemus. Hæc autem sunt argumenta.

Primò, si cor foetus mouetur, pulsat & generat spiritus vitales, ergo respirat, quia ad generationem spiritus vitalis concurrit inspiratus aër tanquam materia, at non respirat, quia in foetu pulmo non mouetur, nec thorax, quorum motus ad inspirationem necessarius est: ergo deerit ipsi materia sine qua non potest generare spiritus vitales.

Dico primò, motum cordis non pendere à motu pulmonis, sicut nec cerebrum, quippe immoto pulmone & thorace mouetur cor & pulsat.

Dico 2. aërem externum non concurrere ad generationem spiritus vitalis tanquam materiam, aut substantiam ex qua & quæ transubstantiatur, sed concurrere qualitate potius quam conuersione substantiæ, sicut docet Galenus pluribus locis, nempe ad sanguinis arterialis & calidi innati ventilationem, neque enim in nobis aëris substantia ad cor penetrare potest, quippe à trachea arteria qua pulmones

L. de usu
res. cap. 3.
G 4.

Gal. de
usu part.
cap. 0 &
21. lib. 16

Lib. de v-
su part.
cap. 11.

mones aërem trahunt, nulla est ad cordis ventriculos via, idem verò Galenus cordi ad ventilationem transpirationem sufficere asserit, cum enim fœtus humidis aquis innatet, & mitissimus eius calor innatus in multo & potente humido foueatur, sufficit ad ventilabrum transpiratio, sic piscibus ob prædictas causas sine respiratione cor mouetur, & quædam animalia etiam ad aliquot menses sine cibo & potu viuunt. Vnde eo loco Galenus concludit *non modo in perfectis animalibus, sed etiam in fœtibus euidenter apparet arterijs vim illam qua ipse mouentur cor ipsum suppeditare*. Hinc clarè apparet falsas esse Laurentij hypotheses lib. octauæ quæstione 27. *In fœtu cor non mouetur facultate illi propria & intrinseca*. & illa

Spiritus vitalis generatur ex permixtione aeris & sanguinis vitalis.

Arguit secundo: Cor non generat spiritus vitales nec sanguinem arterialem, quia deest illi materia, nempe sanguis in dextro cordis ventriculo præparatus proxima sanguinis arterialis & vitalis materia, quia nulla est via, qua possit in sinistrum cordis ventriculum peruadere, caua enim ad arteriam venosam per propriam

ana-

anastomosim sanguinem trasmittit, quem
pulmoni ministrat.

Resp. hæc ita se habere in fœtu, dum
cor officinis idoneis nondum est instru-
ctum, & plantarum modo viuit sicuti do-
cet Galenus, at corde perfecto rem aliter *Lib. de*
se habere vt ante in resolutione ad Fabri- *format.*
cij obiectiones dictum est, otiantibus & *fœt.*
cōiuentibus anastomosi lacunæ ad arte-
riam venalem & poro arteriali ad venam
arterialem, & vicissim agentibus cordis
ventriculis per anastomoses proprias ad
venam arterialem, & arteriam venalem,
ad cauam & aortam, vnde Galenus ipse *De for-*
met sic distinxit. *Quamprimum cor fœtus mat. fœt.*
vētriculis adornatum est, & sanguinem tam cap. 9.
venosum quam arteriosum recepit, pulsat &
mouet simul congenitas arterias, ita vt tunc
fœtus non vt planta, sed vt animal viuat.

Neque vero si quod agitat Laurentius *Exerci-*
ipse contra Simonem Petreum, sanguis *tat. 2.*
per anastomosim ex lacuna ad arteriam
venosam tractus in sinistrum cordis ven-
triculum refluere non possit, ad vitalis san-
guinis generationem propterea per septi
ordinarios poros permeare non poterit,
quia in fœtu, laxiora sunt, quam in adul-
tis, neque etiam opus est anastomoses cō-
fingere,

singere, arteriæ venosæ, & venæ arteriosæ in pulmone vt id consequamur, quod contra Galeni perpetuum dogma de peruo cordis septo, voluit Columbus & discipulus eius Valuerda & hos sequutus Spigelius quod lib. 6. cap. 7. de vsu partium legissent in versione latina, vasa ista mutuis inter se orificijs aperiri, quasi anastomosi vnirentur, licet textus græcus significet solūmodo extremitates horum vasorum contiguas ex aduerso apicalibus ostiis adaperiri, ἀναστομωσάσης τε πρὸς ἀλλήλα τὰ γὰρ νηδὺν τὰ αὐτῶν πέρασα, non continuitate inquam sed cōtiguitate vicinix.

Ex quibus iure concludere possum falsas iterum esse has Laurentij hypotheses, quæst 26. libri 8. anat. *Fœtus non eget corde, quoniam functiones vitales exercet, citra huius partis ministerium.* & illa *Fœtus cor non mouetur, quia non generat spiritus vitales.*

Replicat, si generatur spiritus vitalis in cordis ventriculo sinistro, & per aortam toti corpori ministratur, ad quid porus arterialis? ad quid anastomoses vmbilicarium in iliacas vt sanguis arterialis ad aortam perueniat? an vt duplex naturæ sanguis vitalis à corde fœtus descendens, &
ab

ab utero ascendens commisceatur, purus cum impuro, ut contrarijs motibus in aorta fiat etiam conculcatio?

Iam si cor foetus diastole mouetur ad attrahendum, & sistole necessario subsequetur ad fuliginis & excrementa depellendum, at non habet quo, nec qua id faciat, interim maternus sanguis non ita purus est, quin cordis motu necesse non sit puriorem fieri, atque ideo excrementa separari, ne massam sanguinis vitalis in aorta sua labe inficiat.

Resp. porum arterialem & anastomosis lacunæ ad arteriam venalem otari, ut in responsione supra ad Fabricium, sicut & anastomoses umbilicalium arteriarum ad iliacas foetus, vel cōmento Spigelij arterialis sanguinis partem feruidiorem per has in placentam iterum peruenire, & rursum purgari; sanguinem maternum purissimum in placenta puriorē reddi, in ipsius hepate iterum elaborari, & repurgari, ita ut cum ad sinistrum cordis ventrem peruenerit, pauci admodum sit excrementi, halitus eius superfluos per arteriam venalem in pulmonem protrusos in humorem coagulari & per os foetus cum alijs excrementis & sudoribus in foetus inuolucris

lucris recondi.

Ex quibus sic solutis, constat falsas esse sequentes Laurentij hypotheses Cap. 7. lib. 8. suæ anat. *In fœtu causa non transmittit sanguinem in dextrum cordis ventriculum ut ibi elaboretur & præparetur, quia cor spiritus vitalis non generat.* & illa

Arteria magna non recipit à corde fœtus spiritum vitalem sed ab arterijs umbilicalibus.

& illa

Fœtus non generat spiritus vitales quia illos à matre haurit.

Quæ cum sint rationi & experientiæ consona & à Galeno confirmata, iure merito & in hepate prætensas portæ & cauæ anastomoses, sicut & umbilicalium fœtus cum maternis vasis in placenta nullas esse concludo. Quibus irretitus Gardinus, *Non intelligo inquit per anastomoses, quod Amatus, quod Hollerius, Fallopius, Laurentius, Gordonius & alij qui de his egerunt, venularum capillarium extremitates, aut apices iungentes oribus ora, aut apices in alterius occurrentis osculum se insinuant.* Sed intelligo inquit *venarum coalitiones, coitiones, duorum tuborum in unum ferruminationes, ora duorum in unum coagmentationes, quales ferruminationes, dedi epigastrica*

Gard. o-
rat. 4.

gastricae ascendenti cum mamillari descen-
denti, sicut finxit & pinxit in schemate
orat. 4. figura 2. His anastomosibus inquit
& ferruminationibus affinis est etiam rami
azygota ex ipsissima azygota in lumbos ad
ipsum truncum magnum descendentes inser-
tio, affinis itidem & ex eadem azygota rami
alterius insertio, nunc in emulgentem sini-
stram nunc paulo supra, Ad quæ,

Dico 1. nos supra demonstrasse venas
per coitionem anastomosi iungi & conti-
nuas fieri docente Galeno, coeuntibus in-
ter se illis, ac quæ coitu factæ sunt rursus di-
uisis, hinc rursus concurrentibus illas fieri,
quæ coitiones ferruminationes dici non
possunt, quia ferruminatio propriè dici-
tur *διὰ σιδήρεω ἢ ἄλλῃ μεταμικρῇ κόλῃσις*, de
duobus coniunctis diuerso intermedio,
quod venarum coitioni per anastomosis
unionem non accidit, at in hepate & ie-
core vterino siue placenta vasa vmbilica-
lia & matris, sicut caux & portæ apices,
rectè *συμφύονται* & ferruminari dixeris,
placenta & hepate vasa ista sociantibus.
Vnde ferrumen est asseribus cola, calx la-
pidibus, & rectè Budeus ferruminatio-
nem vertit *σύμφισιν* qua medicis ossa tri-
plici medio vniuntur, cartilaginibus per

Gal. lib.
de venar.
diff. c. 2.

συν-

συνυγόνδεσθαι, neruis per συνύεσθαι, carne συνάεσθαι, at venæ quæ anastomosi vniuntur mutua, nullo medio sed seipsis con-natae sunt.

Orat. 4.

Dico 2. has venarum sibi occurrentium per ferruminationem anastomoses nullas esse, neque admittendas, *nam quis credat?* inquit Gardinus, *nisi qui sapius se vidisse affirmant?* ego non facile, etsi quidam affirmant, quia Galenus illas negare videtur cum præstantissimis anatomistis.

Secundò, quia finis coitionis Galeni non conuenit his ferruminationibus, quia ille ex maiori tubo descendente duos faciens minores, rursus illos anastomose cōgenita iungit, quos rursus diuidit & rursus vnit cum alijs à latere descendantibus, vt in longo adeo tractu ista coitione vasa debilia ex se firmarentur, sicut ad oculum videri potest, in figuræ primæ brachijs & cruribus, Gardinus contra apicales siue capillares ramusculos coire facit, quo loco firmamento nullo opus habent, nam illarum quædam in glandulas terminari, ibique firmari asserit Galenus, sicuti cæteræ in partibus quibus inseruiunt.

Tertiò, harum anastomoseon assertores de coitionis loco non conueniunt, quidam
in

in emulgentes eas inferunt, quidam paulo supra in lacunæ truncum maiorem, Fallopius ex caua iuxta lumbos soboles deducit, quas ramis azygotæ anastomosi iungit apicali, contra Galeni doctrinam *vena* De loc. affect. lib. 3. cap. 3. inquit, *quæ inferiores costas alit ad septum transversum finitur*, vnde infert contra Erasistratum pus per eas venas in pleuriticis ad loca septo inferiora peruenire non posse, & Laurentius Fallopij commenta irridens, Galeno adhæret & insertionem Lib. 9. anat. quest. 12. rami azygotæ in adiposam & emulgentes vt auias à veritate vias nihili facit, ita vt infidæ videri possint tales affirmantium se hoc aut illud vidisse animaduersiones, vt verius dixerint *aut vidi, aut quia me vidisse putavi.*

Quartò, finis duplex ob quem constituitur frustraneus est, primus nimirum vt venæ sectione, humor aut sanguis extrauasatus, à parte phlegmone occupata, aut phlegmone ipso euacuetur, quoniam adeo tenues pori ijque atomi ad eiusmodi euacuationem impotentes sunt, sicut enim postea dicemus, sanguis extrauasatus & venis abdicatus in eas nullo modo remeare potest, quoniam ilico fit alienus & crascescit & coagulatur, post Galenum sic sentiente Parad. 2. de 1.

*Inst. lib.
5. cap. 8.*

tiente Iouberto, & consentiente Sennerto, etsi ocultos meatus videatur aliquomodo concedere, sic enim. *Duplicis inquit rectitudinis apud authores fit mentio, vnius quam naturæ rectitudinem appellant, quæ dextra dextris, & sinistra sinistris respondent, quæ fit per occultos meatus quosdam, seu venas eiusdem lateris ascendentes & descendentes, alterius quæ fit per manifestas venarum ductus: Verum rectitudo illa naturæ etsi neganda non sit, & necessaria sit in alijs remedijs reuellentibus, tamen in venæ sectione locum habere non potest, per angustos enim & occultos meatus sanguis reuelli non potest. Rectus igitur venarum tractus & ductus, & manifestus venarum consensus est obseruandus.*

Secundus similiter frustra causatur nempe vt viam qua pus empycorum per vrinas traducitur, commonstrent, quam Galenus contra Erasistratum naturæ facillimam ostendit, sicut & vteri cum mammillis consensum, quippe puris per pleuram transfusionem in thoracis capacitatem docet, tum per pulmonis arterias exsugtionem, ex illis per arteriam venalem in sinistrum cordis ventriculum delationem, ex quo per aortam emulgentes pe-

tite

tit arterias, & renes, ex his per vtreteres in *Lib. de*
 vesicam & foras propellitur, qualiter & *venar. &*
 vacuatur eiusdem aortæ opera, arteriarum *art. diff.*
 intestinalium & præcipuæ cæliacæ mini- *cap. 9.*
 sterio abusa, & spermaticarum vt per vte-
 rum vacuetur, quod docuit Aretheus lib. *Anthrop.*
 de sig. diutur. morb. cap. 9. & de causis *lib. 3. cap.*
 pull. lib. 1. Riolanus consentiens Lau- *8.*
 rentio fatetur azygotæ insertionem in ca-
 uam si quandoque reperiatur, per eam
 pus empyicorum non posse vacuari, cre-
 derem potius, inquit, cum ramulum infra e-
 mulgentem in cauam insertum à natura fa-
 ctum, vt qui in azygota nimius est sanguis
 in cauam vacuetur, sed ista ad cuiusque fia-
 gentis libitum explicantur.

Quæ perpendens Laurentius ex Galeni *Anat. lib.*
 iudicio difficillimum esse iudicās, pus cras- *9. quest.*
 sum & viscosum venarum tunicas per- *12.*
 meare, cur, inquit, ad ro cuias & insensibiles
 vias quarimus, quæis pus empyicorum per
 urinas deferamus, quandoquidem manife-
 stas habeamus, quas nobis Galenus demon-
 strauit? de his expressè contra Erasistra-
 tum disputans, & sanè ante Galenum Dio-
 cles arterias eiusmodi ministerio destina-
 uit.

At Riolanus dubitat, rectè ne sense-

H

Anthrop.
cap. 11.
 tit lib. 3.

fit Galenus, pus empyicorum ex pulmone per arteriam venosam in sinistrum cordis ventriculum deriuari & ex eo per aortam & varias ab ea enatas arterias in vesicam vterum & intestina, quod longa sit via & impedita, tum quod necesse sit fieri commixtionem puris cum sanguine arteriali spirituofo. Accedit naturam sagacem & prouidam à partibus principibus qualis est cor, eiusmodi impuritates & sordities reijcere, vias conuenientes ordinare. Quas obiectiones cum suboluisset Laurentius.

Anat. lib.

9. quæst.

12.

Respondet vacationū aliam esse criticā aliam symptomatīcam, illa dum sit prævalente natura & robusta deuicta materia, viribus constantibus, potest per eas vias fieri citra vllum ægroti periculum, natura impuritates illas deuictas à vitalibus succis separante; Addo arterias quo motu pulsationis valent in ijs secernendis plurimum posse, quod si venis hanc secernendi per crises potentiam, quæ motu carent concedunt, arterijs sanè quæ potentiores sunt, quis denegabit? Si contra vires debiles fuerint & symptomatica fuerit impulsio sine dubio, suffocationis periculum impendebit.

Anthrop.

lib. 3. cap.

11.

Miror hic Riolanum periculosam puris

ris cum sanguine vitali permixtionem Galeni dogmati obieciſſe, qui docet cum cæteris Gallis perpetuò eiſdem lateris in pleuritide venam eſſe ſecandam, quia tali ſectiõne putrem ab affecto loco materiam euacuari contendunt, per originales anastoſes vt Fuccius & Fernellius, & in *κ. 73. iv* Hip. intèri, aut terminales vt anastoſeõn adſertores, quod & ipſe docet eodẽ l. 3. cap. 8. *per has anastoſes*, inquit, *materia coniuncta in pleuritide euacuatur*, quod ſi eſt, certè hæc vacuatio citra puris in venas deductionem & cum bono ſanguine permixtionem fieri nullo modo poſteſt, atqui ſi hanc permixtionem puris nondum perfectè edomiti cum probo ſanguine perfuſionem & in venas deductionem non timent, proſecto conamini naturæ victricis multo magis ſidendum, dum perfectè edomitam materiam per poſitas à Galeno conuenientes vias euacuat.

Hæc puris è corde per arterias in veſicæ deſiſitionem duobus experimentis cõfirmat Laurentius, Primum eſt Hollerij.

Mulierì cuiſdã intolerabili cruciatu vrinæ purulenta profluebat, mortua poſt quartum menſem & diſſecta, duo calculi in corde cum multis abſceſſibus paruis in-

*De morb.
int. lib. 1.
cap. 12.*

uenti renibus integris & vijs vrinæ, puru-
lenta illa putredo sic per aortam purga-
batur.

II. Alterum est experimentum cuius ipse
oculatus testis. Cuius quidam Montipe-
sulanus melâcholia hypochondriaca, ea-
que grauissima afflictus, superueniente a-
cuta febre, mortuus est, hic mense vno
ante mortem, bis in die syncope leuiori te-
nebatur: quæ ardore vrinæ aliquali, cum
meiendi extremo desiderio, terminabatur,
vrinam mittebat, intense rubram & fœ-
tidam, hinc à syncope liber, corpore aper-
to totam thoracis capacitatem humores
quodam fluido & fœtidissimo plenam vi-
dimus, sinister cordis ventriculus eodem
plenus comparuit, quo viso ostendi syn-
copis causam, fuisse illius materiæ per
cordis ventriculum transitum, sicuti &
stranguriæ dum à corde per arterias in e-
mulgentes & renes & ex his in vesicam
& foras ferebatur, quo experimento Ga-
leni sententiam de puris empycorum eua-
cuatione per vrinas præsentibus multis
medicis & chyrurgis confirmaui.

At verò, contra hanc Galeni doctrinam
facere videtur communio illa, qua san-
guinem & lac à mamillis ad vterum mu-
tuo

tuo refluxu commeare afferunt, per mamillaris descendens & epigastricæ ascendens anastomoses, nam si per eas ille reciprocus materialium refluxus fieri potest, cur & pus per easdem vias purgari non poterit? cur sanguis per eas non poterit similiter ab azygota ad cruralem deriuari & per saphenarum sectiones vacuari?

Pro quarum difficultatum intelligentia, notandum est eos qui pus empyicorum per anastomoses terminales ad vias vrinæ deducunt, asserere apices azygotæ (quod alio modo fieri non potest,) extruafatū pus resumere & ad mamillarem per mutuas inter illas anastomoses deduci, ita vt mamillaris apices ab apicibus azygotæ pus attrahant, & ad epigastricas per alias iterum anastomoses transmittant, à quibus in iliacos ramos delapsum per pudendam ad vterum deducitur, qua via & coniunctam in pleuritide materiam venæ sectione vacuari vult Gardinus: Hæc eadem via etiam datur ab ijs, qui ab vtero ad mamillas reciprocum sanguinis & lactis refluxum docent. At qui pus per vetricam deducunt, fingunt ab azygotæ parte inferiore, progeniem quandam in emulgentes & adiposam inferi, alij azygo-

ta apicem in cauam ipsam reflecti: Quæ puris à pleuritico abscessu deriuationes vt fiant, ab azygotæ apicibus, extrahatur & purulentus effectus sanguis, resumitur debet, atque in putealem eius remeare.

*Li. de loc.
aff. 1. cap.
5. & 16.
5. cap. 8.*

At verò omnes hæ puris deducendi viæ, siue ad vterum, siue ad vesicam, siue ad intestina, admodum difficiles sunt ne dicam impossibiles: quod Galenus demonstra-
uit, dum contra Erasistratum ex professo agens, pus per azygotæ apices nullo modo resumitur posse contendit, non solum quod trahendi illud potentia careant, sed maximè quod ratione crassitiei materiæ, tum pororum & anastomosium paruitate, peregrina & à natura alienos succos perpetuè à se propulsent; hinc frustra tales venularum anastomoses & insertiones ficti & illarum progenies pingentur, nil liceat,

Mentiri astrologis, pictoribus atque poetis.
Vnde Galenus puris trahendi è thorace ministerium, non azygotæ, non mamillari aut alteri venæ, sed pulmonis arterijs addixit, quod diastole ad se trahere possint.

Quod si pus pleuritici phlegmonis aut empyici, per azygotæ ramos remeare posset, profecto ad azygotæ putealem facilissime

lume perueniret, & ex ea rursum sine mora via regali per propriam anastomosim ad lacunam conflueret (nonobstantibus confectis in azygota valuulis, quas convenientes refluuiū adaptauit Riolanus cōtra Hollerium & Amatum de quibus postea) quam puris in lacunam deductionem satagebat Erasistratus, & post eum qui ab azygota ramusculum in lacunam parte infera reflectunt, & nouissimè Columbus cum discipulo Valuerda & Spigelio, qui arteriam venosam & venam arteriosam in pulmone anastomosi vnientes, contra Galenum, Erasistrati dogma antiquatum reuocant, puri è thorace in cauam, per venam arteriosam, viam ster-
 nentes, Queis accedere videtur Riolanus *Anthrop. lib.*
 dum optat naturam, eam quæ in fœtibus anastomosis est lacunæ ad arteriam venalem, apertam tenuisse, votum sanè non absimile isti, quo Momus quidam optabat Iouem occipitio oculos apposuisse, vt venientibus à tergo calamitatibus homines sibi tutò prouiderent, similes prudenti Iano *Perf.*
quem à tergo nulla ciconia pinxit, & reuera si per venas azygotæ refluxio ista possibilis esset, in lacunam translatus sanguis per putealem eius vt di-

Etum est, facile in emulgentes traducere-
tur, citra ramusculorum prætensorum pro-
genies & insertiones, quas in his & alijs
corporibus, hi & illi, alio atque alio mo-
do se vidisse & reperisse affirmant, quæ
naturæ necessaria hinc non esse coniici-
endum est, quod natura Hipp. semper &
omnibus æqua, iusta, sapiens, & proui-
da, illas omnibus dedisset, & talia si a-
liquando reperiantur, sic æstimanda vi-
dentur, qualiter sextus in manu aut pede
digitus.

Neque tamen eiusmodi commentis, pus
ad intestina deducere valebant nisi maxi-
mo periculo per hepar viā affectaret, vbi
visceris illius œconomiam facile peruer-
teret, & omnia coinquinaret; Quæ ca-
uēs Bartholomeus Eustachius eadem fin-
gendi licentia commentus est anastomo-
ses inter ramos portæ & venas diaphrag-
matis: quibus tamen etiam concessis, non
efficiet, quin puris cum chylo fieret com-
mixtio, dum interim eiusmodi commen-
tis valere iussis ex sententia Galeni arte-
riæ intestinales præsto sunt, quæ citra hanc
permixtionem, pus ad intestina deponant
motu fistiolis exclusum, de tot igitur adeo-
que varijs anastomoseon commētis, quid
aliud

*Lib. de
An. cap.
41.*

aliud opinemur, quam esse inefficaces & nimium perplexas vias, dubias, nullaque constanti experientia inuentas & assertas, inutilia in natura commenta, quæ per vias regales notas & certas, ministeria tot ambagibus quæsitâ perficere potis est.

Quod verò lac à mamillis ad vterum sicuti neque sanguis ab vtero ad illas per prætensas vias & anastomoses peruenire non possit, sicuti Syluio visum est, quod adferunt ad prætensas anastomoses stabilendas, Riolanus ex hac communione inquit *Anthrop. lib. 2. cap. 8.* non sequitur, quod sanguis & lac à mamillis ad vterum nec sanguis ab illo ad mamillas sit *8.* refluxus. At si huius ministerij causa hæ anastomoses non sunt, nec puris deducendi causa, cum natura nil fecerit frustra, alium earum vsum edocere debuit, aut fateri eas omninò non esse, sicut de communione azygotæ & thoracicæ sensit cap. 8. li. 3 & de anastomosibus hepatis & portæ lib. 2. cap. 17. & de vmbilicalibus cum vtero lib. 6. cap. 8. Enimverò quod post Vesalium notauit Laurentius, mamillaris ad mamillas non pertingit, nisi forte insensiles quidam pori & atomi ad eas perueniant, illæ enim à thoracicis ramis vasis conspicuis nutriuntur: de epigastri-

CIS

cis verò & mamillaris apicibus ad abdominis glandulas commixtis, existimo inquit illas duntaxat à natura factas, ut partibus alimentum ministrent per quas distribuuntur, quoniam in viris & mulieribus eodem modo reperiuntur. Neque verò pudenda vteri interiora penetrat, sed duntaxat colli partem exteriorem perreptat, alimenti ministra, quod si hanc in quibusdam puerperis grandiore & ampliorem effectum reperit Riolanus, nil ea amplitudo amplius arguit, quam partes circa vterum in prægnatibus dilatari, quoniam & partes quibus famulantur, ampliantur, & pluri egent alimento, quin & propter partus contentionem venæ crurum & tibiæ varicosæ illis efficiuntur.

At ne temerè reciprocos refluxus per prætensas anastomoses denegasse videamur, operæ pretium est rem se omnino aliter habere demonstramus. Neque verò negamus vteri cum mamillis societatem, quam Hippocrates nos edocuit, interim

L. 3. Fab. notauimus ex Vesalio descendente illam per xiphoidis latera venâ ad mamillas vix pertingere, tum & epigastricæ ascendentis apices authore etiam Galeno ad glandulas terminari, arterias ascenden-
tes

res & descendentes etiam apicibus proximis mediante lacuna sociari, quibus satis demonstratū, partium illarum consortium per pratenas anastomoses, siue coitiones, siue ferruminationes nullo modo fieri.

At sociantur & communicant, per quas igitur vias microcosmi genius, qui primus illarum sympathiam notauit, declarabit.

Vna est inquit totius conspiratio, & huius motus reciproci directio toti gentilitati referenda est, porrò ipse eleganter sic explicat, Omnes partes ad totius gentilitatem conspirant, insuper quidquid minima pars pertulerit, ad gentilitatē refert ac transfert, vnaquæque ad suam (magnetismo scilicet) siue bonum siue malum, & propterea corpus dolet & letatur cum minima gente, quia in minima sunt omnes partes & hæc ad gentiles sibi ipsi singula transferunt, (scilicet minores venæ ad maiores, & nervorum apices suo principio) & omnia denuntiant, indigentiam scilicet aut huius, aut illius necessitatem: gentilitas in corde maxime, sicut & in vtraque lacuna medio matrice è regione cordis vbi caua est amplissima, & illi patentissimæ anastomosi cōnascitur, sicut & vbi paulo infra iecori
altis,

*Hippo. de
aliment.
lib. de loc.
in ho. n. 3.*

altis, pluribusque radicibus implantatur maximè viget, cum itaque illa lacunæ regione totius sanguinis gentilitas radice-
tur, non erit difficile declarare quomodo quibusue vijs prætenſæ partes sympathiæ ſuæ & conſortij beneficio fruantur: Porro quod ſupra de arterijs ex Galeno didici-
mus & nunc de venis ſtatuendum eſt, epi-
gaſtricas & mamillares venas cum vtero & mamillis communicare & quidem per anasto-
mofes originales, per quas venæ omnes ſociantur, nempe cum earum om-
nium venarum ſiue mamillarum ſiue tho-
racicarum, quæ mamillas irrigant anasto-
mofes originalis ad ſubclauium & axilla-
rem alueum pateant, venæ vero quæ vte-
rum nutriunt iliaco vniuntur, & hi aluei ſint lacunæ fauces & proceſſus, qui paten-
tiſſimæ anasto-
mofi illi vniuntur, ſit pro-
fecto, quod propter hanc in mediomatri-
ce lacuna ſocietatem ex mamillaribus per ſupradictos alueos in lacunæ portum am-
pliſſimum ſit reſluxus facilis, naturæque prædeſtinata & certiffima ſcientia ſanguis
& lac per mediam lacunam ad vterum, & viciffim ſanguis ab vtero aut partibus illi
vicinis ad mamillas vltro citroque com-
meet, quin & per eaſdem vias ex mamil-
lis

lis lac per emulgentes in renes delapsus & ab his per vesicam foras defluere possit, qualiter sanguis & chylus per easdem omnino vias recta dispensatione naturæ suæ deque aguntur.

Vterus ergo mamillis, & hæc vtero sibi mutuo denuntiant naturali magnetismo, compatitur vtrique gentilitas connaturali scientia, vtriusque partis commodis & incommodis subito obaudiens: Admiranda autem huius sympathiæ & magnetismi radix ab origine suam habuit intelligentiam, quippe quod per omnia diuinus Hippocrates omnes partes corporis simul conformari asseruit circulo generationem comparans, atque etiam illas simul aliquando fuisse contendit, spermaticas maximè in conceptu spiritali modo extitisse distantiam non admittentes, aut eas atomas & insensiles, non aliter quam in microcosmi conceptu & origine,

Vnus erat toto natura vultus in orbe, quæ dixere chaos,

Licet omnia quascumque distantias postea admiserunt in chao essentialibus principijs inuisibilia laterent, ex doctrina Tostati in Genesim.

Quæadmodum igitur in conceptu dum simul

simul vnitæ partes erāt, sibi ipsis obaudiebāt, ita & cum distantias admiserant illæ inter se auxiliatricē amorem reanuerunt.

Enimuero, quæ diximus etiam notauit Laurentius, aliæ sunt patentiores viæ
Quest. 7. lib. 6. cap. 7. magisque conspicuæ huius sympathiæ; doceatur anatome, ab axillari alueo maiores venas ad mamillas perreptare, similiter, per multos ramos à spermatica & hypogastrica vena uterum adire, cum igitur mamillaris ad mamillas, & epigastrica ad uterum non perueniant, ipsa nos docente autopsia, rationi conuenientius est sanguinem ab utero ad mamillas, & lac ab illis ad uterum confluere per internos & patentes meatus, quam per insensibiles & externos, qui eas partes non tangunt, notauimus quibusdam mulieribus tribus aut quatuor diebus à partu lac per vrinæ magna copia fluxisse, quis per epigastricam nisi mente captus id fieri dicat? Hypogastrica quæ plures in vesicam progenies mittit opus istud explere potest: Dicimus igitur lac à thoracis quæ mamillas irrigant, in axillarem alueum remeare ex illo in canalem ex ea per hypogastricam in uterum & vesicam peruenire.

Concludat hic Anatomicorum facile princeps Vesalius; Partiam inquit illatam

con-

confortium qualecumque tandem sit, ad vniuersum caua venae caudicem potius referendum putauerim. Istas sanè phantasias irridet Vesalius, Mirum inquit quam eiusmodi speculationum gratia Galenus sese interdum torqueat, modo venas abdominis inferiora petentes ab illis, quae uterum adeunt oriri (etsi rursum alibi secus testetur) scribens modo prolixè tradens, quod per easdem venas sanguis circa uterum in pregnantibus abundans, in mamillas sursum repat, perinde sanè ac si venae à iugulo sub xiphoide abdomen petentes & illae, quibus inferior abdominis sedes interiretur, sola essent via ductusque, per quos uteri cum mamillis fieret confortiū.

Lib. 5. de
var. cap.
18.

Igitur quaecumque per crises, siue pus siue sanguis ex aliqua parte in qua latuerat, siue per uterum, siue viinas, siue per nares excernitur per originales anastomoses vacuari, & rationi & anatomicæ demonstrationi consentaneum est. Quare breui epilogismo concludimus.

Venarum apices solidis partibus congenitas, alterius famulatus non sollicitas à mediomatrice lacuna sanguinem prædestinata scientia trahere, à vicinis verò apicibus nullo modo, quod apices apicibus non uniantur, quod venis contrarius ines-

let

set motus, quod sanguinem sibi præripi non sinunt venæ, quod alienum & peregrinum non trahunt, sed respuunt, quod illis inanitis, præsto est in lacuna sanguis qui fluxu naturali ad illas defluit, quod crassior sit sanguis extrauassatus, quam apicum illarum tenuissima oscula subintrare possit.

Verum datis & concessis etiam anastomosibus prætenis, conficere possumus, illas oppositam sectionem omnino suadere, directam damnosam & periculis plenam condemnare si dicimus,

Azygotæ truncus putealis ab anastomosi supra cor vsque ad octo inferiores costas quas alit protenditur, quod demonstratur figura tertia per *a. b.* ab vtraque parte putealis rami ad pleuram & mesopleurios extenduntur, quod patet per *cc. mm* ab vtraque lateris parte descendit thoracica ex axillari orta, quod demonstratur per *d. k.* ex qua thoracica prodeunt progenies notatæ per *fff lll* quæ suis apicibus iungentur anastomosi cum apicibus occurrentibus azygotæ loco astericij insignito * *

Ex qua venarum constitutione sequitur, quod secta basilica sinistra in cubiti flexu

flexu notata *h* in tertia fig. & *g*. in prima
 necessario vacuabitur axillaris notata *e*
 & ea vacuata thoracica notata *d*, tum &
 eius progenies *ff* vsque ad locum apicum
 earum, & pleuritidis locum ovali nigro
 notatum, & apicibus illis vacuatis vbi as-
 terici * * qui vniuntur anastomosi cum
 ibi occurrentibus apicibus azygotæ, &
 hos vacuari necesse est continui & vacui
 necessitate, quibus vacuatis consequenter
 progenies putealis azygotæ *ccc* vacuan-
 tur & his vacuatis putealem vacuari *a. b.*
 cōtingit & à lacuna patentissima anasto-
 mosi sanguinem trahet, qui ad locum af-
 fectum confluet. Tum & oppositi rami pu-
 tealis azygotæ vacuabuntur *mm* & per
 apices thoracicæ sui lateris anastomosi
 prætenfa vnitis, quidquid est vitiosi &
 æstuantis in latere sano sanguinis, per pu-
 tealem azygotæ ad locum affectum inun-
 dabit, tum ratione continui & vacui, tum
 ratione doloris & caloris partis affectæ,
 tum quia imbecillior facile recipit, tum
 quia opposita valens potenter propellit,
 quod suboluerat Gordonius vt notauimus
 Articulo 2.

At secus omnia sunt euentura opposita
 sectione dextra. Etenim secta basilica dex-
 I tra

tra notata *g*, axillarem *r* vacuamus & ab ea enatam thoracicam *k*, qua vacuata & propagines eius vacuantur, vsque ad * * vbi azygotæ apicibus vniuntur, quibus inanitis & putealis azygotæ progenies inaniri oportet *m m*. & his continua putealis *a. b.* & aduersi lateris à puteali enatæ progenies *c c c* vsque ad locum affectū, si plenissima fiereteuacuatio quod vt est, necessario influxū, quod tanti faciunt aduersarij, opposita sectio vacuabit, neque vero duntaxat supradictas propagines putealis azygotæ inaniet, sed & ad intercostalem oppositam *p* fluentem ex lacuna sanguinem in lacunæ ipso biuio *n* intercipiet, sicut & quidquid sanguinis ex lacuna per subclauios *q q* in mamillares *o o* & thoracicā *d* fluxurus esset vna eademque ratione lacunam euacuans, & ab ostio azygotæ reuellet; & quod præcipuum est, partem totam corporis oppositam ex qua est fluxionis origo, aut quæ æstuantem sanguinem in morbosam & imbecillem partem propellit & dirigit exhauriet, sicque citra proritandæ fluxionis metum omnia faciet quæ aduersarij directæ sectioni tribuunt.

Hic obijciunt Amatus & eum sequutus Sclanus valuulas inesse azygotæ orificio

cio ita dispositas, quod venæ sectione sanguis reflueret non possit, quo posito anastomoses prætenfas omninò necessarias esse statuunt, vt influxa à parte affecta materia possit vacuari, qua hypothefi asserta, Vesalij rationes eludunt, qui ratione rectitudinis fibrarum azygotæ, dextram basilicâ reuulsionis gratia perpetuò secari voluit, sicut & eorū sententiam eneruant, qui per anastomoses originales azygotæ maximè reuellendum ad opposita autumant. Cui obiectiōi antequam respondeā,

Notandum videtur Amatum primum *Centur.*
has valuulas asseruisse, similiter & Holle- *1. cur. 52.*
rium, quod probat fistula in azygotâ par- *Theor. lib.*
te inferiori intronissa, qua insufflata, ne- *1. cap. 26.*
gat lacunam inflari valuula orificij azy-
gotæ impediēte: Salceus Sclanus ratio- *Coment.*
nem dedit, ne sanguis per eam attractus *in aph. 21*
ad laterum nutritionem thoracis motu re- *lib. 1.*
flueret: Has etiam asseruit Ioannes Bap-
tista Cananus, eandem cōceptionē sequen-
tus alius, orificio venæ coronalis valuu-
lam affinxit, ne sanguis motu cordis re-
pulsus refluat, nesciens sanguinem in ijs
venis moveri, tāquam nautam in naui, cu-
ius motus, à navis motu non impeditur.
Eodem phâtasmate ductus Iulius Casse-

rius Placentinus, scribit notasse se in cærotidibus ascendentibus statim atque cerebrum ingressæ sunt tres valvulas ab utroque latere, nempe iugularis interna & cervicalis singulæ habent duas, quæ deorsum versus spectant, ne sanguis nimio impetu in cerebrum feratur, ne etiam in latus reclinato capite, apoplexiam generet, quasi sanguis in venis quemadmodum aqua in fictili canali, ad corporis, aut partis hunc aut illum situm susdeque agatur, quod si verum esset, & apoplexia à sanguine per venas cerebri descendente fieret, frequentissimæ fierent apoplexiæ; contrarium testante experientia.

Orificio azygotæ quidam duas appo-
suerunt, quidam tres. Spygelius emulgen-
tibus in earum ad cauam anastomosi val-
vulas addidit, ne materiæ retrocedant, re-
num magnetismo non fidens, & reuera in-
quit *Riolanus si valvulae non sunt, à valvularum structura non multum absunt.* Colum-
bus, & Aselius orificijs venarum mese-
raicarum tenuissimis ne chylus ab ijs re-
flueret affinxerunt, sunt qui dant vnam in-
tercostali. Carol. Stephanus orificio cauae
ad hepar, quâ se nunquâ inuenire potuisse
scribit *Riolanus* vnam dedit, dum interim
scribit observasse se valvulas, quas Ama-

Lib. 2.
anth. cap.
24.

Anthrop.
lib. 3. cap.

tus proposuit, in eo tamē ab Amato, Hol-
lerio, Columbo, Spygelio, Stephano, Scla-
no & alijs Insensuens, quod commentum
Casserij sequutus velit eas non aperiri in-
trorsum vt refluxum ad anastomoses ori-
ginales & cauam impedian, sed contra
ab intra extrorsum, sic vt impedian ne
sanguis nimio impetu per venas fluat, ita
vt possit per originales anastomoses ad la-
cunam refluxe, hinc lib 5. cap 47. *ha-*
rum valvularum vsus est, inquit, *sanguinis*
impetum præcipuè partes inferiores peten-
tium sistere, & tamen præcipuè superiori-
bus lacunæ stolonibus eas applicat, iliacis
autem aut cruralibus nullas dedit, quæ
prono sanguinis fluxui maximè sunt ob-
noxie, etenim venis colli notabiles cum
Casserio applicat, vbi sanguinis sit ascen-
sus, axillari vbi sanguis in transversum &
via plana fertur duas, cephalicæ & ba-
siliæ eius ramis modo plures, modo pau-
ciores prout collibuit.

Ad quæ, dico de valvulis istis doctri-
nam videri dubiam, quoniam qui eas asse-
runt, has in alijs atque alijs corporibus, a-
liter atque aliter inuenisse se dicunt, na-
tura autem cum nihil frustra faciat, has
omnibus corporibus æqualiter dedisset,

& eodem loco, eodemque numero composuisset: Sunt quidem maiorum vasorum diuisionibus, siue bifurcationibus, prominentiæ quædam ad firmitatem congenitæ, sed non tales quæ fluxum aut refluxum impediunt.

- Isag. lib. 1. cap. 4.* Iacobus Syluius quas illi valuulas nominant epiphyses dixit, *epiphyses membranarum adsunt azygota orificio, similiter & orificijs maiorum vasorum ut iugularium & bifurcationibus maioribus venæ cavae.* Laurætius, quod & ante notauimus, Azygotæ valuulas chymerica figmenta esse declarat & eas irridet, sicut & Fallopius in obseruat. anat. Bartholomeus Eustachius Romanus similiter & Carcanus Bononienses anatomistæ, Bauhinus tractatu de partibus simi-
- Lib. 2. theat. anat. c. 8.* laribus negat se potuisse reperire nec in brutis nec in hominibus, tum experientia cōtra Hollerium, ait canula insufflata non solum azygotam sed etiam cauam attolli.
- Parad. 9. decad. 1.* Multa, inquit Iouertus, *comminiscitur Amatus sensibus etiam imponens, ut inauditam & à se inuentam mittendi sanguinis ab eodem latere in pleuritide causam reddat,* & Franc. Valesius cont. lib. 7. cap. 4. figmentum Amati imposturam vocat, & nos inquit *adsumus dissectionibus, hac in re il-*
- lius*

lius testimonium nobis diligentiam peperit,
tamen tam expeditus est sanguini egressus
ab hac vena, quam ingressus. Fabricius ab
aquapendente eas etiam absolute negat.

At primus omnium multis ante saeculis de
his egisse videtur Ruffus Ephesius, quas Lib 1. de
appell.
corp. hū.
cap. 23.
post præceptorem suum Dionisium Oxi-
machi filium ἐπαισιμὸς vocat, quasi dicas
eminentiam, protuberantiam, efflorescen-
tiam, luxuriam.

Demus igitur maiorum venarum bi-
furcationibus epiphyses seu ἐπαισιμὸς,
sed reuera valuulae non sunt quæ materie-
rum ingressum, aut egressum impedian-
t, quippe si tales essent ὑπόποιον Hippocrati-
cam destruerent, & infinita in re medica
rectè à Galeno statuta destruerentur, nam
& his positis per azygotam frequentes fie-
rent pleuritides, continuo ad partem af-
fectam fluente & cōculcato, quod ait Ga-
lenus sanguine, nec refluere valente, hinc-
que frequentes venarum παύσιμους. Con- Gal. Co-
ment 1.
in lib. de
fract.
cedamus etiam efflorescentias quasdam &
luxuriosas in venis pelliculas ἐπαισιμὸς
Ruffi, quæ sanguinis impetum moderari,
non sistere possint, quod hic in alueo flu-
minis inclytæ Ciuitatis Audomarensis.
Aa vocato, accidit dum fundo viridanti-

bus herbis luxuriante, illius aquæ tardius solius diffundit.

His ergo sic concessis & declaratis, illis qui valvulas azygotæ regressum materierum impedire asserunt dicimus, oppositæ sectioni istas valvulas non obesse, quoniam cum Reuulsio opposita, fluxuri duntaxat & fluentis sanguinis ad partem affectam vacuatione expleatur, sufficit illi fluentem ex lacuna & potente parte opposita ad azygotam & per eam ad partem affectam sanguinem vacuare, quod si tunc directa secaretur plus omnino attraheretur, quam à parte vacuaretur, nepe quod per ostium azygotæ nihil refluere per illud vero plurimum sanguinis hac sectione influere posset, sicuti præcedenti demonstratione ostensum est.

Concludamus igitur prætensas anastomoses nihil contra quam tuemur oppositam sectionem concludere, è contra illam etià omnino persuadere, imò valde dubias esse, perplexas, difficiles, & impotentes vias, nec per eas fieri materiarum refluxus: Verisimilius enim est, talia per originales anastomoses & apertas vias perfici, nam quod scribit Hippocrates, totum ex toto trahere ac mutuo recipere *καὶ μὴ ἀνὰ*
πύλιν

πᾶντων ἵνα] σύρροισιν καὶ σύμπτωσιν per anastomoses originales & communes vias fieri asserit Galenus nat. facul. 3. cap. 13. sic enim ab vltimis corporis partibus per interna venarum ora sanguinē reuocat διὰ τῶν ἀνσῶν σωμαίων δι' ἃν ἔμπροσθεν fluxerat, sic ex hepate in ventrem & intestina nutrimentum reuocat per easdem vias, per quas prius in hepar subierat, sic inquit nullo corporis incommodo, natura totum corpus purgat, redundansque vacuat per easdem scilicet venas διὰ τῶν ἀνσῶν δ' ἵππου φλέβων δι' ἃν ἔμπροσθεν ἢ ἀνὰ ποσὶς ἐγένετο. per quas antea in corpus fuere deducta, at de anastomosis satis, nunc ad alterum fundamentum pro quo sit,

ARTICVLVS VI.

Aliud directā secantiū fundamētum est.

*In reuulsione oportet naturam imitari
& criticas euacuationes.*

Alterum hoc est directam perpetuū secantium fundamentum qui aiunt, medicum naturam imitari oportere ex Hipp. & Galeni præcepto, cumque

cumque in directum factæ euacuationes criticæ laudabiles sint vt naturæ victricis robore factæ, contrariæ verò lethales aut mali iudicij, concludunt medicum suas vacuationes perpetuo in directum bene instituere.

Quod fundamentum vt malè sumptum destruat, disquirendum primò, quid sit crisis, quando & quomodo fiat, an sit vna & an fiat partis affectæ robore, sic materiam morbificam dirigente, postremò an euacuatio reuulsua artificialis à critica naturali reuulgari debeat, quod priusquàm aggredior, breuiter

Notandum naturam in suis operationibus proprie nullas reuulsiones facere humorū vel quantitate, vel qualitate peccantium à parte affecta, sed è contra, quod perpetua doctrina asserit Galenus, eam semper ad partes affectas humores depellere, vel deriuatione vacuare. Reuulsionem esse opus in medici potestate sitū, quo posito,

Crisis est præceps in morbo mutatio siue ad mortem, siue ad salutem, expectatur in acutis in quibus humorum tanta est ferocia vt vix decimum quartum excedat, quin naturam ita molester, vt cogatur duellum inire, quod crisis est, quæ duella per-

ricu-

ARTICVLVS VI. 139

riculofissima, medici moderni materiæ peccantis minutione anteuertunt, & ista est crisis significatio cuius finis κρίνειν sic definiente Galeno; de ea quæ ad mortem fit non agimus, eam enim pro fundamentum statuunt, quam Galenus eodem loco fieri dicit τῆς φύσεως διακρίσεως ἀπὸ τῶν χρεῖσων τὰ μοχθηρὰ. Itaque κρίνειν hic erit purum ab impuro lecernere, naturæ litem cum morbo iudicare, quod in bonum vertitur, & Hippocrati significat λύειν.

Com. ad
aph. 13.
lib. 2.

Iam verò criles bonæ fiunt vel κατ' ἐκκρίσιν vel κατ' ἀπόστασιν seu μετάστασιν per excretionem, depolitionē aut materiæ translationem siue permutationem & tales ut bonæ sint debent κατ' ἴζιν fieri in statu morbi concocta & euicta materia, hinc concludunt medicum ut naturam coadiutricem habeat vacationes in directum ducere, cōfirmāt aphor. Hip. *quo ducere expedit & quo maximè natura vergit?* & doctrina eiusdē parte 2. epid. κατ' ἴζιν πλευρίων &c. & Galeni de crisibus λύσει ἢ ἰχανῶς &c. de curandi ratione per venæ sectionem, quæ soluentur & explicabuntur suo loco.

Aph. 21.
lib. 1.

His sic positis si demonstrauero reuulsionum scopos, crisiū scopis esse contrarios, & reuulsionem criticis euacuationibus

bus contraria omnia moliri, directè secantium fundamentū præcipuum destruxero.

*Libell.
quos &
quando.*

*Lib. 7.
Cont. 11.*

Ac primò negamus medicum in artis operibus perpetuò naturam imitari oportere, quippe ad humorum educationem natura crassitudinem inducit, non enim ante illos expellit per crises, quam illos concoxerit, & crassiora reddiderit, contra medicus tenuare intendit ex doctrina Galenii illa enim protrudendo transversis fibriss vacuat, cui operi commoda est crassities, medicus rectis attrahit cui commoda est tenuitas, hinc natura crudos humores vacuare nec tentat, nec rectè potest, medicus etiam turgentes & incoctos commode etiam euacuat minutione materiæ: Quæ cōsiderans Valesius concludit, *constat ergo, cum medicus & natura propter contrarios usus operentur non mirum esse si procedant contrario modo.* Non ergo medicum continuò naturam imitari oportet, quod sic etiam probatur,

Bona crisis siue vacuatio critica fit in statu præcedentibus signis coctionis, cum indicatorio bono, at illa cum reuulsione ex diametro repugnat. Primò in fine quo $\mu\pi\upsilon\epsilon\theta\alpha\iota$ Hippocrati est $\lambda\upsilon\epsilon\theta\alpha\iota$ morbum soluere, Reuulsio contrà non intendit morbi solu-

solutionem, sed morbi violentiam & augmentum impedire, quippe crisi præceptum fit in morbo mutatio, in reuulsione non item, hinc euacuatio critica intendit coniunctam morbi vacuare materiam à parte affecta, Reuulsio antecedentem duntaxat aut influentem ad partem affectam ne fluat auertere aut intercipere, ne suo aduentu morbum augeat.

Secundò critica vacuatio fit in statu edomita materia morbifica per separationem: Reuulsio contrà fit in principio quàm proximè fieri potest, quo tempore humor crudus est indomitus, orgasmo proprio furiosus turget & vrget.

Tertiò, in critica vacuatione humor expellitur & protruditur transuersis fibris; In Reuulsione trahitur per rectas fibras ratione consecutionis ad vacuum per venæ sectionem, aut familiaritate substantiæ magnetismo medicamento.

Cum ergò contrariorum cōtrariæ sint affectiones, sequitur criticas euacuationes κατὰ φύσιν rectè factas à natura demonstrare, oppositas κατὰ τέχνην artificiales vacuationes, rectè in contrarium fieri. Quod si demonstrauero directionem illam humoris, aut sanguinis criticè vacuati non fieri robore
partis

partis affectæ, luce meridiana clarius apparebit, oppositam tenentes sententiam elencho causæ non causæ esse delusos, quod priusquam aggredior,

Notandum videtur κατ'ἴξιν illam in hæ-
 morragijs ex erroneo esse fundamento,
 Lib. de Nat. hu. quippe Hippocrates cum quatuor vena-
 & off. rum paria constituisset, quas sanguifluas
 nat. vocat, quarum duo à capite ad calcem
 * παρὰ τὴν ῥα χιν ἐνθεν καὶ ἐν-
 θιν. deorsum recta descēderent,* ita vt singu-
 læ directam sibi corporis partem alerent,
 nec ullam haberent cum sibi oppositis in
 altero latere communionem, quid mirum
 si illam rectitudinem sic commendarit?

Eodem loco duo alia paria venarum
 ab anteriore capitis parte per clauiculas
 ad manuum extrema deducit, & eadem
 reducens via (vt recurrentes ferè nervos)
 sinistram propaginem à sinistra manu re-
 ductam, in liene confundit, à dextra in he-
 pate, quod falsissimum esse autopsia a-
 natomica declarat, vnde non mirum si in
 lienis phlegmone & hepatis directas hæ-
 morragias collaudet, sicut & directæ ba-
 silicæ sectionem, & mirandum sanè tot
 scriptores in eo convenire, cum certò
 sciant, nullam esse venam quæ ad lienem
 pertingat nisi mediante hepate & lacuna,

in eo medicinæ parentem præ veritate,
 quæ omnibus anteferenda est, reueriti.
 Quod ex græcis princeps Ruffus Eph. lib.
 1. part. corp. hu. cap. 23. non tulit, *Ca-*
terum, inquit, non quemadmodum in iecore
ita in liene sursum versus, deorsumquè in si-
nistra parte discurrens vlla vena reperitur,
qui verò id asserunt impudenter mentiuntur,
quandoquidem venula in lienem pertinen-
tes, graciles sint & ibidem in liene finiantur.

Neque vero, qui hanc directionem par-
 tis affectæ expellentis robori & venarum
 communioni tribuunt, etsi vtriquè fal-
 lantur, conueniunt: porro Fernelius,
 Fuccius, Brissotus, quos sequutus et-
 iam est Fæsius, coment. in Galeni lib. de
 venæ sect. Sicut & Thadæus Dunus lib.
 de sang. miss. communionem illam dire-
 ctam ex rectitudine fibrarum in venis me-
 tiuntur, sanguinem rectis fibris trahi, vel
 sponte profluere, nullam venam cum op-
 positi lateris venis communicare contem-
 dunt.

At qui anastomosibus occultis directarum
 partium communionem tribuunt, &
 qui originalibus per notas & patentes ve-
 nas partium directarum consensum refe-
 runt, has fibrarum rectitudines irrident,
 Sal-

144 A R T I C U L U S V I .

Paradox.
9. dec. 1. Salceus Sclanus ad aph. lib. 21. Rondeletius, Hollerius, Ioubertus paradoxo proprio. Vesalius has fibras venarum rejicit

cum Fallopio, asserens post multas venarum cocturas diligentissimo etiam examine se quidquam hac de re certi assequutum; Scaliger *vena*, inquit, *non habet motum*, quippe simplici facultate trahit citra instrumentarium motum, sicut hepar & renes.

Controvers.
lib. 7. cap. 4. Amatus Brissoti rationem contemnit, Valesius in sectione oppositæ basilicæ humero affecto fibrarum rectitudinem seruari do-

Christoph. à Vega de arte med. lib. 2. sect. 3. cap. 1. cet. *Omnes vena*, ait à Vega, *rectis fibris in cauam communicant* fibrarum rectitudinem causantibus respondet maiorem esse communionem venarum dextri & sinistri lateris per fibras rectas (quoniam omnes ad cauam supra cordis regionem coincidunt) quam sit inter uteri venas & brachij internas eiusdem lateris & quam sit inter manū & pedem, à qua ad hunc nulla vena rectis fibris descendunt. Quis enim adeo imperitus est ut putet crure laborante scissa vena brachij, fibras ipsas ex crure trahere sanguinem?

Iam verò nullæ venæ scari possunt, quæ rectis fibris ad locum pleuriticum perueniunt, sed duntaxat in cauam, quo casu tam dextræ quam sinistræ æqualiter à lacuna

cuna trahunt, nam & azygota progenies
 rectis fibris à caua trahent, caua autem ab
 azygota trahere nesciet, quippe refusio in
 illam transuersis fibris fiet, quod probauit
 operosè Galenus dum fibras longas œso-
 phago ad deglutiendum iuuare docet vo-
 mitioni transuersas duntaxat inseruire, *re-* Lib. 3.
Nat. Fac-
cult.

Et enim deglutioni tātum subseruiunt. Tum
 & vomitum ventris secessu curamus re-
 uulsione, sicut & ventris fluxum vom-
 itione, cum tamen intestina fibris oblon-
 gis careant. Quibus rationibus destruitur
 omninò fundamentum Fernelij & Gallo-
 rum omnium, qui ratione fibrarū illarum
 perpetuò in pleuritide eiusdem lateris ba-
 silicam secant. κατ'ἴν Hippocratis per eas
 intelligi putantes.

Dicemus, inquit Christophorus à Vega
 & Valesius (spreta fibris, & neglectis Art. med.
lib. 2. sect.
5. cap. 1.
Cont. lib.
7. cap. 4.
 occultis vijs & anastomosibus terminali-
 bus) τὸ κατ'ἴν de membrorum commu-
 nione dici, & dextras partes dextris, si-
 nistras sinistris rectitudinem seruare per
 communes & patentes meatus: Quippe
 per originales anastomoses venæ sectione
 ex loco affecto, aut vicinis partibus san-
 guinem in cauam, siue lacunam reducunt
 & ex ea foras per sectionis locum.

K

Quod

Quod verò nec ratione communionis anastomoseos occultæ critica vacuatio dirigatur, dicetur, si primò,

Supponimus critica vacuationis duplicem esse materiam: Vel enim extrauasata est, vt in phlegmone iam suppurante, vel intra vasa adhuc fluctuat, vt in febribus putridis, vel vtroque latet, vt in pleuritide inter pleuram & costas, & spatijs vacuis, & in venis etiam sanguifluis per febrim alterato sanguine vel ante caco-chymia laborante,

Putrem illam extrauasatam à natura in phlegmone edomitam per anastomoses apicales remeare non posse Articulo quinto probatum est, quæ arterias non venas huic operi dicauit. Nec verò quisquam pleuriticis pus, aut sanguinem purulentum è naribus fluere conspexit, quod fatetur Iou-
bertus & candidè hic Fernelius. *In crisi fateor nonnunquam infestum humorem coctione præparatum ab alijs segregari, ac tandem per vias idoneas excludi, at nihilominus si tunc venam incidere contingat, per eam possit minimè tanto tempore vitiatum humorem secernere. Ecce nec in statu cum directam secare ad purulentum & putrem (quod gloriantur se facere) humorem euacuan-*

*Parad. 9.
dec. 1.
Therap.
lib. 2. cap.
3.*

uacuandum conueniret, ne quidem tunc à parte affecta illum venæ sectione euacuari posse fatetur.

Restat igitur is qui in maioribus venis & lacuna æstuat hæmorrhagia effluat, ad quod effluuium, nil faciunt neque fibræ rectæ, cum expultricis opus transuersis fiat, neque anastomoses apicales, sed duntaxat originales, per quas totius corporis venæ communicant, sicut articulo 5. demonstratum est, quod fassus est Fernellius inquit; *Admirabilis quadam est continuatio seriesque venarum, per quas sanguis totus sic transfunditur, ut patente via uniuersus plerumque cum vita excedat, etenim venæ sectio quascumque venas depleuerit uniuersum corpus vacuat.* Th. 2. cap. 3.

Ergo patet criticas euacuationes expulsiuæ facultatis esse opera, & in eo omnes conueniunt quod fiant naturæ victricis robore in directum, contrariæ vero ex impotentia: At quod pars affecta proprio robore ut victrix per lineam rectam sursum edomitam materiam pellit & dirigit, rationi consentaneum non videtur, & qui sic ratiocinatur, elencho causæ non causæ capti sunt.

Porro in febribus, in quibus materia

æqualiter in toto genere venoso putrescit, hæmorrhagia fieret semper vtriusque naris, quod experientia & Epidem. historijs falsumprehenditur, quippe illis quibus simul cum febre aliqua pars nobilis affecta fuit, ab vtraque nare fluxit, quod esse etiam ex supposito non debuit, sicut lib. 3. epid. coment. in ægro in. Horto dealcis, cui lien intumuerat & pluribus alijs. At verò nec in principio morbi quo tempore materia nondum domita esse potest, fierent hæmorrhagiæ, contrarium testante experientia.

Alia igitur huius directionis causa inquirenda est, & naturæ conuenientior, vel vt cum Hippocrate loquar, gentilitati toti referenda est, omnes enim partes ad totius gentilitatem conspirant, & gentilitas in omnibus spirat, vnde sic:

Li. de loc. in ho. Hipp. *Quidquid minima pars pertulerit ad gentilitatem refert ac transfert, vnaquæque ad suam, siue bonū siue malum fuerit, & propterea corpus dolet & latur cum minima gente, quia in minima omnes sunt partes & hæ ad gentiles sibi ipsis singula transferunt & omnia denuntiant, ergo gentilitas quæ totius conseruationi incumbit omnibus famulatur, & suauiter, potenterque imperat,*

rat, dolentibus denuntiantibus obauit, sanas conseruat, quæ ex Hippocrate sic contraxit Aristoteles de causa mot. animalium. *Æstimandum animal constare veluti ciuitatem quandam legibus optimè constitutam, in qua unus tantum præest in quem omnia tendunt, quem principatum cor obtinere* 12. Metaph. asseruit & 8. de phys. auditu & lib. de part. animal. 3. cap. 3. quod & agnouit Auicennas lib. de anima. cap. 8. & de viribus cordis cap. 1. Nos igitur motus illius principium non aliunde quam à natura quæ in totius gentilitate, totiusque conspiratione radicatur & principatur, repetemus, atque vbi illa maximè viget & ibi eam maximè moueri necesse est, nèpe in ea lacunæ regione quæ inter cor & hepar interiacet vastissima.

Sanguis igitur qui per crism, aut ^{explem} ad nares ascendit, cuius vacuationem salus consequitur, non erit is qui in affecta parte contentus phlegmonis erat coniuncta materia, sed is qui in lacuna & vicinis ramis à temperie alienus æstuabat, qui que vasa vndeque distendens ad partem affectam per azygotam vt plurimum contendebat: At cum is ad lacunæ fauces peruenit (etenim lacuna in duos vt dictum

est alueos iuxta iugulum se findit) cur natura victrice potius alueū ē directō partis affectæ sequitur, quam contrarium, si motus eius principium & directio, non sit à parte affecta, sed à lacuna cuius fluctus dextrum & sinistrum alueum æquē respiciunt & ad vtrumque æqualiter appellūt?

Pro cuius difficultatis enodatione, sciendum quod ex Hippocrate & Galeno didicimus, corpus vniuersum in duas quodāmodo partes æqualiter dispartiri, partitione duntaxat contemplabili, sed miranda: quam partitionem manifestè demonstrat & probat, capitis hemicrania, hemiplegia, siue vnius duntaxat lateris paralisis. Cum igitur pars aliqua sinistra videlicet, graui aliquo dolore afficitur, ac vehemēti fluxionis impetu obruitur, tota pars corporis sinistra à capite ad calcem, maximè propter neruorum & musculorum compassionem, quæ cum oppositis nullam habent communionem affligitur, imbecilliorque redditur, ad eamque tempestas quæ in lacunari mari, corporis medulitio debachatur, spiritus furiosos dirigit & fluctus promouet, grauius itaque opposita afficitur, sicut docet etiam Galenus, quinimod opposita valens furiosos istos vndarum fluctus

fluctus quanta vi potest à se amouet, & ad imbecillam propellit, quo fit vt vegetior remaneat oppositâ plurimum laborante, vt quæ hostem iam admiserit & cogatur adhuc præ imbecillitate porta iam patente & via strata recipere.

His sic dispositis, facile est intelligere, partem illam humoris morbifici à natura edomitam & propulsam, continuò in ipsamet lacuna ab omnibus oppositis venarum partis valentis anastomosibus originalibus depelli, & cum ad biuium peruenit, potenter ad sinistros alueos protrudi, quæ est germana Galeni doctrina, *quia valentes non admittunt*, & quod docet etiam Hippocrates *influxum etiam facile à robore excluduntur*.

*Lib. de
Cur. R.
Per V.
Sect. 6.
nat. facult. lib.
3. cap. 13.*

At quid mirum hæc ita fieri? etenim si in morbi principio, magnoquæ æstu saeuiente tempestate, totiusquæ corporis turbatione, hostilem humorem potenter à se reiecerunt, quid mirum si tempestate sedata, fluctibusquæ pacatis, hostem edomitum & fugientem ad fines suos appellentem alacriter & acriter propulsent?

*Lib. de
nat. hu.
Sent. 1.*

Quis iam non videt talis euacuationis directionem, naturæ vincentis & totius gentilitatis & principatus esse opus, par-

tis affectæ nequaquam? Sanè hæc directæ depulsio, partis sanæ & potentis secunda est & confirmata victoria.

Paralitico, lateris affecti è directo frequens à nobis conspecta hæmorrhagia, illiusne, inquam, partis pene extinctæ opus erit & directio? quo robore hæc fiat, quis bene, nisi vt supra explicet? Hepatici dextra hæmorrhagia frequens, finne partis affectæ robore cui hepar ad extremam iam peruenit imbecillitatem? nunquid & hic & illic hæmorrhagia malum signum est ex mala causa? Vtero marem gerenti, sinistræ naris fluxus frequens, videbiturne partis sinistræ motio? quippe potius dextræ, cum hæc sinistra sit calidior, atque ideo potentior vt placuit Hippocrati post Parmenidem, qui mares in dextris partibus vt calidioribus generari asserit.

*Lib. de
morb.*

Ergo quidquid humoris morbifici in lacunæ imperio & venis sanguifluis continetur, per hæmorrhagias enticè vacuari potest, parte potente opposita, per contrariam debilem illum per originales anastomoses dirigente, qui vero extrauassatus suppuratur, cum remeare non possit, per conuenientes ab Hippocrate & Galeno assignatas vias, etiam in directum eadem

dem partium potentium directione expurgatur. Sic sanè bonus imperator, hostem in aliqua sui regni prouincia ferocientem à reliquis continuo arcet, cauetque ne totum imperium depopuletur, nec per florentes & intactas prouincias illi viam ad exitum parat, sed per vastatas & calamitosas illum depellere contendit.

Quid ergo agimus dum æstuantem sanguinem per oppositam partem vacuamus? nempe principijs obstatum, & crises periculosas (quas Gardinus Erasistrati errore imbutus expectandas docet) minorata antecedente materia, citra vllum periculum anteuertimus, cui purgationes obnoxie esse possent, idque agimus Hippocratis dogmati consentanee, qui præcipit in acutis si quid mouendum videtur in principio moueri oportere, maximè si materia turgent, addit Galenus etsi vrget, æstuat, *Aph. l. i.* ferociatur; Sic docet *Frans. Valesius cont. lib. 7. cap. 13.* & *Cappinaccius & Caprius de feb. putridis*, *Mercurialis lib. de purgat.* *Altomarus lib. & quæst. An in principijs?*

Ex quibus luce meridiana clarius est, euacuationes criticas, nil omninò contra quam instituiamus ad opposita reuulsionem

nem concludere, atque hic cum gratia mon-
nebo Clarissimum D. Remigium quon-
dam præceptorem meum, nimis crudè in
Gardini collegæ sui gratiam, contra hanc
doctrinam sic conclusisse,

Anno Si verum ἰντρίπρον phlegmonarum est ha-
1632 Sep. morragia κατ'ἰξιν curationis quoque ipsarum
7. in The. ἡγέμονικόν erit detractio sanguinis præscripta
si Guiliel κατ'ἰξιν: Male ergo (ut voluit quidam licet
mi Durā- κατ'ἰξιν: Male ergo (ut voluit quidam licet
di Bur- ex hac schola velut ex equo troiano ad pro-
burgani. fliganda morborum agmina prodierit) in pleu-
ritidis curatione secatur vena in latere oppo-
sito, seu aduerso, & non κατ'ἰξιν sed ἀνὰ πάλιν
ad quæ,

Diffimulata parenthesi, quæ decentius
fuisset omissa, transeat antecedentis pro-
tasis & distinguendo apodosim, seu par-
tem secundam: Dico venæ sectionem ad
curationem phlegmonis non esse vnius-
modi: Velenum fit ad collectæ & coniu-
ctæ materiæ in phlegmone euacuationem,
sicut in statu fluxione sedata, & absoluta
per Canonem 11. articuli 2. & eo casu ve-
næ sectio deriuans & à parte affecta eua-
cuans per κατ'ἰξιν criseon æmulam rectè
fit, & verum est ἡγέμονικόν ἰντρίπρον: Vel eua-
cuatione causæ antecedentis fluxuræ &
fluentis in principio, & si placet etiam in
aug-

augmēto per Canonem 8. articuli 2. quod fit reuulsione ad opposita per κατῴξιν ex Canone 5. & 6. quæ præcedere debet eam quæ coniunctam materiam euacuat per Canon. 9. & sic Reuulsio ad opposita, est etiam ἡγεμόνικον ἐν ἡρίον causæ antecedentis, quæ distinctione falsitas conclusionis fit euidentis, nec malè quidam asserunt in principio pleuritidis oppositam sectionem fieri κατῴξιν καὶ ἐπὶ τοῖς ἀναπάλιν, καὶ καλῶς. quæ doctrina distincta est & clara, nec vt præcedens confusa, ex qua sequuntur absurdissima sequentia,

Humor in phlegmone collectus in statu rectè maturantibus emplasticis ad supurationem vertitur, ergo in principio vel augmento, malè quis repellentibus & rarefacientibus utitur sicut Hippocrates acutor. 2. sed continuò ad emplastica tanquam ad sacram anchoram confugiet.

Phlegmonem iam pure maturo, puris per partem euacuatione abscessus ruptura, natura vacuare, & iudicare solet, ergò malè quis in principio phlegmonis materiam influentem, repellere, discutere, intercipere & longè à parte affecta reuellere tentabit, sed continuò per ipsam partem affectam incisione facta, influxam materiam

teriam crudam etiam & incoctam vacuabit. Dammosa sanè, quæ ex Remigij conclusione elicitur doctrina.

Vera igitur hæc. Si reuulsio quæ fit per venæ sectionem in pleuritidis principio non regulatur per prætensam κατ'ἔξιν criticam, sed contrario modo (quod probatum est) se habet, reuulsuum ἡγεμόνιον ἰν-
σπριον non erit sanguinis detractio κατ'ἔξιν crileon; sed κατ'ἔξιν ἀναπάλιν.

ARTICVLVS VII.

In quo directam, sicut & saphenas secantium argumenta, & rationes examinantur.

Quoniam Mathæus Curtius primus directæ sectionis fundaméta iecit, illius rationes primas examinari æquum est, nam & huius doctrinæ inuentor fuit, etsi Fuccius & Galli quidam nouis rationibus adductis, eam inuenisse videri velint.

Igitur Curtius Coment. 34. in Mundi-
ni anatomiam sic scribit. *In pleuritide ve-
na eodem latere melius secatur quam opposi-
to,*

10, quia cum vena qua oriuntur ad nutriendum costas sint supra cor, & ipsum cor maxima vi ingentem quantitatem sanguinis ad se trahat, si vena secetur ab eodem latere, non erit timendum ne materia ad locum ubi affectus est, affluat, quoniam eam deorsum ad se cor trahit, praesertim cum in corde duo sint illi ventriculi aures, vena arterialis & arteria venalis & aorta, per quas potest eas materias expellere ne ad locum affectum perueniat. Sic posita doctrina cap. 35. quaerit, Quomodo in pleuritide vena sectio plus à loco affecto vacuat? Resp. ex vena ascendente plures sunt rami (intelligit lacunā) ex quibus profluit sanguis qui affectum generat; Si igitur sanguis retrocedat euacuanda est vena à qua rami ij oriuntur, melius igitur ab eodem latere expurgabitur, ita enim humores qui ad nutriendas costas veniunt diuertentur; Quod si ex opposito latere euacuare volueris, non ita divertes quoniam ibi plures sunt venarum germinationes, sanguis ex vena magna (id est lacuna) succederet, non ex venis parvis qua costas in affecto latere nutriunt, etenim qui dolorem aliquem vult divertere, auertat oportet & materiam ex qua dolor ille gignitur.

Ad primum, dico futilem omnino huc

ius directæ sectionis rationem offerri, eo fine vt obuiam eat obiectioni Arabum & Græcorum, qui ea sectione fluxionem ad partem affectam proritari asserebant, quia cum cor ab vtroque latere æquidistet, si sanguinem ex lacunæ parte superiore attrahat, non refert hac de causa vtra secetur basilica, imò minus erit timendum cæteris paribus, si opposita secatur in principio morbi, quod si procedente morbo quando iam vitiosus factus est sanguis fiat venæ sectio, cor nullo modo ad se trahet, sed potius ad ignobilem & affectam depellet, perpetuâ Galeni doctrinâ, si enim tunc traxerit & per venam arterialem & arteriam venalem ad pulmonem protruserit, pulmonis phlegmone sequetur, con-
 duplicato morbo & priore magis lethali.

*Nat. fa-
 cult. lib.
 2, cap. 13.*

Vult ergo cor reuulsionem ab azygota & intercostali & mamillari & thoracica moliri, interea temporis dum directæ sectione, qui in affecta est parte sanguis, per venas ab subclauia & axillari productas, & earum anastomoses & cæcas vias vacuatur: inanis sanè ratio quæ directæ sectionem omninò periculosam esse demonstrat, si cor hæc quæ fingit agere debet, ne ad partem affectam effluat sanguis.

Ad

Ad secundum & quæsitum, dico non distinctè quæsiuisse, quomodo reuulsio antecedentis causæ à parte affecta faciendâ erat, & quomodo ex eadem affecta parte coniuncta materia esset euacuanda, quod paradoxam doctrinam ferenti faciendum erat. Cum enim dixit plures esse ramos, per quos fluit sanguis abscessum generans, per quos fluat non distinxit, solum docet vacuandam venam à qua rami ij oriuntur, quasi per intercostalem & mammillares, aut thoracicam fieret pleuritis, quæ à subclauia & axillari oriuntur, (licet sæpe desit intercostalis,) non vero ab azygota, per quam tamen vt plurimum periculosissimæ fiunt pleuritides. Nec verò docet quam venam tunc secare posses, quod autem opposita sectio ab oppositæ subclauiae stolonibus vacuare possit, sicut & ab azygota, ostendemus cum similia obijcienti Gardino respondebimus.

Nunc autè satisfiet, si dicimus quæcumque hic adfert Curtius, de confirmat. iam affectu, cum congestio iam facta est & fluxio cessauit enuntiari, & sic rectè conclusisse, nam & materiam coniunctam euacuare satagit; *Cum doloris quod ait lenamine ex venis paruis, quæ costas in affectu latere*

latere nutriunt, idque per ortas à subclauia
 venas si sanguis iste retrocedat, in quo est
 nodus & probari debebat. Et quamuis
 adeo crudè & indistinctè hanc nouam o-
 pinionem propalarit Curtius, hanc ta-
 men qui Italicas scholas adierant Germa-
 ni & Galli nouitatis studio in patriam re-
 tulerunt & nouis rationibus collustrarunt;
 Quorum argumenta & rationes iam ag-
 grediemur, & primò Fuccij, qui paradoxo
 suam fecit, & primò arguit ex Hipp. de
 Vi&. acut. lib. 2.

*Si dolor ad clauiculam pertigerit aut mo-
 lestus sit brachio, vel mamma, vel partibus
 septo superioribus grauitas adsit, internam
 cubiti venam secare expedit, & lib. 4. ab ea-
 dem scilicet parte qua dolor fuerit, neque ut
 copiose sanguis detrahatur est cunctandum,
 sed eo usque auferendus, donec rubicundior
 multo, vel pro puro rubidone liuidus fluxerit..*

Respondetur hic Hippocratem vacua-
 tionem mixtam instituere ex reuulsione
 & deriuatione compositam, seu potius à
 parte ipsa euacuationem, dum ad coloris
 vsque mutationem vacuat, quod contin-
 git alterato iam per moram in abscessu
 sanguine, in statu & fine augmenti, quod
 sic esse notatur ab Hippocrate, grauitate

con-

coniunctæ materiæ & suspensione, sicut in cōmentario explicat Galenus, & maxime si clauiculis & brachio esset molesta, quia tunc eiusdem lateris basilica commodissime coniunctam euacuaret materiam, dummodò semper affluxionis desit periculum, antecedente prius per reuulsionem ad opposita rectè vacuata materia. Vnde locus hic nil concludit contra reuulsionem quæ fit in principio, quo tempore sanguis necdum est alteratus in parte affecta, nec reuulsio contendit ab affecta parte vacuare, per Canon. 7. Art. 2.

Secundò. Hippocrates lib. 1. de morbis. *Lienarum vocatam venam vel iccoriam secare expedit, qua morbus fuerit, sicque dolor lateris & aliorum lenatur.*

Respondetur ἀποκίνωσι non reuulsionem id fieri per Canon. 9. Art. 2.

Tertio, ex Galeno de curandi ratione per venæ sect. cap. 14. *Quibuscumque κατ' ἴκον hamorrhagiæ accidunt, summum id commodum laborantibus adfert, hoc autem κατ' ἴκον ὅτι κατ' ἐνθ' ἡμῶν quod in rectum intelligatur omnes consentientur, cum sæpè utatur ea voce in hoc significato, non enim liene tumente à dextra nare erumpens sanguis, nec in iccore à sinistra, aliquam fert utilitatem (sed re-*

uulsio quibus in directum adhibetur euidentem utilitatem celeriter ostendit, quibus contra haud etiam) dextra igitur nare sanguis erumpens ad dextrum hypochondrium fixa cucurbitula, clarè celeriterque sistitur, sicut ad sinistrum ex sinistra erumpens, porro si reuulsioni causa venam secus in directè quidem sanguinis eruptionibus, citissimè conspicuam videbis utilitatem, si contra secus, haud etiam.

Dico primò, locum hunc esse mendosum, quod & alij notarunt, & legendum: Non enim liene tumente à dextra nare erumpens sanguis, nec in iecore è sinistra, *φίσι τινὰ ὀφέλιον, ὅτι ἐν τῇδε δεξιᾷ & sensus erit bonus, parenthesi verò inclusa rejiciantur, vel loco ἀντισπασίς legendum κένωσις* ut postea cap. 16. iuuat celeriter lienem affectum κένωσις, mendosa enim essent ista, nec Galeni theorematibus conformia.

Dico 2. Hippocratem *πὸ μακίς* hac voce vsum in eo significato, fortè ex erroneo fundamēto de venarum distributione lib. de nat. hum. & de ossib. sicut articulo 6. notauimus: Ex qua κατ'ἴν acceptione non satis explicata, Clarissimus D. Remigius, quod illius gratia dicam, malè conclusisse.

fisse videtur, *ἡ πleurιτις* *ἡ πleurιτις*

Pleuritidē nō curabit, qui κατ'ἴξιν ignora- *Thes. vul-*
bit. Malè, inquam, si hāc vocem perpetuō *gata āno*
accipit in eo significato, quo Gardinus & *1633. li-*
directè perpetuō secantes, nempe illi pleu- *lij 16 de-*
ritidem rectè, & turdō non curabunt, qui *fendente*
quot modis κατ'ἴξιν ab Hipp. & Galeno di- *Simone lo*
catur non sunt assequuti. *Sec.*

Dico igitur, quod hęc vox, nō duntaxat eam quam Remygius, Gardinus & aduersarij tenent acceptionem habet, sed & alias quę interpretem omnia scrutantem latere non possunt.

Directam secantes, per eam vocē, dicunt perpetuō intelligi rectitudinem eiusdem lateris, scilicet partium superiorum cum inferis, ita vt hęc duntaxat inter se sic cōmunicent, superiores verò, scilicet dextrę cum sinistris non item, inferiores tamen sinistras cum dextris inferioribus sic etiam sociari concedunt, & in eo omnes conquiescunt, nec quidquam aliud per eam vocem intelligi volunt.

Contrā, oppositā secantes per hāc vocē non duntaxat eiusdem lateris communio- nem intelligunt, sed etiam inferarum inter se, & superiorum similiter, dextrarum scilicet cum sinistris, & vice versā, idque

per aphor. 24. Art. 2. & aph. 16.

Præterea & in directis maiorem & minorem à Galeno assignari societatem aiunt, ita ut proximior sectio loco affecto, magis κατὰ τὴν vacuet, sic internas in pedo magis quam externas in eodem diametro positas, communicare cum vtero statuit, ex quo elicitur, quod vicinior communio, supponit aliam per maiorem distantiam.

Directam perpetuò secantes & κατὰ τὴν non distinguentes suam sumunt probationem ex Galeni loco supra citato: ex quo loco distinctè intellecto: Dicimus nos oppositam secantes doceri Hippocratem & in alio significato ea voce usum & fortè sæpius, quippe qui dicit sæpè id contigit, videtur supponere sæpius accidisse cōtrarium, dum autem Galenus scribit, *Demonstratum à nobis est sæpe ab Hippocrate dictum fuisse quod partes κατὰ τὴν sitæ necessario plus inter se communicant*, docemur & alias non sic fitas etiam communicare, nam ly comparatiuum supponit aliam & magis vniuersalem communionem, scilicet eam quæ fit per transversum per aph. 24. & 16. articuli 2. Quam doctrinam confirmat Galenus inquiring κατὰ τὴν

*Therap.
lib. 14.
cap. 7.*

*Coment
10. in lib.*

ARTICVLVS VII. 165

τῆς αἱ τὴν ἐνθυωρίαν διορίζει ποτὲ μὲν κατὰ τὸ *Hipp. de*
 μήκος τῆς σάμας, ἐστὶ δὲ ὅτε κατὰ τὸ πλάτος, *fract.*
 quā per corporis transuersū cōmunionem
 professus etiam est ther. lib. 10 cap. 3. Nec
 mirum, illā enim ἐνθυωρίαν lib. 2. ad Glauc. *Ad Glau.*
 cap. 2. per ὁμοζυγίαν interpretatus est, vbi *Philos.*
 dum docet quomodo medendum sit mem-
 bris extremis patientibus scilicet pede vel
 manu, inquit, ἀπὸ τῶν ὁμοζύγων κίνωσις, εἴτε
 ἀντίσπαν, εἴτε παροχίτευσις ἐτίλοις, & vno pe-
 de dolente alterum secatur: Hinc pleuriticā *Th. 12.*
 venam, quoniam coniuge caret azygon *cap. 5.*
 vocauit, vtriusque autem cruris & pe-
 dis venæ, ὁμοζυγαὶ fiunt in lacunæ par-
 te inferiore per iliacos alueos, sicut &
 brachiorum & manuum per subclauios in
 eadem lacunæ parte superiore, quibus a-
 zygota æqualiter communicat si anasto-
 moles originales spectes, & communes
 vias per quas Gal. hæmorrhagias narium
 reuellit aph. 22. Articuli 2. qualis est etiam
 communio & arteriarum ὁμοζύγια in la-
 cuna arteriali, quæ communio est vita-
 lium & naturalium organorum, quam
 Galenus docet Erasistrati dogma con- *Lib. an*
 futans, vbi vna subclauia vacuata & op- *sang. in*
 positam vacuari asserit, vnde communio *art. c. +.*
 κατ'ἑξῆς quoad venas & arterias, non exclu-

dit communionem oppositam.

At verò, si animalium instrumentorum communionem adiunxeris, quæ mouendi & sentiendi sunt organa, profectò dextras partes superiores cū dextris inferioribus, magis quā superiores inter se & magis κατ'ἴξιν consentient, quoniam non solum per venas & arterias communicabunt, sed etiam per nervos sentiendi instrumenta, quorum alia omninò est quam illarum distributio: Illi enim à summo ad imum bipartito agmine descendunt; ita vt nulli à dextris in sinistras partes, nec ab his ad illas transcurrant, quo fit vt in doloris ratione partes è directo sitæ secundum longitudinem magis inter se κατ'ἴξιν socientur, seruatis oppositis illæsis. Arteriarum autem & venarum alia omninò est ratio, & cōmunio, quippe cum à lacunis omnes oriantur, quæ in corporis meditullio principatum obtinent, æqualiter omnes cum illis & inter se communicant, sicut intellexit ad Glauc. 2. Galenus τὸ γὰρ κατ'ἴξιν, κατ'ἴξιν τὸ κατ' ἰσότητά quod est etiam ἐνθω καὶ ἐνθω Hippocrates lib. de fract. vnde fit, quod pars paralytica non moritur etiam sensu motuque priuetur.

Ex hac communionem oppositam secan-

tes docentur partes è directo fitas (quoniam per sensoria organa communicant) principe parte aliqua dolente necessario omnes condolere, debiliores fluxioni hostili obnoxias fieri, oppositas his calamitatibus non affici, valentes esse, & continuo peregrina & inimica à se ad imbecilles & affictas propulsare: Quod animaduertit Ioubertus demonst. 9 dec. 1. paradox. estque Galeni constans doctrina à nobis sæpius notata, cuius ratione ibidem docet in parte corporis debili sectiones non esse faciendas; vnde sic concludimus contra D. Remigij thesim.

Facult.
nat. lib. 3.

Pars corporis affecta in qua pars aliqua princeps graui aliquo affectu affligitur, tota secundum longitudinem à capite ad calcem compatitur & morbosior redditur atque imbecillior, quare in ea sectio non est facienda, nec ad eam humores morbifici turgentes & æstuentes villo modo sunt prouocandi, sed omnino in opposita parte sectio facienda est, & per illam fluxurus & fluës ad partem affectam (v. g. in pleuritide) sanguis reuulsione est vacuandus ἐπὶ τοῖς ἀναπάλιν, καὶ κατὰ ἴαν Quoniam vt notat etiam Sennertus, Cum *in p. l. 5.*
fit reuulsioni proprium in contrariam & p. 2. S. 1.
di. c. 18.

distantem partem reuellere & contrarium
 humori motum conciliare, eiusque munus sit
 non quod influxit distrabere, sed quod influit
 reuolare, vena quæ Reuulsionis gratia ape-
 riuntur potius cum parte mittente, quam cum
 recipiente communicent necesse est, per Ca-
 non. 6. Articuli 2. Ita enim ad principium
 sanguinem fluentem reuocamus & ad locum
 unde fluit retrahimus & contrarium ipsi mo-
 tum conciliamus Venas nimirum hic eligere
 debemus, quæ sunt à parte affecta remota &
 cum mittente communionem habent id est quæ
 è directo parti affectæ opponuntur, vel secun-
 dum longitudinem, vel secundum latitudinem,
 ut si pars affecta sit infra v. g. in ischiade in
 cubito vena aperienda, Si verò pars affecta
 sit loco superiore v. g. latus dextrum, in oppo-
 sito cubito vena secta reuellit, quæ si à par-
 te affecta non euacuet, nil refert, neque enim
 reuulsionis est à parte affecta vacuare, ita e-
 nim κατὰ τὴν reuellimus & ὑποσπία Galeni ser-
 uamus, quæ nil aliud est quam directio que-
 dam meatuum per quam humores ex parte
 vna in aliam commodè fluere possunt, quos
 natura non vniusmodi fecit, sed alios secun-
 dum longitudinem, alios secundum latitudi-
 nem Vnde manifestum fit quod qui op-
 positam lecat is κατὰ τὴν reuellit licet ἀνα-
 πάλιν.

πάλιν. Clarissimi igitur Remigij conclusionem explicans, iterum concludo,

Pleuritidem tūtò non curabit, qui omnes κατ'ἴνυ acceptiones non benè intellexerit, multò minus qui eam rectitudinem, per motus criseō perpetuò regulabit.

Ad reliquum loci citati, dico exemplum cucurbitularum nil facere ad probationem, cum enim agamus de reuulsione quæ sit vacuatione antecedentis materiæ, hic sistaticum parti affectæ, siue fonti fluxionis applicatur remedium, vnde dixit εὐκία σαφὺς ἔστιν. Neque verò vacuationes è directo ad sistendas hæmorrhagias sunt propriè reuulsiones, sed à fonte ipso abvacuationes per Canon. 3. Articuli 2. vel ad summum interceptiones: In vniuersū falsum est, quod illicò sanguis sistatur secta directæ, vel appositæ è directo cucurbitula, nam & sæpè contrà accidit etiam post repetitas sectiones & cucurbitulas, & deligaturas, & contrà sæpè expertus sum & commodè experietur qui volet, oppositam sectam etiam hæmorrhagiam sistere, affixa è regione hepatis cucurbitula, si sinistra nare fluebat sanguis; Porro quod dextræ iecorariæ sectio nullam in splenis phlegmone adfert vtilitatem, contra omnem
est

est rationem & experientiam præcipuè si
fit phlegmonis principium, quia vt nota-
uimus Articulo 6. splen non communicat
cum basilica sinistra nisi mediante iecore
& lacuna, hinc & cum dextra communi-
cet necesse est.

Nec valet, hâc absurditatē eluere conatus,

Controu. lib. 7. c. 4. quod ait Valesius, *extremities esse partium*
internarum emunctoria quibus è directo res-

pondent. Commentum enim istud in ma-
iores nos conijciat angustias, nam supra
Articulo 6. probauimus & autopsia ana-
tomica declarat, nullas venas à splene ad
manus, aut ab his ad illum peruenire, nisi
communione iecoris & lacunæ, tum quod
magis vrget emunctoria sunt extrauasa-
torum humorum per ἀπόσπιν, aut μετάσπιν
à natura criticè vacuatorum & deputa-
torum receptacula, qualia sunt inguina
hepatis, axillæ cordis, partes colli, & au-
rium regiones, cerebri; in quibus videre
est extrauasatos humores vt alienos depel-
li à superioribus ad inferiores, quæ est na-
tura extrauasatorum humorum vt decli-
uia semper loca petant, qualiter & in ma-
crocosmo siluestres aquæ faciunt: At hic
splen per longas admodum vias sursum
pelleret, & quidem per nobiles partes

cum

cum interim habeat plurimos ramos, quibus per intestina & vrinas eiusmodi superflua expurget, & certè Hippocrates disputauit an eiusmodi transpositiones per anadrosim essent laudabiles.

*Populo 6.
coment. 2.
sect. 13.*

Quarto ex Gal. *Fluentium humorum reuulsio*, eorum autem qui iam membrum occuparunt, deriuatio medela est, utrumque autem euacuationis genus per communes vias fieri precipit, veluti in contrarium trahes in utero, si eam qua in cubito est venam secueris, aut mamillis cucurbitulas apposueris, & crura calefeceris, fricueris & ligaueris, deriuabis, si eas qua in poplitibus, sunt aut tali venas diuiseris & cucurbitulas coxis apposueris, & crura calefeceris & ligaueris, & fricueris, & si quidem pars dextra uteri fuerit affecta, ex dextra manu, aut crure sanguinem detrahes, si vero sinistra à membris qua illi è directo sunt.

*Ad Glau.
cap. 7. l. 2.*

Dico 1. theorema illud Galeni vniuersale esse verum, & in exemplo esse reuulsionem secundum corporis longitudinem, quæ non excludit alias contrarietas reuulsionum, communes venas hic intelligi sanguifluas maiores, lacunam scilicet & eius maiores ramos, non capillares & feruminatione iunctas, patentes vias, non occul-

Parad. 9. occultas anastomoses sicut rectè notauit
dec. 1. Ioubertus & doctissimus Sennertus.

Dico 2. quod & hanc reuulsionem ad
 mittimus per aphor. 24. & canonem 2. Ar-
 ticuli 2. & cum difficile sit scire vtra pa-
 vteri malè habeat, imò vix possit fieri
 nam duntaxat eius partem dimidiam
 summo ad imum malè affici opposita v-
 lente, quoniam vteri corpus nullo medi-
 aut interstitio distinguitur, parum refert
 videtur ad reuulsionem vtram ex superio-
 ribus feces, præstaret tamen opposita
 si corpus plenum fuerit propter rationes
 suprà allatas.

Quinto arguunt ex Gal. de C. R.
 Venæ sect. cap. 15. *Quin & in pleuriticis*
directo xāb iūbū laborantis lateris sanguinis
missio, efficacissimam sape utilitatem attri-
bit, ex opposita autem manu, aut omninò o-
scurā, aut post temporis interuallum & postea

Sic interdum efficax, celereque remedium
aj nā r iūbū quæ è directo partibus affectis v-
ne secantur afferunt, ut & qui patiuntur
& familiares sape obstupescant.

Qui locus antequam explicetur; Notā-
 dum est, quod canone 3. Articulo 2. etiam
 docuimus, Galenum in praxi, sape à suis
 theorematibus vniuersalibus deflexisse. S.

ARTICVLVS VII. 173

13. th. cap. 11. ex hypothefi longiffi-
 è reuellere docens à parte quæ fluxione
 ntatur, paulo poft ad particularia def-
 endens & praxim, Renibus & vefica &
 adendo phlegmone laborantibus infe-
 ores fecat fine diftinctione: & cap. 6. eiuſ-
 m lib. *Si mulieri inquit in utero, aut pu-
 erando phlegmone infederis, ad partes qua-
 rum proximè longinquæ funt reuulfionem facies.*
 quod & loco quem ſumus iam explicatu-
 præcipit. At lib. de C. R. P. Venæ ſecti-
 onis termino & voce abufus infe-
 rum ſectiōe reuellit ſic enim, ἡ μόνον ἀν-
 τὴν πᾶσαι ἀλλὰ καὶ προτέρηται ὑπάρχου τὰ κα-
 τὰ φύσιν non ſolum reuellit ſed etiam men-
 prolicit contra Canon. 9. Articuli 2.
 lib. 13. ther. cap. 11. in lienis phlegmo-
 ſecat in manu cap. 5. in altero crure, ad
 uulſionem; Quæ rectè perpedens Ferne-
 ſ epiftola ad D. Melinum, ea eſt, in-
 ſcriptis Galeni tanta varietas, tan-
 inconstantia, tanta plerumque discordia,
 vix quiſquam illius hac de re ſententiam
 aſſequutus. Atque ideo Auerroes lib.
 ollec. 7. cap. 19. irridet Galenum, quod
 ud docuerit in ſermonibus vniuerſali-
 ſ, aliud opere exequatur; facti tamen
 tionem ſibi conſcius reddit Galenus &
 lo

se purgat ad Glaucl. lib. 1. cap. 1. scribem
 Cum ad rectè medendum plurimum conferat
 & temporis occasio & auxiliorum quantitas
 videatur, nil autem proprium possit sermone
 explicari, quod commune est cogimur scri-
 bere, non tamen propriam singulorum natu-
 ram aequè atque communem possibile est scri-
 bere, verum scripta contrariò modo se open-
 bus habent & lib. the. 13. cap. 11. Si qua-
 dem quod vacuandum sit id communis inco-
 catio est, unde autem & quomodo sit facien-
 da, id ager ipse docet locus. Vacuationis igitur
 diuersitas pro particularum varietate
 variatur, constatque communem indicati-
 nem (quod benè notandum est) non mi-
 gis esse utilitatis, quam noxa causam:

Lib. de ideo perpetuò monet Hippocrates, meati-
decorat sint solertes oportet, ad tempus appositì,
 occasionem arripiendam a commodati.

Quam praxeos à theorematibus vni-
 uersalibus discordantiam & disconueni-
 entiam, Iuan Huarte, paucis sic probat
In exam. scribens, Niuguna vez lega el medico à
de ing. nocer y curar qualquiera enfermedad, q
cap. 11. sacitamente dentro de si, no haga vn sil-
 gismo en Darij aunque sea empirico: y la p-
 mera de sus premissas, pertinesce su prouac-
 al entendimiento, y la segunda, à la y mag-

natiu

uatiua. Y assi los grandes Theoricos, yerran ordinariamente en la menor, y los grandes practicos en la mayor, Quæ cum sint verissima, multo profecto maior occurret scribenti de particularibus & vniuersalibus difficultas, & sæpissimè cum errare continget, qui volet infinitos particulares casus se ipsis omninò differentes per vniuersalia illa præcepta determinare, quod toto eo capite acutissimè probat & solidè dictus Huartes: Vnde nemini mirum videri debet, si ipse Galenus aliter in praxi egerit, aliter in præceptis vniuersalibus docuerit; sed his per transennam deductis, locum Galeni supra citatum explico &

Dico 1. sectiones illas non fuisse reuul- siones, sed propriissimas esse deriuationes, quia vt ipse fatetur Galenus, vt plurimum post septimum vocabatur, reuellendi occasione præterita, neque verò semper sic etiam in statu, aut prope statum contingit, sed sæpe, sic

Sæpe etiam est olitor valde opportuna Locutus.

Ad cætera (quod fecimus etiam in Pæ- xnesi nostra prima, & apologia) sic ref- Inf. cap. pondet Sennertus. Interim si artis opera 12. l. 5. artificiosam medicationem spectemus, magna etiam

etiam est reuulsio ex opposito latere utilis
tas, etsi ager mox eam non percipiat, neque
ea sola malo leuetur. Similiter ferè respon-
det Altomarus. Cap. de Pleur.

Cap. 2. ad
Glauc.
lib. 1.

Porro & huic praxi contradicit Gale-
nus scribens, cum magno dolore fluxu inci-
dente, non oportet neque oleum, neque cali-
dam afferre, hæc enim omnia rheumaticis
dispositionibus aduersantur, quamuis ab ini-
tio aliquid inuare videantur, semper enim
fluxionis motum ad contrarium trahere ex-
pedit, & ea apponere oportet, non qua tra-
here possunt, sed qua repellere, sufficit enim
in quibusdam doloribus vehementiam miti-
gare. Ex quibus manifestum fit dolore vr-
gente, quod docet & clamat Gardinus,
non oportere medicum directa sectione
conari coniunctam materiam euacuare
ad omnimodam doloris sedationem, sed
sufficere, dolorem aliquomodo, etiam post
temporis interuallum leuare, dolores au-
tem augeri docet quamdiu fluxio irruit,
quo tempore opposita sectio non nisi uti-
lis esse potest per Canon 8. quæ confir-
mans Iul. Gustauinius inquit, Etsi a prin-
cipio non sit conspicua & populo obuia utili-
tas, quia tamen postea illud tunc sequutu-
rum est, secundum rationem agentis, non cu-
randum

Loc. Med.
selec. cap.
de reuul.

tandem, si non tam citò & manifestè fiat, non enim per initia effectum expectare debet peritus artifex, quem diutius protrahendum esse prouidet,* & in eo ab imperitis differt & * Praestis-
tis medi-
ci cara-
cter. vulgo, si hac illis prädixerit; Neque enim in adstantium gratiam, qui prapostero desiderio festinant, oportet medicum solertem curationem peruertere, sed agri saluti consulere, & dignitatem suam sibi & imperium retinere, futura prädicens, quæ pernici cogitatione assequutus est. Quæ confirmans ipse Galenus concludit, Rationabiliter igitur iuxta indicationem remedijs utemur, et Lib. 2. de
compos.
med se
loc. 6. 1. si nihil efficere in principio appareat. Quæ doctrina manifestè concludit, allatum locum, nihil omninò contra quam institui-
mus in principio pleuritidis ad opposita reuulsionem facere, etsi malum subito non leuet, sicuti Galeno in statu è directò secanti sæpe contingit.

Sextò ex Gal. de vict. rat. in acut. lib. 2.

Cum igitur partium superiorum condole-
ntia signum fecerit, venam in cubito secare
eam oportet, quæ sanguinem ab affecta par-
te & magis & velocius, tum reuellere, tum
vacuare possit. & paulo post.

Nos autem partem eam quæ phlegmone
absidesur, tum celeriter, tum quam ceteras

M

partes,

partes, plus præsertim in acutis morbis vacuare contendimus, quod sanè interna cubiti vena facit, multoque magis ubi sanguinis redundantia ad superiora vergere videatur, aut superiores thoracis partes affecta sunt.

Dico 1. ista semper sano modo intelligenda, & sic agendum fluxione sedata, alias hæc praxis contradiceret doctrinæ vniuersali. Vnde,

Dico 2. hic agi de vacuatione mixta, quæ reuulsio non est per Canon. 9. quod indicât termini, *ὡς ἰσὶ παλαιὰ τε καὶ καὶ νεώτερα*.

Dico 3. quod ubi affectus duplicem præbuerit indicationem, non semper utrique indicationi simul satisfaciendum: Sed cōsiderandum si tutè id fieri possit, monente

Th. 3. cap. 7. Galeno; Minus auxilium præstat ei quod

potentius est, si minus sit tutum, quare Hippocrati morem gerens in hoc te exerceto, in morbis ut pro sis, aut ne quid noceas. Sic cum venæ sectione & purgatione æger opus habet, vena secta pharmacum in sequentem

Th. 5. cap. 11. diem transferimus. Sic in Angina Galenus primò venas in manu secat, post eas quæ sunt sub lingua.

Cum igitur morbus est in principio atque etiam augmento, duplex se offert occasio in matenæ vacuatione, scilicet

con

coniunctæ, quæ in parte affecta dolorem concitat, & antecedentis, quæ in lacuna & maioribus eius alueis æstuat, fluit & fluere minatur, illam directa sectio rectè demit, per Canon. 11. has distantior & contraria per Canon. 8. Articuli 2.

Quam medendi methodum necessariam, vt tutissimam docet post Galenum *Th. lib. 1. cap. 4.* Fernelius. *Causa omnis, inquit, priusquam effectus methodo rectè submoveri debet, nam contra si adnitaris, quantum huius acmes, tantundem antecedens causa proferet, atque licet affectus interdum leuior euadat, minimè tamen succedet perfecta curatio, Nempe causa antecedente nouam continuò materiam suppeditante, Quocirca causam primùm (scilicet antecedentem) genitus deinde affectu (quod in causæ coniunctæ ablatione consistit) submouendus; ita enim radicatus extirpabitur, ni vt deinceps eius repullulet,*

At ô bone Ferneli, cur causas morbificas sic oporteat ordine demere, nobis amplius edisere:

Quia quum longior quadam continuatio, feri sive causarum existat, in qua alia ex alia nasci & existere & omnes inter se a. t. a. nonnexamque videbuntur, suo quoque ordine

demenda erit, ab ea curationis ducto exordio, qua ortu prima, inuestigatione postrema fuerit inuenta, ab hac verò ordinatim ad ceteras, postremum ad morbum progressus fiet. Sed Ferneli malum vrget, dolor hominem præmit, leuamen postulat, celeriter vacuandum simul & reuellendum suadet Galenus, Quid tum? Methodi atque ordinis conuersio, non modo nil ad curationem proficit, sed & plerumque morbum conduplicat, cum enim persistente causa (scilicet antecedente) de morbo (id est coniuncta materia) nonnihil subtrahitur, licet nonnihil fortasse sibi æger leuatus esse videatur, mox tamen pari ferocitate morbus repetit, atque etiam interdum maiore. Ergo urgente quouis etiam symptomate, quamdiu virium robori fidimus (vt in pleuritidis principio) methodus tenenda est, nec contra artis præceptum, in egrotantis gratiam vni symptomati vacandum. Sit hic ergo contra Gardini decretum sequens conclusio.

Orat. 4.
pag. 54.

Non igitur urgente pleuritide, & fluxione ferociente cum magno dolore, vt ibi scribit Gardinus, actu vebemente: Decreti
Coclus. 7. affligente statim & semper, eiusdem lateris basilica secabitur, vt subitum leuamen sequatur, ne doloris sæuitia oppressu
(quoc)

(quod obijcit) intereat æger. Quippe & doctè, doctus hanc quærelam soluit Iul.

Scaliger inquit, *Cum pleuriticus eodem* Coment. in lib. de Infirm. Hipp.

die, vel paucis horis mori non possit, rectè ex opposito brachio reuulsione fluentis & fluxuri sanguinis celebrata, sequenti die vel paucis post horis, tuto derivationem & à parte affecta euacuationem directà sectione instituemus. Et hinc nascitur altera contra

Gardini dogma conclusio: Quæ talis est, Orat. quodlibet 1. p. 15. & orat. 4. pag. 54. & 57.

Nullò modo ad saphenas recurrendum docet Galenus allegata sententia, ne quod timet Gardinus, sanguis in azygotam attrahatur, opposita sectione; Nempè Galenus hic basilicam secandam docet, maxime si sanguinis redundantia ad superiora vergere videatur, μάλλον ὅταν τὴν βόπην ἀνω τὸ πλησιάζον ἂν μα φαίνεσθαι ποιεῖμεν.

Nos ergo oppositam prudenti consilio secamus, quæ fluxurum & influentem (fatente etiam Gardino) sanguinem ab Pag. 14. orat. 1 & 56. orat. 4. exortibus intercostalis, mamillaris, & thoracicarum (per quas etiam pleuriticam fluxionem fieri contendit) reuellere potis est.

Replicabit quis cum Fernelio & Fucio. Sed quid opus tot sectionibus ægrum torquere, quem possis semel malo leuare?

M 3 Resp.

Lib. 2. 8h.
cap. 7.

Resp. Fuccium non sibi constituisse, similiter nec Fernelium, & quæ præceptis vniuersalibus docuerat, in practico vñ reprobasse: Hic renibus, aut pudendis, aut his vicinis partibus phlegmone laborantibus, reuulsionem primò ex parte superiore instituit, deinde ad saphenas confugit, idque agit prouidendæ fluxionis metu & merito inquit; *Quia si quis temerè ab initio hoc experiatur, fluxionis impetum & phlegmonem augebit, hic igitur obliuiscitur doctrinæ suæ cap. 5. lib. 2. vbi medici consilium omne dirigit, ut à loco phlegmone occupato plus sanguinis ac celerius, quàm à cæteris partibus hauriatur, & ideo ait, amola vena finitimo loco secanda est, & sanè eodem cap. partibus subter renes, malloolorum sectiones addixit.*

Lib. 2. cap.
6.

Sed cum ad nauseam iam à Galeno edocti simus, partem affectam, etiam citrà plethoram à partibus oppositis valentibus & distantissimis fluxionem recipere; Nos etiam & citrà plethoram, oppositam sectionem multùm & tuidò prædesse posse concludimus: Quoniam & fatente eodem Fernelio. *Vena opposita loco tusa fluxionis impetum sistit, nonnihilque vi reuulsionis, ex affecta parte reuocat, quod perpetuò negat Gardinus.*

Ad

Ad secundam loci allegati particulam.

Dico Galenum in praxi non sic perpe- *Lib. de C.*
tendegisse: In vteri inflammatione contra *rat. p. V.*
sentit, vbi superiores secat & cap. 94. art. *Señ. 12.*
med. docet prius plethoram euacuandam
& à parte reuellendum, quam ex parte
vacuandum conformiter Canon 9. Ar-
ticuli 2.

Initabis cum Fuccio & Fernelio. Op- *Fernel. 2.*
posita sectione bonus duntaxat sanguis *th. cap.*
vacuatur, & putris à phlegmone in lacu- *Fuc. in*
nam reuocatus puro sanguini permisce- *inst. lib.*
tur, & sinistram pleuritidem inuehit, si- *2. Señ. 2.*
cut etiam obijcit Gard. orat. 4. quodlib.
pag. 76.

Respondeo, negato antecedente, &
concesso, bene esse quod putris humor
tali sectione in lacunam reuocetur, quia
sic, quod negant, opposita sectio potens
esset à parte affecta vacuare, facile enim
in lacunam reuocatum & puro sanguini
permixtum foras eliciet promiscuè, quod
fatetur in omni sanguinis missione fieri
Fernelius: Quod si promiscuè sic vacuatur *Th. lib. 2.*
quomodo oppositam pleuritidem inuehet? *cap. 7.*

E contra duplex infortunium directam
in principio secantes consequitur, nempe
fluctionis ad partem affectam prolectio,

& quod obijciunt, putris humoris (si tum putris sit) cum puro sanguine permixtio:
Inil. lib. 2. sect. 2. Nec negat Fuccius, *in dextra*, inquit, *pleuriti-*
de, *eiusdem lateris vena sanguinem a-*
gras partes obsidentē in cauam venam trans-
fert, ergo puro sanguini permiscet: infero,
 Si directa sectione in cauam trāslatus cum
 bono promiscuè vacuatur, & opposita se-
 ctione id etiam fieri necesse est, cum vtra-
 que basilica lacunam æqualiter euacuet.
 Quod fateretur idem Fuccius. *Necesse est*,
 inquit, *in vacuati sanguinis locum inanitis*
venis alium succedere, *trahentibus enim*
propter inapiam venis in aduersa & sinistra
parte, *ægra partes promptè concedent ut-*
pote quibus sanguis iam non tantum sua co-
pia, sed etiam vitiosa qualitate molestus est:
Iam & expultrix facultas quæ munus suum
obit per transuersas fibras, a noxio & redun-
dante in affecta parte sanguine irritata, ocys-
sime in oppositum latus iam vacuatum, atque
ad eò tum vacui ratione, tum quia validior
est ad se trahens transfert.

Concludit ergo rationibus, oppositum
 latus vacuatum à parte affecta reuellere, si
 ipsi credimus, quod si est, ad se reuocatum
 sanguinem per sectionis locum vacuari
 promiscuè oportet, nec nouam pleuriti-
 dem

dem inuehi posse certum est.

Regerit hic Gardinus. Putris à parte humor directà sectione vacuari potest per anastomoses eiusdem lateris, & sic in lacunam non transferetur, nec puro sanguini permiscebitur.

Pag 76. o.
rat quod
lib. 4o

Respondeo primò, istas anastomoses impotentes esse & dubias, quod probatum est Articulo 5. putrem & extrauasatum humorem per apicales anastomoses venarum retrahi non posse, quod & probabitur postea in solutione quærelæ 15. Confectum etiam, quod si in principio secantur directæ, fluxionem prorittari, humorem in parte affecta nondum computruisse: Et directam sectionem in principio per anastomoses damnosè operari, ostendetur etiam postea in quærelarum solutione. quær. 10. In vniuersum si hæc aliquis sint momenti, quod non, transeat, in statu enim oppositam non secamus, quo tempore, contendit Gardinus oppositæ sententiæ authores duntaxat directam secuisse, ad putris humoris ex parte affecta euacuationem, & quocumque tempore directam secuerit, non impediet quin per ostium azygotæ à parte affecta, contentus circa phlegmonem humor, aut in ipso

ipso, si retrocedere possit, in lacunam retrahatur & puro sanguini permisceatur: Est enim omnium sensus, tam eorum qui sectis fibris tractionem peragi autumant, quam eorum qui per communes vias, fibris nihil agentibus, eam vacuationem continui & vacui necessitate fieri putant.

Sed replicatur iterum ex Fuccio & Fernelio. Si ad penuriam vsque detrahimus, vix denuò alia humorum fluxione pars affecta cōfictabitur, & sic nullus erit proritandæ fluxionis metus.

Ad quæ, dicimus, talem vacuationem periculosam à Galeno ipso censeri, & ab omnibus damnari, & rectè hic Fernelius lib. 1. cap. 10. *Conducibilis sit agrum diutius torqueri, quam una cum morbo vitam omnem profundere.*

At non vna vice, inquit Fuccius, vacuabimus, sed per ἡναγκασις.

Nec valet replica: Quia si non vsque ad penuriam detractum sit, pari ferocitate quod ait Fernelius, aut etiam maiori repetierit morbus, vnde nil efficiet, nisi malè,

*Th 14. c.
de pleur.*

& ideo Rondeletius, *Vacuatio*, inquit, è directo partis affectæ vna vice debet fieri, & ad sanguinis mutationem facienda est, quia nisi magna fiat sanguinis vacuatio ab ea parte,

te, plus damni euenit quam utilitatis, nam illa pars sanguinis missione commouetur magis: Vnde iterum concludo.

Epieraticè tutò vacuabimus, si opposita sectione præmissa & fluxione pacata, directam suo tempore secuerimus.

Obijcit Gardinus. Venæ eiusdem lateris, cum succubis arterijs, per multas anastomoses inter se communicant, atqui per venas & arterias eiusdem lateris fit pleuritis in eodem latere, ergo per directam basilicam sanguis magis $\kappa\alpha\tau'\iota\zeta\eta$ reuellitur & euacuatur.

Dico r. ad reuulsionem non requiri illam societatem per $\kappa\alpha\tau'\iota\zeta\eta$ directam, sed oppositam distantem & contrariam, quod probatum est Articulo 6. ubi etiam dictum est arterias ab incubis venis halitum duntaxat trahere posse, sanguinem nullo modo multo minus crassum & impactum & à natura alienum. Imò amplius probatum est, arterias cum venis non nisi per originales in corde anastomoses rectè sociari, paucas esse venas thoracis quæ succubas habent arterias, in pleuram nullas inferi, sicut postea probabitur quærela 14.

Ad minorem, Dico per oppositas etiam venas pleuritides fieri (quod latuit Gardinum)

*Lib. nat.
falsit.*

num) parte scilicet potente ad debilem materiam morificam continuò propel- & amandante, perpetua & firma Galeni doctrina.

Sed & concessa maiore & minore: Dico 2. consequentiam esse falsam: Quia verum quidem est quod per directam sectionem magis & melius κατ'ἔξιν deriuatur & vacuatur sanguis, sed per oppositam melius & quidem κατ'ἔξιν etiam reuellitur per canones 6. & 7. Articuli 2. quod quærimus.

Dico 3. parem esse venarum oppositarum cum succubis arterijs communio- nem, atque directarum, quare vacuatis oppositis venis, necessariò per præteritas anastomoses succubas arterias vacuari, & his vacuatis necessitate vacui & conti- nui oppositos stelones arteriarum in parte corporis affecta inaniri, sicut de venis Articuli 6. demonstratum est, & ideo per oppositam κατ'ἔξιν sanguinem tutò & secu- rè reuelli, per directã verò nequaquam si- cut etiam demonstratum est exemplo ve- narum in fine Articuli 6.

Ioubertus demonstratione 10. paradox. decad. 1. Quærit inflammationis in prin- cipio in ἀποχῆρα an eiusdem cubiti ve- nam secare consultum sit, vt humor fluens

in medio viæ intercipiatur, quod quare Celsi autoritate motus, qui distantissimas sectiones improbat. Responsum quia tabellarius nondum retulit, pro eo sic

Respondeo 1. Celsum humero affecto oppositam basilicam secuisse, *quia, inquit, oportuniores hæ partes iniurijs sunt.* Secundo, cum in brachio plures sint venarum stolones, qui ad manum perueniunt, impossibile erit scire, per quos illorum fluxio fiat, fit enim fortè per plurimos internos, & sic, aut eum per quem fluxio non fit, secabis, nec dolorem leuabis, sed fluxionem augebis, vel omnes brachij venæ sunt secandæ, quod crudele est, nedum possibile, vnde miror Fernelium in eiusmodi casu cubiti directi venam voluisse secari, neque enim opposita basilica nimium distat vt ab opposito humero reuellat, quod certè nos edocuit inter Græcos princeps Aræteus oppositè reuellès, cui oppositū brachiū in pleuritide plurimum distat.

At verò quod peius est, eodem loco, in cubiti phlegmone, directam in manu secari præcipit, contrà Galeni dogma, qui in manus phlegmone cubiti directi venam secari vetat.

Sic solutis Curtij, Fernelij, Fuccij, & paradoxæ

Ther. lib. 2. cap. 8.

Ther. 183. cap. 9.

radoxæ sententiæ argumentis, quæ Gardi-
nus pro saphenarum sectione contra op-
positam sectionem protulit examinare tē-
pus est, ac primò sic docet.

Orat.
quodl. 3.
pag. 57.
& alibi
passim.

*In pleuritide imminente, (intelligit futu-
ram) saphenam alterutram secato, siue adjsit
plethora vniuersalis, siue non.*

*In principio pleuritidis, dum ipsa vix est
in fieri, saphenam eiusdem lateris tundito.*

*In pleuritide existente aliquatenus in fa-
cto esse, sed & adhuc multum in fieri, si cor-
pus sit plethoricum, saphenam primò dire-
ctam secato, paulo post ad directam basilicam
re conferas.*

Tertio 9.
comment. 2.
de nat.
lib.

Harum Conclusionum rationes repe-
tit ex Galeno; Primò, curare oportet lon-
gissimè secare à locis, in quibus dolores si re
consueuere & sanguis colligi, ita enim con-
suetudinem praecideris, ne amplius eodem lo-
co colligatur & ex cap. 11. th. lib. 3. Siqui-
dem longe à parte affecta qua fluxione ten-
tari incipit reuelli re, nequaquam ad eam at-
trahere expedit.

De C. R.
per vena
sect. cap.
19.

Secundò ex Galeni praxi: Podagri-
cos (idest inquit Gardinus propos. 5. a-
pol. podagræ obnoxios, necdum labo-
rantes) ex cubito euacuato. Comitibus
verò morbis, vertiginibusque obnoxios, qui

morbi sunt capitis, potius ex cruribus.

Ad quæ,

Respondeo primò, ferè vanam esse quæ-
stionem de prophylactica pleuritidis, quia
ad pleuritidem futuram non vocatur me- *Orat. 3.*
dicus, & licet *stultis id competere dicat pag. 54.*
Gardinus, cogitur tamen postea fateri *& orat. 2.*
quod vt plurimum vocetur medicus in *pag. 380*
statu cum fluxio tota facta est, quem sta-
tum audacter & incautè quarta die con-
cludi asserit *orat. 4 pag. 74.* ob quam ra-
tionem solam malè etiam docuit directam
secantes, sic perpetuè egisse.

Enimuerò tunc vocatur medicus cum
dolor sentitur, quia cum dolent agrotare
se sciunt, sic docet Galenus. Nunquid ubi *Th. 1. cap.*
5.
citra offensam omnium corporis partium acti-
ones obeunt, & valere se dicunt, & minime
medicis egeri? ubi verò naturalium corpo-
ris actionum senserint quampiam vel malè
geri, vel prorsus non geri, agrotare se illa
corporis parte existimant, cuius actionem la-
sam viderint, & medicum de remedio con-
sulunt; Sic est Galene & tuam doctrinam
sic confirmat Val-sius, necesse est cum prop-
ter fluxionem aliquam languis mittitur, ali-
quid fluere, si modo fluxionis principium est
& aliquid fluxisse, nequè enim fluxionem

antea

antea sentimus quam id quod fluit, dolorem excitet: Vana est igitur de præcauenda pleuritide futura, anxia illa & intricata Gardini doctrina.

Respondeo 2. ad plethoram euacuandam, quæ futurorum morborum est materia, omnes medicos ad basilicam dextram tanquam ad sacram anchoram confugere, quod fecit Galenus, quem nullo loco ostendet saphenas secuisse ad plethoram, aut cacochymiam euacuandam, ad futuros, aut imminentes morbos præcauendos, & eum meritò sequutus est medicorum chorus; Fernelius in primis inquis, plenitudo citra affectum, commodissimè, vsuque maximo ex interiore cubiti dextri, quæ à caua plurimum & validissimè prolicet, tollitur. & postea, Quacumque ex alijs causis nata plenitudo morbos minatur (ecce imminens morbus) eos inhibebit secta iecoraria, in flexa cubiti dextri: Sic Mercurialis in pleuritide in qua vix aliquid influxit oppositam secari iubet. & Heurnius capite etiam de pleur. in sua praxi sic docet. Vbi metus pleuritidis adest, opposita secatur, si quis dextro latere affligi solet, ei cottannis sinistrum brachium aperiatur. Quid clarius potest adferri & quod pressius Gardini

con-

Thor. lib.
2. cap. 7.

Mez. th.
lib. cap. de
pleur.

conclusiones euincat. Agmen claudat
 Christophorus à Vega. *In futuris morbis* Art med.
lib. 2. sect.
5. cap. 1.
præcauendis vnam, inquit, venam secato,
quæ iecori è directo respondet, tanquam ex
sanguinis fonte sanguinem haurientes.

Ad Galeni rationes, Dico morbis ibi
 nominatis præcauendis posse reuulsionem
 certam determinari; Quia periodicorum
 morborum certæ sunt & notæ minere,
 notæ matrices, nota loca, quorum semi-
 nia ad tempus sopita statis temporibus
 germinant & efflorescunt, & dum effe-
 runtur, similium aduentum etiam à distan-
 tissimis partibus, per assuetas notasque
 vias vi magnetica propiciunt.

Neque verò vertiginosi affectus, & co-
 mitialis semina sunt in capite, etsi capi-
 tis affectus sint, quinimò sæpe in pede, vie-
 ro, testibus, hypochondrijs, vnde analep-
 siæ & catalepsiæ: Podagrica sæpe in capi-
 te, nonnunquam & pluribus alijs locis &
 regionibus (quod rectè notauit nuper Ro-
 bertus Montanus Dixmudanus medicus
 contra Fernelij dogma erroneum) delire-
 scunt. Vnde qui reuulsionem horum causa
 moluntur secando saphenas, aut superio-
 res, non à distantissimis, quod opinatur
 Gardinus, sed à fonte fluxionis & semini
 N quam

*Libell. de
artrit,*

quam proximè, licet longè à parte affecta, euacuât, scilicet per venas quæ cum fonte maiorem habent communionem, per Canon. 6. idque benè.

In futuris igitur morbis præcauendis, non pars afficienda maximè & sola consideratur, sed pars mittens, cuius consideratione, venam proximam fonti fluxionis euacuamus ex aduerso à parte affecta longè reuellendo.

Quid est ergo longissimè secare? Nempe ad talem distantiam vt prodesse possit, citra periculum proritandæ fluxionis ad partem affectam. Sic Aræteus vnum brachium ab opposita pleuritide plurimum distare asserit, & Iul. Guastauinius vtramque basilicam ab oppositis pleuris itidem longissimè distare docet. Atque ideo cautè Galenus podagricis saphenas non secuit, quia, vt antè notauimus, membræ læsa scarificari, aut ferro lædi vetuit; Verùm, inquit eod. cap. Si artriticus sit omnibus articulis laborans, æquè pars quæuis ad sanguinis missionem est accommoda, in consideratione partis affectæ, sed in consideratione fôtis fluxionis, proximior fonti vena & maior cæteris paribus erit aperienda.

*Acut. lib.
t. C. 10.*

*Loc. select.
cap. de
pleur.*

Eam doctrinā in praxi vbique profel-
sus est Galenus. Sic si in ore fuerit phleg-
mone in principio humeralem secat in
manu, si iecur, pulmo, cor, aut pectus af-
ficitur internam sphenis. *Affecto,* D C R.
inquit, *latere, aut pulmone, aut septo trans-* per Vena
uerso, aut liene, aut iecore, aut ventriculo, Sacap. 160
interior in flexu cubiti scienda est. reddidit
causam nat. facult. lib. 1. cap. 1. quia re-
dundantia in his partibus, quæ post hepar
sunt, si qua erit, circa cor & pulmonem erit.
Ecce quanti faciat in thoracis affectibus
à fluxionis fonte reuellere, per distantes
quidem, sed non distantissimas sphenas,
quæ ob distantiam prodesse non possent.

Quam Galeni doctrinā tequutus etiam *Loc. Med.*
Iul. Guastauinius concludit. *Ad euacuan-* cap. 90
dum totum in morbis grauissimis, ut angina,
pleuritide, ad internam brachij confugien-
dum, quia velocissimè vacuat totum cor-
pus ex ijs partibus quæ principes sunt. Eo-
dem planè sensu scribit Fernelius, Reuul- Lib. 1. lib.
sio qua fit secta interiore cubiti vena, quia cap. 9.
iecur ipsum exhaurit, à quo fluxionis est
exordium, vniuersalis censetur. Quæ uerò ex
venis inferioribus fit, particularis, neque fon-
tem primario euacuat. Malè igitur cense-
tur (quod in supra positis Gardini conclu- Lib. 2. lib.
siunt- cap. 30

tionibus asseritur) quum ingens est plenitudo ne fluxio geminetur, copiam primo & inferioris pedis vena subtrahendam.

Li. 2. inst.

sect. 5.

At Fuccius, directè contra secundam & tertiam suprà positam Gardini conclusionem sic concludit. Vbi partes tam phlegmone laborare cœperint, vena in distantissima parte minimè aperienda est, dat rationem nam hac ipsa noxiū humorem ignauius, tardiusque concitat, neque hunc a sede laborante (quod sustinet Gardinus) abducit, & paulo post cumulatis rationibus, sapphenarum sectioni securim immittens, inquit, Non est ergo in ullo phlegmone ex distantissimis partibus sanguis reuellendus, nempe à distantissimis locis detractus sanguis solam copiam (contra Gardini decretum) minuit, nec quidquam tamen deprauati sanguinis elioit, atque ideo parti oppressæ leuamento non est. In eadem sententia perstant omnes Galli, & olim Celsus, ex adeo, inquit, remota sectione, vix nisi per plenissimam vacuationem (quam omnes damnant) à fonte fluxionis quidquam vacuatur.

Lib. 2.

cap. 10.

Cont lib.

7 cap. 4.

His se adiungit Franc. Valesius docens, In pleuritide nunquam inferiores secanda sunt, quia quod factum est morbi ratione partes vrget. Idem est Sennerti sensus.

diri-

Litem dirimit Ioubertus. *Partium in-* *Parad. 10
decad. 1.*
quit superiorum sanguinem ad partes infe-
riores secta in poplite vena detrudere, non
est brevis temporis opus, nam id consecutione
& sensim fit, dum ad locum inanitum humo-
res hinc inde confluunt: Quod si demonstra-
ret necessario ad inferiora vergere sangui-
ne secta poplitis vena, non tamen eo probabis,
humorum qui partem affectam petunt impetum
mox retineri. Nepe tali sectione teste Hip-
pocrate, haud repente magna mutatio fiet. *Lib. de
Nat. hu.*
 Quem Hippocratis locum supra dolose
 citans, mancum reddidit Gardinus, omis-
 sis his *haud enim magna repente mutatio*
fiet, ex distantissima à loco affecto sectio-
ne, quam tamen repentinam mutationem
in morbis grauissimis, vt pleuritide com-
 mendat, si ut & interpretis eius Galenus, *Lib. de
vict. in
acut.*
 unde hic recte concludo :

In futura pleuritide, & imminente,
 & ea quæ vix est in fieri, & in ea quæ est
 adhuc multum in fieri & aliquantum in
 facto esse, siue plethora adsit, siue non, sa-
 phenarum sectiones inutiles sunt & reij-
 ciendæ. Et reuera ipse Gardinus contra
 primam suam conclusionem sic conclu- *Orat.
quod. 2.
pag. 43.*
 dit. *Si corpore vniuersaliter plethorico, im-*
mineat pleuritis, æquè pars quævis ad sangui-

In apol.

nis vacuationem est a commoda, & similiter contradicit conclusioni primæ decreti vbi dicit ex eadem hypothesi, Præstat omnium primò venam in pede secare, siue plethora adsit, siue non. Tanta est veritatis vis, vt nullis sophismatibus ita deprimi possit, quin seipsa emergat.

Obijcit Gardinus orat. quod. 1. pag. 15. & orat. 3. pag. 54 E superioris parte lacunæ oritur azygota & intercostalis ergo si oppositam basilicam seces, attrahes & facies ascendere sanguinem ex iecore vt per azygotam & intercostalem ad pleuritidis locum irruat, secus si saphenam.

Resp. primò nullum esse periculum si Celso credimus, Fuccio, Fernelio, quin etiam ipso docente Gardino, qui in pleuritide actu urgente & ferociente, non timet directam secare, quæ omnibus ab ipso allatis incommodis magis possit esse obnoxia, quam opposita, propter assignatas articulo 5. rationes: Cur ergo timebimus oppositam secare, cuius ad azygotam par est proportio, & æquidistancia?

Enimverò sanguis qui in pleuritico affectu, fluit & fluxurus est ad locum affectum, maxime in principio, non est is qui in regione est infima, sed in supera, nec

satis

satis hic tui memor est Gardinus, qui in *Gal. nat. facult. 2. cap. 1*
 pleuritide imminente docet sanguinem
 moueri in venis circa cor & pectus, quod
 si est, vt est, distantissimæ saphenarum se- *Orat. 4. pag. 73. & 71.*
 ctiones hic erunt inutiles, & qui opposi-
 tam secabit, à fluxionis fonte rectè va-
 cuabit per Canonem 6. quod sanè præci-
 pit Galenus, *multoque magis*, inquit, *si* *Comens. 10. de viâ. acut.*
sanguinis redundantia ad superiora vergere
videbitur, aut thoracis partes affecta sint.
 Quinimò & partium inferiorum ligatu-
 ris si quid timendum esset, facile proui-
 deri posset dum superiores secantur.

Respondeo 2. Gardinum passim doce- *Orat. 3. pag. 54.*
 re saphenas vacuare non solum ab ostio
 azygotæ, sed etiam ab alijs venis per quas
 fit pleuritis, intercostalem scilicet, ma-
 millares, thoracicas; Quod si est, obiectum
 infortuniû & maiora timere debet, quia,
 quod probatum est, antequam per saph-
 enas quidquam à partibus superis vacuet,
 omnes teste Fernelio inferiores venas ina-
 niat necesse est: in quibus cum prauus
 non sit sanguis, nec ibi æstuet ex Galeni *Nat. fa- cult. 2. cap. 1.*
 doctrina, bonum duntaxat sanguinem va-
 cuabit, quod ipse nobis obijcit, cum cer-
 tissima corporis exsolutione, tum & æstu-
 antem in superis prædictis venis sangui-

nem in azygotam quod obijcit etiam, attrahet: Sed reuera inania sunt eiusmodi phantasmata & Academico Doctore indigna, & quæ responsionem non merentur.

Obijcit 2. & detortè citat & interrumpit Galeni locum ex lib. de C. R. per. V. sect. cap. 19. ut præcedentem obiectionem confirmet, qui sincerè sic habet. *Quæ ex cubito sunt euacuationes aliud habent adiunctum malum, nempe quod menstruas purgationes comprimant, sanguinemque ad superiores corporis partes retrahant; Quæ verò sunt ex cruribus non solum non retrahunt, sed etiam menses promouent ex quibus sic*

arguit. *Per sectionem in brachio, sanguis sursum attrahitur, ergo in pleuritidis principio id fieri non debet, nisi cum maximo periculo.*

Respondet quod hic locus manifestè Gardini doctrinam condemnat. Quippe si doctrina Galeni suprà posita, partes superiores superiorum, inferiores inferiorum sectione leuantur & in vteri inflammatione, sectione inferiorum reuellendo simul & vacuando à parte affecta, non timet ne quæ in parte superiore est sanguis ad locum affectum attrahatur, profectò nec

nec nos vereri debemus in thoracis affectibus, ne superiorum sectione sanguis infimæ regionis sursum attrahatur, quod docet idem contra Erasistratum Galenus *Lib. de sag. miss.* cap. 4. *Docet, inquit, Hippocrates Quo ducere expedit & quo maximè natura vergit per loca conferentia co-ducendum:* Subsumo, in pleuritide sanguis partes superiores virgit, & per hæmorrhagias sæpe illam iudicat, concludit Galenus ibidem: *Propterea etiam in lateris inflammatione laborantes curans Hippocrates iuxta humorum urgentiam inanire eos consuevit interna cubiti vena secta.*

Sed cur loco citato venæ sectioni in cubito adiunxit malum?

Respondetur non absolutè nec vniuersaliter id enuntiarì, potèrò eo loco, quia intendit menses prolicere in vteri inflammatione; quas à retentis mensibus ortu erat, ideo si superiores secasset, quæ illos sustinere aptæ sunt, malè in eo egisset, nempe menses non mouisset, nec à parte affecta quod intendebat vacuasset, alias etiam dum reuellere satagit & fluxionem veretur ad vterum phlegmone laborantem, basilicas secatur, quod fuisse Galeni intentum dicant sequentia, *ὅτι τὰ τῶ ἀμνα-*

ἵος ἐκ μήτρας πορᾶ συνίγῃ μετὰ τῷ ἀπὸ τῶν
 σκελῶν ηἰνώσει. Sic in pleuritide mentibus,
 aut hæmorrhoidibus suppressis; si earum
 suppressio pleuritidis causa censeretur, &
 spes esset illos promouere, malè quando-
 que à cubiti sectione inciperetur curatio,
 sed præstaret saphenas aperire, non quod
 reuelleret æstuantem iam in partibus tho-
 racis sanguinem, sed quod fluctionis fon-
 tem euacuarent & antecedentem causam
 influentem tollerent, per Canon. 6. Art. 2.

At verò cum rarissimè talis occasio se of-
 ferat, quam dolosè, aut incautè hunc lo-
 cum deprauarit Gardinus manifestum est
 à propositione conditionali & particularii
 conclusiones vniuersales inferens.

Obijcit 3. & ad argutias se transfert;
Vena, inquit, saphena habet communionem
 κατὰ τὴν ratione anastomosis per epigastricas
 ascendentes cum mamillari directâ descen-
 dente, & hæc cum ramusculis azygota, ergo
 sectâ directâ saphena per istas anastomose:
 non solum reuellit à lacuna per iliacas, sed
 etiam à loco affecto, at opposita basilica nullâ
 lam κατὰ τὴν cum opposita pleura habet commu-
 nionem ergo saphenarum sectio, opposita sec-
 tioni præstat.

Respondeo probatum esse communio-

nem

nem κατὰ τὴν venarum vtriusque lateris articulo 5. & 6 Reuulsionem de qua disputamus fieri per originales anastomoses, vacuationem prætentam à parte affecta, per terminales anastomoses & cæcas vias dubiam esse, & quod in principio sic vacuare periculosum esset, vt amplius probabitur in solutione querelæ 10. Quæ cum rejicere non posset Gardinus: Rege- Orat. 4.
pag. 69.
73. 79.
rit. Saphena non solum vacuat à parte af-
fecta per epigastricas, sed etiam per in-
sertionem apicis azygotæ ad lacunam des-
cendentem, ob eam communionem, in-
quit, concludit Riolanus, *Cognoscet quã-
tum utile sit lumbis cucurbitulas adhibere
cruentas & de pede sanguinem detrahete
inchoante pleuritide.*

Respondeo primò, Gardinum hic Rio-
lano imponere, non enim sic concludit,
sed cap. 7. lib. 3. scribit. *Ratione huius
fortuitæ insertionis* (non enim in omnibus
corporibus conspicitur sed aliquibus dun-
taxat) *quidam Medici Arabum sequaces oc-
casionem sumpsero secandi venam in pede, in* Anthrop.
lib. 2. cap.
5. & 8.
*pleuritidis principio: At dum ex propria
sententia concludit, sic ait cap. eodem, In
pleuritide oportet semper è directo lateris af-
fecti venam scire secundum Hippocratis &
Galen*

*Gi. ni sensu n. & lundenda basiliu. ut linea
recti sanguinem ex latere affecto vacuamus.*

Respondeo 2. istarum venarum stolo-
nes ad libitum cuiusque phantastici tin-
gi, commentitios & dubios esse, in pluri-
m's corporibus non reperiri, à præstan-
tissimis anatomicis irrideri & contemni:
Anthrop. & talia, inquit Riolanus, *Sunt natura lu-*
lib. 3. c. 3. *sus, quæ nihil certi asseuerant;* quod sanè
probauius articulo 5. & si quandoque re-
periantur, nihil posse, quia saphenarum
sectiones nimis distant.

Sic solutis aduersæ sententiæ fundamen-
tis, & aduersariorum argumentis, ad que-
relas academicorum Duacensium & præ-
cipuè Gardini respondeamus oportet, ne
neophyti medici in artis operibus non sa-
tis exercitati, praua adeo & damnanda
hæresi imbuti, incautos ægros innocenter
opprimant, cui operi destinatur excursio
sequens.

Monitum tamen volumus lectore, nos
non absolutè affirmare, semper in pleuriti-
dis principio opposita reuulsione vtédum,
ne sic Agyrtis & barbatenus medicis in-
scitiæ & temeritatis asylum struamus, sed
quando id agendum sit, aut non, docti & ex-
perti medici solertiæ liberū relinquimus.

EXCURSIO
AD QVERELAS M. LV-
DOVICI GARDINI, SCHOLÆ
medicinę Duacensis Pro-
fessoris.

AD REVERENDVM ET
CLARISSIMVM VIRVM,
D. FRANCISCVM
LE CLERC,

*Artium & medicinę Doctorem, Eccle-
się Cameracensis Canonicum.*

ABsoluta Parænesi, CLARISSIME
DOMINE, relectis iterum Gardinĩ
quodlibeticis orationibus, visum mihi
est me, nec lectoribus nec mihi ipsi, satisfac-
cisse, nisi Gardini querelas passim sparsas di-
luerem, contradictiones & in terminis quibus
nimis liberè & oratoriè vtitur æquiuationes
& inconstantias ostenderem, simul & Do-
ctrinæ

Exercit.
307. sect.
20.

Orinæ confusionem; Enimuerò in periculo-
sa adeo disputatione si magno Scaligero cre-
dimus, *rationibus hic maximè agendum fue-*
rat viro veritatis studioso, non Tullianis, Pla-
tonicisque pigmentis: declamationes enim ani-
bitiosorum opera, otiosorum cibi sunt, na-
tura negotijs impedito animo studendum est
ei breuitati, quæ res æquet verbis, demonstra-
tiones certas pro nectare habeat. Atque ideo
Clarissime Domine, excursionem hanc scripsi,
in qua querelis Gardini sic respondeo vt totam
prudentissimo vestro subijciam iudicio; eoque
lubentius id ago, quod Asclepiadarum è fa-
milia oriundus es, à magno, inquam, illo Cla-
rissimo & expertissimo D. Hermete le Clerc,
verè Trismegisto, qui non solum Neruios sed
etiam totum Belgium longè latequè sua fama
impleuit. Enimnerò mentis tuæ *δύναμις κρι-*
τικῆς Paternis præceptis perpolita, te licet
in Apollinea doctrina excellentem fecit, vt
prudentiæ tuæ singulari, & raræ in agendo
dexteritati & solertiæ virtute tuâ præmiun-
non tam conferente quam persolvente, om-
nium assensu ad Cameracensis Ecclesiæ ca-
nonicatum euectus sis: Quare æqui bonique
consules; CLAR. me Dñe, si dum mentis tuæ
Apollinæ *κρίσις* subeo, incolumen vitam
deuotus apprecor,

QVE.

QVERELA PRIMA.

Anticharis pag. 98. in Parænesis titulum
sic insurgit

Titulus tuus est de vena sectione in pleuritide, quod sic enuntiatur absolute, de nulla non pleuritide, & de nullo non morbi tempore intelligendum certe est. Subdis contra Fernely sententiam: Si contra, enuntiatio tua debet esse contraria enuntiationi Fernely.

Dico quod hæc querela nodum in scirpo quærit. Titulus parænesis meæ non est vniuersalis propositio, sic enim habet sine interruptione. De vena sectione parænesis endoxa contra paradoxam Fuccij, Fernely sententiam: Et posito quæstionis titulo sic quærit. An in pleuritide eiusdem lateris vena perpetuo sit secanda. Vnde manifestum fit, me de ea venæ sectione in particulari agere quæ aduersatur paradoxæ Fuccij & Fernelij, quæ si contraria meæ enuntiationi erit, & mea illi contraria sit oportet.

At Fernelius, replicat Anticharis, quando iubet basilicam eiusdem lateris tundi, potissimum

tiſſimum loquitur de pleuride urgente & qua eſt plurimum in facto eſſe, non de ea qua eſt in principio aut in ſi ri, & ſi contra eum reuera nil opponis, quia contraria ſunt, quæ de eodem ſecundum idem, ac eodem tempore enuntiant :

Hic laqueus, & in foueam quam fecit incidit, nec per plurimum, nec potiſſimum, neque per omnia quibus vtitur cõparatiua, pedicam declamator effugiet: Porro hinc ſequitur ſententiæ meæ approbatio; ſi enim Fernellius, & ſequaces, quod fingit Anticharis, in pleuritidis ſtatu, & quando pleuritis plurimum eſt in facto eſſe, oppoſitæ ſectionem duntaxat damnant, quia tunc temporis directam commendant: Profectò in morbi principio illam non damnant, ſed eam approbaſſe cenſendi ſunt, quæ eſt noſtra diſputatio.

Pag. 98.

Anthrop

lib. 3. c. 8.

Enimuerò ſui memor non eſt Gardinuſſi orat. 4. dum inducit Riolanum ſcribentẽ, Quare iudicio Hippocratis & Galeni conſilio, ſemper eſt directo lateris affecti celebranda eſt venæ ſectio per baſilicam ut inſigni hiſtoria docemur in enarrationibus eruditiffimi Dureti. Ergo & Duretus,

Anat. lib.

4. quaſt.

quod & alias diximus, perpetuò directam ſecat; ſicut & Laurentius qui ſic conclu-

dit:

dit. *In pleuritide secemus perpetuò venam internam eiusdem lateris, quæ docta est, inquit idem sentiens Valeriola, Hippocratis & Galeni doctrina. & Ioubertus similiter scribit, Reuulsiones (nota bene) ab eodem latere perpetuò instituendas esse concludimus.*

Loc. com.
lib 3. cap.
16.

Iamne (quod ait Gardinus) Valeriola, Ioubertus, Laurentius, Hollerius, Riolanus, Duretus & cæteri præstantissimi viri dum in pleuritide directam secant, de pleuritide duntaxat id decernunt, quæ plurimum est in facto esse? Iudicet lector, quis hic larnatas Charitus populo, quod ait, imponit.

Pag. 97.
orat. 4.

Anti. pag.
96-97-83.

At prodeant contra quos directè egi: Adest Fuccius qui lib. 2. paradox. cap. 4. intrepidè asserit: *In internorum viscerum inflammationibus, rectius, tutiusque è directo, quam ab opposito latere vena secanda est, etiam reuellendi causa, & tempus connotat postea sic, Dilucidum fit errare eos qui in principio inflammationum, (notate principium Academici) venam quæ è directo est incidendam negant: & paulo post, Vena quæ è directo est inter initia etiam incidenda.*

Quid Fernelius qui terminis à Gardino assumptis, plurimum in facto esse, aut in fieri

fieri & similibus nunquam vsus est: Is lib. 2. th. cap. 7. sic docet. *Pleuritidi, tam interiori quam exteriori (id est omni) interior in eodem latere secta vena reuellendo deriuandoque prodest; in statu autem cum non reuelamus, sed vacuemus, & de pleuritidis principio hic etiam decerni clarum est. Idem cap. 5. spreta saphena & opposita sic concludit. Male igitur Arabum dogmate censetur, precisam in pleuritide eiusdem lateris venam, fluxionis impetum augere (notat principium & fluxionis tempus, quo tempore etiam Arabes oppositam secabant) copiam primò ex inferiore pedis vena subtrahendam & ab aduersi cubiti interiore reuellendum, postremò reliquias ex eodem latere deriuandas. Qua è directo secatur vena vacuat, reuellit, & deriuat, ergo ampla vena finitimo loco est secanda. Quid clarius quam Fernellium perpetud & quouis morbi tempore voluisse directam secari? & merito quippe eodem capite vt id cõsequatur, pro fundamento criticas euacuationes posuit operosè disputans, nullam esse vnus lateris ad oppositum rectitudinem & communionem, vnde lib. 1. th. cap. 9. Partes, inquit, intra renes & clauas sitas, reuellit secta è regione cubiti vena,*

na, ex alijs venis qua è directò non sunt, unam copiam minuit, neque oppressa parti leuamento est.

Quibus manifestum fit, me reuera contra Fernelij & Fuccij & sequacium doctrinam rectè enuntiasse, titulos titulis, quæstiones quæstionibus, conclusiones conclusionibus, paradoxæ sententiæ, & nouæ, endoxas & ab antiquis probatas opposuisse.

Ego sanè contraria omnia enuntio Fernelio, quando de reuulsione ago, quando assero in omni pleuritide in principio, quando fluxio adhuc fit, oppositam turò secari posse, non modo cum plethora, sed etiam citra plethoram, nunquid hæc sunt contraria de eodem secundum idem? quod dum nimis præcipitanter negat Gardinus, ecce magistellus quidam Anticharis academici trophæum destruit, neque Plauti machæra opus est, sufficit *urceolus* *è sig* *Anti. pag*
cui inscriptum Polyphemos excæco. 93a

Q V E R E L A I I .

Pag. 96.
orat. 4.

Cedo locum, inquit Gardinus, ubi Hippocrates, aut Galenus dixerit in pleuritide oppositam esse secandam? Scis Galenum nunquam sic scripisse, fateris tu in quibusdam casibus, tundendas esse saphenas.

In phar.
rest.

R Espondeo primò, Nunc plurima à neotericis doctissimis & exper-
tissimis fieri, quæ Galenus non
est assequutus, quia ars quotidie excoli-
tur, nos pumiliones, quod ait Quercetanus,
gigantum humeris insidentes, quacunque
illi viderunt, videmus & longius.

Secundò, Galenum fortè oppositam
sectionem rardè admodum practicasse, li-
cet præceptis vniuersalibus nos eam do-
cuerit, nempe quia defuit illi talis sectio-
nis occasio: Cum enim Romæ iunior me-
dicinâ exerceret, Erasistrateri magna glo-
ria iam à multis annis eam exercebant,
ijque Chryssippi doctrinâ imbuti, venæ
sectionem omninò damnabant, inedia
corpus vacuantes, vndè non mirum si
Galenus sæpissimè & fortè semper voca-
retur, cum pleuritis erat in statu: Et sanè
maximè illi laborandum fuit, vt venæ se-
ctionem commodum ægris auxilium per-
suaderet;

suaderet; quippe Erasistratei inueterata
 hæreli contumaces, ne aliquando non sa-
 puisse viderentur, famæ suæ & alutæ po-
 tius quam ægrorum salutis consulentes,
 omni conatu, & quibus poterant technis
 Galeno aduersabantur, venæ sectionem
 vt crudele remedium damnabant, con-
 gressus cum Galeno (quod & fastuosi etiā
 nunc quidam medici) fugiebant & con-
 sultationes detrectabant, eratque Roma-
 nis opinio Erasistratorum gratissima,
 quoniam error ille iam popularis factus,
 altius illorum mentibus infederat; Nam
 & Chyrurgos Græcos vrbe pulsos à maio-
 ribus acceperant, vt nimium crudeles,
 propter sectiones & vstiones, ita vt sibi
 persuaderent Græcos vindictæ appeten-
 tissimos, Romanos per odium in patriæ
 oppressæ vindictâ laniasse & interfecisse.

His similibusque de causis ægri Roma-
 ni non nisi serè venæ sectionem admitte-
 bant, sicut ipsemet refert Galenus; *Verum,* Cap. 2. de
inquit, quoniam quintum sepè, aut septimum C. R. per
ab initio expectabant, priusquam nos ad cu- V. scit.
randum accerferent, expediebat nihilominus
venam secare; malebant itaque Romani in
 sanguine suffocari, quam profuso sangui-
 ne, quod sibi ab Erasistrateis longo vsu &

malis artibus, persuasum erat, iugulari: Tales erant illi Erasistratei medici, reipublicæ pestes crudelissimæ, sicut conqueritur ipse Galenus ad Posthumum,

*Querela
Galenus
ad Post-
humum.*

*huc & illuc cursitantes per urbem, varia di-
uulgabant, me periculoso admodum curatio-
nis genere uti, ergo ut apud nos latrones
sibi parcunt, & in facienda iniuria, mutuo
conueniunt, ita medici Romæ tunc habitan-
tes faciebant, eoque solo à latronibus differe-
bant, quod hi in urbibus, non in montibus in-
sidiabantur, quibus consideratis.*

Dico 2. quod si in principio, aut aug-
mento fuisset vocatus Galenus, sapien-
tissimè oppositam secuisset, vniuersalibus
à se vulgatis præceptis consentaneè.

Dico 3. Quod nec Hippocrates, nec
Galenus vllibi scribant in pleuritide se-
candas esse saphenas: Scripsi equidem the-
orematis vniuersalibus conformiter, in
pleuritidis principio reuulsionis causa, sa-
phenas secari quandoque posse, si fluxio-
nis origo sit à mensibus, aut hæmorrhoidi-
bus suppressis, quia tunc fluxionis fontem
euacuare contendimus per Canon. 7. Ar-
ticuli 2. quod etiam facit Galenus in hæ-
morrhagia, aut hemoptisi, in eodem casu.

Non tamen semper in mensium suppres-
sione

sione natam pleuritidem saphenæ sectione curamus: porro atroci dolore urgente, maxime si corpus sit plenum (quod est directè contra Gardini decretum) spreta saphena ad oppositam superiorem recurrendum est. Sic docet Heurnius inquiens. *In pract.*

Cum ab interceptis mensibus nata est pleuritis, si saphenam aperueris, nec dolorem le- *cap. de pleur.*

uabis, nec menses euocabis, sed grauiorem infarctum facies, quare atroci in dolore ilicò brachium feries, mox pedem: brachium quidem non directum, ne fieret fluxio ad partem affectam, sed oppositum ut plethorâ tutò vacuetur, qua vacuata vel saphenâ tutò postea ad menses euocandos secetur.

Similiter docet Sennertus mensibus nondum fluentibus cum mox etiam fluxuri *Inst lib. 5. p. 1. cap. 17.* sunt, spreta saphena in principio ad oppositam se confert, quia, inquit, danda est opera, ut id quod opus est ocyus exequamur, antequam menses fluere occipiant, ne post fluentibus mēsis necessarium auxilium differre opus sit, aut minus commodè adhibere possimus. Ex quibus constat, quam vana sit & inutilis hæc querela.

Q V E R E L A I I I.

Anticharis pag. 84. quæritat Gardinus: *Estne propudiosum dicere Auicennam & omnes Arabes quandoque, in pede in pleuritidis principio venam secuisse?*

*Fuc. inst.
lib. 7. c. 7.*

R Espondeo 1. Fernelium Fuccium & directam secantes sic de saphe-
næ lectione cum schola Parisiensi
statuisse. *Hæc est imperitorum quorundam
hominum doctrina, impura, barbara, præpo-
stera, scabra, fucum lectori faciens, malè
fida, vacillans, garrula, intricata, sibi non
constans. Malè igitur Arabum dogmate cen-
setur, quum ingens est plenitudo ne fluxio
geminetur, copiam primum ex inferiore pe-
dis vena substrahendam.*

*Fer. The-
rap lib. 2.
cap. 5.*

*Antich.
pag. 97.
98. 85.*

Dico 2. propudiosum est, imponere
Fernelio & alijs, quod dum directam se-
cuerunt, intellexerint solūmodo de pleu-
ritide quæ est in statu, & quæ plurimū
est in facto esse, quod vt confirmet,

*Antich.
pag. 86.*

Propudiosius docet, quod tanti viri
per principium, intelligunt ad hominem, pri-
mas quibus aduocantur vices, etiamsi pleu-
ritis, iam penè sit secundum naturam suam
in suo statu: Quasi tanti illi viri iudicio
sic caruissent, vt ad ægrum cum venis-
sent,

sent, non quæsiissent, à quo tempore æger pleuriticus esset: Ex qua Gardini hypothefi fequitur talis ratiocinatio: Præftantes illi viri in ftatu ad pleuriticum primum vocati, eum diem lux vocationis, primum diem & morbi principium ftatuebant, ergo quia tunc fecabant è directo, fe in morbi principio fecare affirmabant: Infert Gardinus, ergo & in morbi principio & augmento & ftatu ex abufu populi rectè directam perpetuò fecandam concluderunt.

Iudicet lector, quam absurda fit ea doctrina, quæ ex absurdiffima hypothefi emanat, eam enim expreffis verbis fic tradit pag. 86. *Tanti illi viri regulam illam Antich. generalem fectionis directæ fic dedere perpetuam, quod voluerunt fe conformare abufui vulgaris populi, qui femper medicum aduocat cum omnis fluxio facta efl.*

Quod iterum propudiosè repetit orat. 3. pag. 58. *Quoniam, inquit, vix aduocatur medicus nifi collectione facta & fluxione penè ceffante, directam fectionem folam fibi præfigere doctiffimi quique. & orat. 2. p. 44. quam absoluto fermone cum Fernelio in pleuritide rectè fecandam effe pronuntiant fapientiffimi ac eruditiffimi quique medici, refpectum*

pectum habentes solum ad id, quod in praxi quotidiana quotidie occurrit plurimum esse faciendum, ob incuriam & abusum vulgi medicum vix aduocantis nisi tum demum quando dolor ingens in latere iam insigniter urget, & ad se totum curantis consilium aduocat. Nempe medicus doctissimus ad pleuriticum accitus, ea hæresi imbutus, nullo præmisso examine, ilico directam feriet. Huic sanè hæresi obaudiant, Clinici, Balneatores, Tósores, Myropolæ, Agyræ, Mulherculæ, quæis tutissimum inscitæ paratur asylum, errare sanè non poterunt, ad pleuriticum vocati, continuò directam si secuerint, sic enim sapientissimi quique sibi præfigunt, auriculas scilicet Midæ.

Quid ad hæc, vos igitur insulsi mi & imprudentissimi omnes articulo secundo pro opposita sectione citati eritis? non vultis vos populi abusu seruire? Non sic Gardine populi abusu vtendum est, medicum ægri abusus fouere non decet, ipse falsum hoc esse asseris? principijs, inquis, obstant sapientiores sua valetudinis curiosiores. Si Stultorum infinitus est numerus nil miror. & ibidem inclamat, quantum libuerit suo ineptiant malo, sapientioribus præcepta damus. Vanz ergo & erro-

neꝝ abusuꝝ populi & falsitati superstructæ
conclusiones, ridendæ quidem, ni sint
damnosæ.

At si compendiosa adeo doctrina vera *Orat. 2.*
est & bona, cur toto opere, tot pleuriti- *pag. 45.*
dis tempora effingit? futuræ imminentis,
absolutæ imminentis, quæ vix est in fieri,
& duntaxat in fieri pleuritidis in fieri, cum
plethora & sine plethora, pleuritidis mul-
tum in fieri parum in facto esse, parum in
fieri, multum in facto esse, plurimum in
facto esse, ita vt vix quidquam sit amplius
in fieri, omninò in facto esse; Ad quid, in-
quam, ista, quæ sapientissimi quique cum
Galeno, quatuor temporibus definierunt?
principio, augmento, statu, & declina-
tione, nunquid ista videbuntur otiosa &
intricata?

Dico 3. Propudiosum est negare hos
omnes, quos citat, Arabes & eorum inter-
pretes, cum omnibus sequacibus citatis
Articulo 2. ante directæ sectionem oppo-
sitam secuisse.

Dico 4. Propudiosum est Mesue impo- *Antich.*
nere. Qui ait *vbi maxima est plenitudo* (et si *pag. 34.*
contrà sentiant moderni professores) iu-
bemus phlebotomari ex saphena partis opposi-
tæ, est enim eius iuuamentum sublime & fe-
stinum.

stinum. Hic subsistit Gardinus dum & sequentia continuò addere debuit, & *proprie facit ad ascensum materiae ad caput*, id est, Gardine, quod omnes intelligunt, quando materia antecedens latet in partibus inferis, & ab his repit ad caput, aut partes superiores ob hæmorrhoides, aut menses suppressos, vnde antè dixerat *ad pluralitatem repletionis*: id est quando materia antecedens vno & eodem tempore stagnat in diuersis locis & maximè inferis.

Iudicet iam lector si temerè deblatero, quem remitto ad articuli 2. stationem 2. vbi quid Melue de venæ sectione in pleuritide præcipiat candidè scripsimus.

Q V E R E L A IV.

Orat. prima, pag. 17. quærit. Gard.
Satisne caute docui quod opposita sectio in pleuritidis principio, nunquam prodesse possit ut cruris?

R Espondeo quod non, quia sectio oppositæ basilicæ plus prodesse potest & magis vniuersaliter, saphe-
 narum verò, rarè & in paucis casibus.

Neque verò illud *ut cruris* potest excusare Gardinum, qui oppositam sectionem

nem incautè omninò damnare voluit, quod & adhuc conatur facere schola Duacena publicatis adversum parænesim meam pluribus conclusionibus, quibus partim iam respondi, alijs in hac excursionem responsurus: Porro qui quocumque tempore & casu sine vlla distinctione sapphenarum sectiones, oppositæ basilicæ sectioni anteponit & qui sic dicit orat. 3. *frustra secatur in pleuritide lateris oppositi basilica, sufficit eiusdem lateris basilicam secare*: Is profectò ut frustraneam condénat.

Enimuerò *nunquam* illud temporale absolutum, quod non satis restringitur per *ly* ut comparatiuum, erat expungendum, vel explicandum, quod postea fecit apologiæ meæ rationibus euietus, sic propositionem suam inuertens: *Vena basilica oppositi lateris prodesse potest*, quod admitto: *sed cruris tunc secta magis*, quod pernego; nec satisfacit, cum enim ad rectè medendum id semper agendum sit, quod tutius & melius est docente Galeno, ideo si sapphena id præstat, secanda est perpetua non opposita, & licet inficiatur se non absolutè condemnaſſe, pag. tamen 45. orat. 2. omninò eam damnauit hoc elogio concludens, *Oppositi lateris sectionem in pleuritidis*

Orat. 2.
pag. 12.

De ras.
viâ in
acutis

222 Q U E R E L A I V.

tidis principio, nil omnino prodesse, sed frequenter obesse, atque sapissimè adeo nocuisse, ut ÿs qui alioquin euasissent presentissimam mortem attulerit.

Sed admitto confessionem pag. 13. orat. 1. quæ sic habet. *Non nego in pleuritidis principio basilicâ prodesse posse: Et falsum est Gardinum unquam absolutè asseruisse, nec quisquam boni iudici id absolutè asseruit.*

Orat. 1. pag. 17. Recipio Præsidis iudicium & sententiam, qua Gardinum purgat, quod est: palinodiam suauissimè recantare & parænesis meæ doctrinam endoxam confirmare, quæ docet in pleuritidis principio oppositæ basilicæ sectionem vtilem esse.

Q U E R E L A V.

Orat. prima pag. 22. Querit Gardinus. *Diffidone ego venarum communioni?*

HÆc querela oritur ex eo, quod affirmo vtramque subclauiam magis communicare inter se, quam iliacas inter se, quas κατὰ τὴν communicare Fernelius, Fuccius & directam secantes affirmant sicut probatum est Articulo 7. Cùm igitur, teste Galeno, illa magis inter

se κατ'ἑν communicent, quæ minus à se inuicem distant, hinc fit quod vtrique basilica magis inter se communicent, quam iliace inter se, & quod opposita basilica azygotæ anastomosi vicinior sit multo quàm saphena directæ, quæ ab azygotæ orificio plurimùm distat: que ideo magis cum azygota cōmunicet quam saphena, vt videre est ex figura prima opposita in fine articuli 5. in qua locus sectionis saphenarum not. i. i. multo longiùs distat ab ostio azygotæ not. b. quam locus sectionis basilicarum not. g. g.

Itaque respondeo, reuera illum diffidere communioni venarum originali quàm per ὁμοζυγίαν interpretatus est Galenus. Est Galeni terminum declinans Gardinus, eas anastomoses exortus vocat quasi aliud diceret, & concludit quod directæ *Propos. 9. decreet. in apol.* sectio non reuellat à pleura respectu anastomosis azygotæ, sed respectu venarum mamillarium, musculæ, & thoracicæ eiusdem lateris per anastomoses terminales, quas originalibus præfert, Et tanè his diffidit, qui illis nimium fidit, quarum cōmunionem nullius esse momenti, aut vtilitatis ostendimus articulo 5.

Ratum ergo sit, quod vtrique subclauia,

uia, & ex ijs prognati stolones magis inter se communicant per originales anastomoses, quam iliace inter se per suas, quia etsi hæ ut subclauia sint eiusdem lacunæ fauces, tamen iliacarum ostia, non ita è directo se respiciunt, sicuti subclauiarum, vnde meritò illas directè inter se communicare asseruimus: Ex qua reatitudine fit: quod inanitione coniugis oppositæ facilius sequatur & attrahatur sanguis, qui in opposita est subclauia, quam qui est in opposita iliaca eiusdem coniugis inanitione, nempe qui in opposita est iliaca, si à coniuge retrahitur, sursum trahi debet sic docente Fernelio, quod difficilius fit si ipsi credimus, at qui ex opposita subclauia in coniugem attrahitur, vel descendit, quod facile fit, vel duntaxat in transversum abire eodem docente Fernelio.

Oras. 1a

pag. 23.

& propos.

9. decret.

in apol.

Quod nititur negare Gardinus, quia, inquit, *magnum chaos intercedit inter utraque subclauiam*, quod falsum esse oculis demonstratur in figura 1. utraque subclauia not. e. e. proximè & è directo se respiciunt, & in lacunæ portu not. c. vniuntur, ex qua subclauiarum cōmunionē, sequitur & oppositarum intercostalium, mammillariorum & thoracicarum ab ijs prognatarum,

natarum, maiorem esse communionem, quam sit saphenarum cum illis, inter quas & saphenas magnum reuera chaos interiacet, vt videre est in eadem figura: si interuallum respicias ab *i. i.* saphenas, ad *e. e.* subclauias *d. d.* mamillares *f. f.* thoracicas *b. b.* intercostales. Cum igitur videret se fallum asserere & sensibus imponere, *Concesso*, inquit, quod subclauia Orat. 18 magis inter se communicent, quam iliaca in- pag. 24. ter se, sequiturne quod vene, quæ sunt in thoracis latere dextro habito respectu ad azygotam, maiorem habeant & magis directam communionem cum basilica sinistra, quam cum iliaca dextra?

Respondeo quod sic, quia sunt magis vicinæ anastomosibus originalibus per quas fit ad pleuram fluxio, quæ vicinitas facit ad communionem maiorem sicut probatum est articulo 7. & ad reuulsionem, per Canon. 7. & ideo directam secantes, concludunt, semper directam potenter ab azygotæ anastomosi vacuare, saphenam nil posse, vt suprâ probatum est querela 3. & articulo 7. quod vt est, & oppositam eadem præstare necesse est, quæ ab anastomosi originali azygotæ æquidistat, inter quam & saphenam magnum

P

reuera

reuera chaos intercedit.

Insuper, ex suprà posita doctrina & demonstratione ex figura prima, basilica opposita communionem habet per oppositam subclauiam cum stolonibus ab illa prognatis qui per latus propagantur oppositum, eamque proximam, saphena non nisi mediante lacuna, & quidem remotissimam sicut eadem demonstratione ostensum est, vnde rectè concludit à Vega; *Quis*

Art. med. adeo imperitus est, ut putet crure laborante
lib. 1. sect. scissa venabrachij, fibras ipsas ex crure tra-
3. cap. 1. hère sanguinem? & vice versa.

His ergo originalibus anastomosibus diffidens Gardinus, nam ipsius doctrinae *vene quae sunt in vno latere thoracis, vix*
Orat. 1. ullam habent communionem cum venis quae
pag. 23. sunt in latere thoracis alterius lateris, ad ter-
minales confugit, quas nullius esse mo-
menti in sanguinis missione demonstra-
uimus, per quas tamen vult sanguinem ad
Orat. 1. latere pleuritico, commodius, celerius, com-
pag. 22. pendiosius, facilius, directiusque atque salu-
brius, abduci, reuelli, atque educi, quæ sic
profitetur & asseuerat; ut pro certa fide
medica ac scientia demonstrata habenda sint

Q V E R E L A V I.

Orat. 1. pag. 25. Quærit Gardinus.

Quod ad nostram controuersiam attinet, esse Pag. 23.
maiores communionem venarum quæ ad erat. 4.
brachia hinc inde ducunt. quam sit iliaca-
rum inter se, quæ ad crura hinc & hinc?

R Espondeo primò; Si nihil interest,
cur tantopere conatur id reproba-
bare? cur contra disputans orat. 1.
pag. 22. declamat. *Dixi hac, sed iterum
iterumque (quia ad rem maximè faciunt, fal-
sitateque homines alioquin interempturam
auerrunt, veritatem autem incolumitati
propiciam salubriter stabiliunt) lubet repe-
re, innasque.*

Ergo multum interest, cum in eo &
veritas, & hominum vita periclitetur, &
interest mihi has propositiones stabilire.
Quia si propter communionem origina-
lem, quod omnes & ipse iam fateri co-
actus est, opposita saphena ab opposito pe-
de reuellere potis est, & ab omnibus sto-
lonibus venarum quæ in opposita sunt ti-
bia, pede, & crure, citra vllas terminales
anastomoses, sed duntaxat per originales,
Cur opposita basilica, quæ ex supposito
magis communicat cum dextra, non re-

uellet ab omnibus venis quæ cum dextra communicant, & ab omnibus quæ à dextra subclauia ortum habent, id etiam attestante experientia, dum ratione inflammata manus, cubiti, aut humeri, opposita basilica secatur non saphena?

*In an-
lys prop.
8. & An-
tich. pag.
92.*

Sed & hic Gardinus se iugulat, dum ad reuulsionem, siue auersionem specificam, oppositam cephalicā secari iubet in pleuride à refluxu à capite, par enim est ratio cephalicæ ad cephalicam & basilicæ ad basilicā, vt videre est in figura secūda, quod si illa ab oppositis stolonibus rectè reuellit & hæc idem à sibi oppositis præstet æquū est: Non ergo quod obijcit ibi Gardinus, de altera manu, aut altero humero curando agimus, nisi per accidens, sed de affecto latere ex professo.

*Orat. 1.
pag. 25.*

Sed esto, inquit Gard. per sectionem basilica sinistra euacuaneris quidquid est sanguinis in omnibus brachij dextri venis, & reuelleris quidquid eo fluxurū fuerat, idem nec euacuaueris vel reuelleris quidquam per dolum azygota ex venis quæ sunt in thoracis latere dextro? en, inquit, argumentum quod stringit & arctat: At quod sic stringit argumentum, sic facile dissoluo, &

Dico primò, me hypothesim accepta-
re,

re, quæ amplius negari non poterat, sic enim rem se habere probatum est articulo 5. demonstratione anatomica, ex qua assertione sequitur opposita sectione per prætensas terminales anastomoses à parte affecta, proclamata à Gardino vacuatio si plenius vacuamus, quod nullo modo nec intendimus, nec curamus, cum sufficiat arte reuelli, sanguinis fluxuri & fluentis ad affectam partem per dictos stolones, si illic fortè fluat, in lacunæ breuio intercepti reuulsio per Canon 8. & 9.

Dico: quod etiam ab ostio azygotæ & per eius ductum reuello, per quam (quod post Fernelium fatetur etiam Gardinus) *Orat. 1. pag. 24.* ut plurimum fit pleuritis, quia vtraque basilica ab anastomosi originali azygotæ æquidistans ab ea æqualiter reuellit, & quidem opposita citra fluxionis metum. Insuper addo, si Fernelio & sequacibus credimus & Gardino id nobis obijcienti, *Orat. 4. pag. 76.* quod & per azygotam ex lateris affecti propaginibus euacuo non impactum & extravasatum, quod ipsi volunt, sed fluxilem ut querelæ in omnibus satisfaciam, quod amplius probavi in responsione ad propriam obiectionem articulo septimo.

QVERELA VII.

Orat. 1. pag. 25. Increpat Gardinus.

*Dic inquam mihi, estne pleuritis in alterutro thoracis latere, an in alterutro brachio? Ego, quando secō à principio aliquam infir-
riorem, sanguinem à thoracis latere au-
tere, reuellere & euacuare satago, non à
crure altero, quia non afficio quam crura
cum crure habeat communionem, sed quam
habeat cum venis quæ in thoracis latere sunt.*

Dico primò, quod dictio πλειρῖς, à πλεῦρα membrana thoracis ob-
linente latera, partem affectam sa-
tis indicat. Interim,

Notandum quod hic Doctor Hippocra-
tis & Galeni doctrinam confundens; vno
& eodem tempore, vna eademque sectio-
ne, ne aberret (cum tamen maximè erret))
auertit, reuellit, deriuat & vacuat. Et re-
uerà sic docenti, talia dona concedi pos-
sunt, qui modo sanguini motum impri-
mere nouit, vt illum pellat quo vult, mo-
do eundem docet, vt quo lubet sequatur;
& obediat quatenus vult & hætenus.

*Propos. 5.
decret in
apol &
Annal.
prop 3.
in erat.
quod.*

Dico 2 quod Doctor hic gloriatur se
non considerare, quod maximè debuit,
nempe quam crura cum crure habeat com-
munio.

munionem, quia hac consideratione directam secantes, saphenarum sectiones damnarunt, quod putent has partes inferiores & circumuicinas ratione communionis κατ'ἑξῆς, saphenæ sectione primum omnes vacuari, antequam quidquam è superis partibus talis sectio euacuet, quod demonstratum à nobis est articulo 7. in responsione 2. ad primum argumentum pro saphenis, & ideo ista ego consideratione motus & alia perpendens cōsideratè consideravi quā habeant crura inter se, sicut & brachia inter se communionem.

Dico tertidò morbi tempora distinguendo, me in morbi principio non duntaxat à thoracis latere affecto intendere, reuellere, aut vacuare, sed potius à tota parte opposita sanguinem euacuando, simul fluentem ad partem affectam sanguinem in via intercipere, & ad oppositam potentem & valétem attrahere: Atque ideo non solum aspicio quam habeant brachia inter se, & cum parte affecta communionem, sed etiam quam totæ partes vnius lateris totius corporis, cum totis oppositis habeant societatem, eo quod potentes, ad oppositam sibi debilem totam sanguinis

nis æstuantis molem continuè depellant, sicut probatum est articulo 6. qua de causa opposita valens, ut pars mittens consideranda est, sicut & fluxionis origo & via qua fluxus fieri potest, per Canon. 6. quo canone docemur, quam proximè fieri potest, ad fluxionis fontem sectionem instituere, longissimè tamen ut prodesse possit à parte affecta reuellièdo in cōtrarium per eam, & ad eam quæ sana est, quoniam in morboſa, sectionem fieri vetat cum experientia Galenus, ipsoque docente redundantia pleuritica fontem lacunæ partem esse superiorem & proximè ab ea enatos stolones didicimus.

Nat. fa-
cult. 2.
cap. 1.

Antich. p.
59. orat.
3.

Loc. med.
ſel. cap. de
pleur.

Hinc medicina illa columina & primates, quos inuocat Gardinus, in principio saphenæ sectionem, quam opposita præfert, absolute damnarunt, nisi (quod rarè accidit) aut menses, aut hæmorrhoides stagnarint, quem fluxionis fontem tantum fecit lul. Guastauinius, ut Gardini opinionem, & simul directè perpetuè secantium condemnans sic concluderit. *Si menses, aut hæmorrhoides suppressæ fuerint, quia à fonte ipso reuulſio molienda est, saphena tundenda est. Sin minus, siue ad laeuum, siue ad dextrum latus inclinet sanguis, oppositam partem*

partem secabimus contrarium motum opposcentes: & postea cumulatīs rationibus, de omni pleuritide sic decernit.

Siue ad laeum moueatur, & vel per venā à caua proximè enatam (idest intercostalē) nutrientem tres, aut quatuor costas superiores ibidem inflammationem facturās, vel per axillarem & eius ramum (mamillarem & thoracicam) vel per ramos qui ab azygota octo inferiores costas nutriunt; Si inquam ad laeum, vel hac, vel illac moueatur sanguis, basilicam dextram aperiemus, longissimè ad contraria fluxionis initia retrahentes: Itidem si ad dextram partem per venam nutrientem tres costas superiores eiusdem lateris, vel per eam quæ est sine pari nutrientem reliquas octo, aut nouem, reuulsionis gratia sinistra aperienda est, eadem ratione, maiori-que utilitate quod utrobique ad excipiendam faciliè fluxionem aditus pateat.

Qua sententiæ Guastauinij explicatio-
ne in omni pleuritidis differentia, à fluxionis fonte & via desumpta, oppositæ sectionis utilitas clarè, dilucidè, diuissimè, & ordinatè probatur, & malè Gardinum vniuersaliter enuntiasse Saphenam directam tutius, melius, & utilius secari. Quin & huius querelæ solutione. Clariss. D. Remigij

magis condemnantur contra me decretæ
conclusiones: quarum,

Prima 30. Aprilis 1632. Francisco de
Viene defendente sic se habet.

*Illis pleuriticis, quibus medicus secat ve-
nam non è directo, sed ex aduerso, optan-
dum foret, quod eorum natura tam robusta
esset, ut cum possit superare morbum, possit
etiam mali medici corrigere erratum. Cui
antithesim hanc oppono;*

*Illis discipulis, quos docet Schola Dua-
cena, pleuriticis venam semper è directo,
nunquam ex aduerso secandam, optan-
dum esset, quod illorum mens adeo sagax
esset, ut cum possent superare docentis
iudicium, & simul possent mali præcepti
corrigere erratum.*

Secunda 30. Iulij vulgata est, Duacii
eodem defendente Francisco de Viene
Paulensi suprascripto Anno quæ sic habet.

*Parum ad rem facit quod cubitus dexter,
pleuritidi dextra sit, aut non sit contrarius.*

Tertia 14. Sept. eodem Anno defen-
dente Guilielmo Durando Burburgano:
quæ sic habet.

*Malè, ut voluit quidam, in pleuritidis cu-
ratione secatur vena in latere opposito, seu ad-
uerso.*

Quarta

Quarta Anno 1633. Aprilis ... defendente Ioachymo Odofalchenberg: quæ sic habet.

Reuulsio vena sectione transigenda, è directo euidens subsidium & celeriter adfers, è transuerso nullum.

Hinc periculosa est etiam illa eiusdem Clarissimi D. Remigij conclusio, *Inflamationes, quæ vel axillas, vel humeros malè habent (nisi ad brachij flexum pertingant) eodem in latere secta vena reuellendo, derivandoque prodest, quum autem eo peruenietur (quoniam parum phlegmone obsessam prorsus tutum non est) manus è directo aperienda est vena, quæ est parum constans* Fernelij doctrina, Sicut notauimus in responsione ad quæsitum Iouberti Articulo 7. pag. 189.

Quas conclusiones & alias licet amarulentius vulgatas importunis credo collegæ clamoribus, satis habeo sic refutasse, & Clarissimus Remigius æqui bonique contuler, si Professoris quondam primarij & magistri mei Mauronti le Conte decreto, doctrinam eius sic condemno: qui sic decernebat Anno 1612. Iulij 18. defendente collega meo Ioanne Iorch nobili Anglo Eboracensi pro vltima ad bach-

Thesi excusa Duaci Anno 1634. die 22. Septembris defendente Mart. le Sage Cameracensi.

chalaureatum responsione,

In pleuritide, vena potest ex utroque latere secari.

QVERELA VIII.

Querit Gardinus orat. quod. 3. pag. 55.

Quod si renuat ager saphenam secari, utram basilicam eligeres, scilicet in pleuritide qua est aliquatenus in fieri, & aliquatenus in facto esse, & corpus est plethoricum?

Pag. 55.

Respondet ipse sub conditione meditans effugium, qui culpam fateri erubescit. Si, inquit, azygota

Pag. 57.

anastomosim spectes nil refert utram seces, si autem spectes intercostalem, mamillarem, & thoracicam, secunda sit naufragy tabula, at non sine periculo, etsi cum aliquo tractionis periculo sursum; Seca in nomine Domini basilicam lateris oppositi, ut interim dum ex eius vulnere effluit sanguis, auertatur ne fluat ad istas supradictas affecti lateris venas, ea cautione, ut per hanc sectionem dempta plethora, paulo post seces eiusdem lateris basilicam, ad derivandum & euacuandum, illum nimirum qui prater plethoram particularem nimius est in loco pleuritico, quique in azygota, intercostali, mamillari, thoracica, causa

Q U E R E L A V I I I. 237

causa est coniuncta & continens pleuritis actus ferocientis.

Dico 1, bene esse si opposita sectione (quod negavit propos. 9. decreti) auertimus sâguinem à stolonibus lateris affecti, & sufficere reuulsioni in principio, & quidem tutò id fit, refertque & interest sic fieri, etsi contra sentiat Gardinus, etiam respectu azygotæ, considerato partis mittentis & fluxionis fonte per Canon. 6. & *Querela* 7. sic etiam asserente Iulio Guastavinio de 7. omni pleuritidis differentia, ne ad partem affectâ fluxio proritetur, sed lōgè ab ea retrahatur, quod & in querela 6 probatū est.

Hic accedit quod mamillarium dubius est ortus, nam sâpè solitaria deprehenditur à medio cauz oriri, vnde parem habet cum azygota considerationem respectu vtriusque basilicæ: Intercostalis duas, aut tres ad summum costas superiores alit exilibus ramusculis, & illam Vesalius in pluribus corporibus non reperiri asserit, sed sâpè tres illas costas ab azygota enutrirî, per thoracicam nota fit pleuritis.

Cum itaque difficile admodum sit, imò impossibile conicere, qualiter in pleuritico, quem curas, venarum exortus & progenies sint dispositæ, & vehementem pleu-

*Lib. de
part. mor.
cap. 11.*

pleuritidem quæ ab hypochondrijs ad iugulum dolorem extendit, per azygotam fieri cum Galeno & Fernelio, fatente etiã Gardino omnes affirmet, tutissimum semper erit in pleuritidis principio sic agere, qualiter ageretur, si per azygotam fluxionem fieri certum esset, quippè iam confectum est, opposita n sectionem ab ea tuto reuellere sicuti & à partis affectæ stolonibus, nec duntaxat plethoram euacuare, sed etiam influentem ab affecta parte sanguinem reuocare.

*3. de mor.
cap. 10.*

Interim notandum Gardinum hic confuse loqui de loco materiæ morbificæ: Porro locus pleuriticus teste Galeno & Fernelio, est vbi coniuncta operatur & agit materia actionem lædens cum doloris sensu, quod agit vel in pleura ipsa, vel intra ipsam & costas, vel in mesipleurijs vbi azygotæ terminantur apices. Cum autem ab azygotæ anastomosi ad eius fines longa sit via, per eam necesse est fluat sanguis priusquam ad fines, & pleuriticum locum perueniat. Probabitur autem querela 1. quod sanguis venis intermedijs contentus in fluxu sit causa antecedens, & tunc demum coniunctam fieri, esseque proximam cum ad locum pleuriticum perveniat.

uene-

uenerit, ad extremos scilicet apices & venulas capillares, vel dum ex ijs in vacuis locis effusus est; Quæ cum ita sint si Galeno credimus, non benè docet causam continentem & coniunctam fluitare in venis illis communibus, azygota, intercostali, mammillari, thoracica, & vt coniunctam vacuandam & deriuandam è directò, is enim sanguis cum fluit nondum in phlegmone collectus est quem pag. 57. *deriuari & euacuari oportere* rectius censet. Nos igitur fluitantem communibus venis sanguinem vt antecedentem pleuritidis materiam reuulsioni ad opposita addiximus, coniunctam & collectam in phlegmone deriuationi & euacuationi per Canon. 7. 8. 11.

Dum hæc scriberem, reddita mihi est epistola eruditissimi D. van Houtte medici Winocibergensis, inter alia quæ sita, quibus anacephalæosi responsum est, scribit: *Constat oppositam reuulsionem rectè institui in principio, at quamdiu reuulsio facienda sit, ex paranesi non constat, sicuti nec de sanguinis vacuandi quantitate: insuper ait oportere me signa edocere, quibus ista medicus assequi possit.*

Enimuerò, etsi ad mei instituti non sit
sed

sed duntaxat probare reuulsionem ad opposita in pleuritidis principio tutò fieri, tamen ut quæsito amplius satisfaciam,

Dico primò, quod vacuandi sanguinis quantitas, licet ab Hippocrate & Galeno, dum deriuant simul & reuellunt, & à parte affecta in statu vacuant, vbi minor videtur dubitatio, statuatur sanguinis mutatio, ita ut puro corruptus succedat aut è contrà, fallax visa est indicatio Aureliano, Aræteo, Archigeni, & neotericis Mercuriali Altomaro & omnibus, quippe sic instituta vacuatione, etiam repetita, obseruatum est sæpe nec dolores leuatos, nec ægrum sanatum, tota enim sanguinis massa ita sæpe corrupta est, ut cum sanguine citius animam ducas, quam purum elicias, & contrà ita purus esse potest sanguis, ut corruptum & liuidum nunquam detrahas, quin prius ægrum iugules, ac præcipuè in morbi principio, quo tempore fallacissimum peteretur signum, tunc enim ut plurimum sanguis nondum corruptus est, conformiter doctrinæ Auicennæ lib. 3. Feu. 10. tract. 4. cap. de pleur.

Quantitas igitur sanguinis vacuanda ad reuulsionem, à solerti medico facile cōiectabitur, si plethoræ magnitudinem cum
phleg-

phlegmonis magnitudine commensurare nouerit, is enim tantum sanguinis opposita sectione detrahet, quantum opus fuerit ad plethoram & causam antecedentem euacuandam, efficietque ne fluxio geminetur, ita vt si malum statim non leuetur, saltem non augeatur, atque sic composito corpore ad directæ sectionem tutò procedet.

Dico igitur 2. tamdiu oppositam reuulsionem utilem fore, quamdiu pars mittens satis sit vacuata per Canon. 6. vel quamdiu materia antecedens erit in fluxu, iuxta doctrinam Hippocratis & Galeni per Canon 7. & 8. quæ fluxio tamdiu censetur fieri, quamdiu dolor augetur, sic docente Heurnio *dolor enim fit ab influxu qui* *Cap. de*
partem distendit, vnde quo plus affluit plus *pleur.*
 distenditur, & quo plus distenditur plus dolet, quod ferè fit in augmenti principio: Sic Rhasis ad Almansorem cap. 7. lib. 9. Mesue, summa 7. cap. de pleur. & Halliabbas pract. lib. 6. cap. 13. & Galenus docent distentionem in pleura causare dolorem; Dierum tamen non potest certus
Cris. lib.
 præfigi numerus, quippe idem Galenus *1. cap. 4.*
 satis ostēdit cuiusque morbi non eandem esse latitudinem, breuiorum breuiora esse

Q

tem-

Galen.

Crisp. 1.

cap. 13.

tēpora: Sic quarundam pleuritidum principia septimum superarunt, sicut in Anaxione, longitudinem autem morbi coniiciunt medici, ex materiæ morbificæ quantitate, cruditate, natura, febris magnitudine, symptomatum celeritate, vehementia & motu, ægri temperie, complexionē, anni & tempestatis constitutione & regionis, ab excretorum concoctione & infinitis alijs quæ aphoristica breuitate passim pronuntiauit Hippocrates, quæ omnia à solerte medico, quod docet Huartes, in instanti comprehenduntur, hæc tamen comprehendendi scientia nulla arte edoceri potest, *Los hombres aya entre ellos,*

In exam.

cap. 12.

particularidades de tal condicion que ni se pueden dezir, ni escriuir, ni enseñar, ni recoger-las, de tal manera que se pueden reducir à arte, sino que conocer-las, à solos aquellos les es dado, que muchas vezes las vieron y trataron.

In exam.

de ing.

cap. 12.

Quippe illa intellectus operationem non sunt, nec vi discursus demonstrantur, sed imaginatiuæ certæ, celerem sunt comprehensiones. Para alcançar, inquit Huartes, este conocimiento, tiene la imaginatiua ciertas propiedades inefables con las quales atina à cosas, que ni se pueden

den dezir, ni entender, ny ay artes para ellas. Y assi veemos entrar vn medico à visuar el enfermo, y por la vista, oydo, olfacto, y tacto, alança lo que parece cosa imposible: de tal manera, que si al mesmo medico le preguntásemos, como pudo atinar à conocimiento tan delicado, no sabria dar la raxon, porque es gracia que nace de vna fecundidad de la ymaginatiua, que por otro nombre se lama (solertia) laqual con senales comunes, inciertas, coniecturales, y de poca firmeza en çerrar, y abrir el ojo, alcãçan mil differencias de cosas, en las quales consiste la fuerça del curar y pronosticar con certidumbre.

Quod & ipse docuit Galenus *Concursus* *Cris. lib. 1. cap. 130*
enim (quos syndromas vocant) symptomatum
infinita cum sint, experientia sola iudicari
possunt, quocirca nemo illa obseruare, neque
memoria tenere potest, hinc lib. de ord. lib.
suo. Mirum non est, inquit, in tãta hominum
multitudine qui in medica exercitatione stu-
dioque versantur, inueniri tam paucos qui
rectè in illa profecerint.

Et si verò Arabes principium pleuritidis diatrito metiti sint, & Heurnius cum alijs affirmet materiam semper influere vsque ad quartum, tamen ex Galeni suprà posita doctrina, contingit etiam sæpe diu-

*Li pract.
cap. de
pleur.*

*Orat. 1.
pag. 29.*

*Inst. lib.
5. pag. 2.
cap. 18.*

tius influere & principium protrahi: Quin
& fluxionis nouæ ratione Heurnius etiam
postquam directam secuisset, ad opposi-
tam recurrit: Si, inquit, corpus circumfluat
à sanguine, isque adhuc influat, etsi eiusdem
lateris secta vena fuerit, eodem die, vel se-
quenti feriemus aduersam venam, quo caput
quod graue est à sanguine, toto venarum ge-
nere distento corpore ad latus aduersum ma-
teriam effundat: quo dogmate docemur op-
positam sectionem ad se sanguinis molem
cōuertere, nec, quod ait Gardinus, frustra-
neam esse oppositam sectionem post directæ se-
ctionem, neque ardelionis opus esse per fas-
nefasque suam opinionem stabilientis, & po-
pulo imponentis, ni Heurnius doctus ille
medicinæ professor sit ardelio, & cum eo
Sennertus inquires: Cum reuulsio oppo-
sita humoribus fluentibus debeat, non ijs
qui iam influxere, incipientibus fluxioni-
bus præcipuè adhibenda est. Est tamen cum
reliquis quoque temporibus reuulsione o-
pus est, si enim fluxio aliqua sit diutur-
nior, contumax & rebellis, etiam in iam in-
ueterata, & post principium, reuulsio adhi-
beri debet.

Ego sanè Audomaro Castal Cæmen-
tario qui iacebat in via Repstræt, postquā
illi

illi secundò directà secta fuisset, in pleuritide sinistra, infra quartum, vacuatis sexdecim & plus sanguinis vncijs consilio medici le Prebître, sœuiente, imò tunc etiam ingrauescente malo cum desperaret, per oppositam basilicam decem circiter, aut paulò plus sanguinis vncias vacuari iussi, qua vacuatione subitum ac tale leuamen sensit, vt postero die ex toto restitutus sit, quod & in alijs sæpe expertus sum. Sciunt Patres Collegij Anglicani, in quo ducenti ferè ordinario sunt adolescentes, me fœlici successu, nunquam quod meminerim infœlici, quamplurimis oppositam secuisse.

Domini de Bocourt vxori sinistra pleuritide correptæ, cum in principio statim vel inuitus directam secarem & profusis quatuor circiter sanguinis vncijs exclamaret sibi dolorem augeri, suppressa vena ilicò oppositam aperiri iussi, & duodecim eductis sanguinis vncijs subitum leuamen consecuta est, huius rei testes plurimi & cum coniuge superstes Domina Dux Moniales in claustro B. Mariæ de Sole eiusdem pœnè ætatis, vni nomen Maria Leullieu, alteri Antonia Lienart, pleuritide simul afficiuntur, huic quin-

quies secta è directo vena & cum summo periculo post longum tempus conualuit; Mariæ idem contigit quod D. de Bocourt, & detractis duodecim circiter ex opposita basilica sanguinis vncijs præsentè Pastore Sanctæ Margaretæ earum confessorio, subito leuata est, mirante Pastore, quod prout sanguis fluebat, minuebatur dolor proportionatè; Quid aliud hic conijciendum quam primam sectionem, fluxionem ad partem affectam proripuisse?

Magistro Francisco Fournier Sanctæ Margaretæ capellano plethorico notha pleuritide affecto, opposita sectio repetita morbum soluit.

D. Bertrand, nunc Carthusiæ Audomarenensis Priori, in notha pleuritide idem accidit præsentè tunc Priore D. Thoma Very.

Idem expertus sum in D. Petro de Grenet, D. de Beaurepaire in pleuritidis principio, idem sanè mihi in plurimis alijs feliciter successit.

Rel. S.
Bertini.

Nouissimè & cum D. de Miraumont Archensis præpositus duobus mensibus à præcedenti pleuritide, opposito latere cum febre doleret, oppositam secari iussi & benè habuit: Qualiter & in pluribus religiosis successit eiusdem Monasterij Sancti

Berg.

Bertini, D. Beugin, F. Ogier & alijs.

Sed quid in eiusmodi experimentis enarrandis lectorem fatigans, tempus tero? testor, ita me Deus iuuet, me innumeris opposita sectione profuisse, nulli, quod sciam nocuisse.

Sed contra ista experimenta insurgit Gardinus, Ardelionis, inquit, *hac sunt in-
menta. Si primum per directam tot uncias
detraxisses, idem leuamen habuisses.* Orat. I.
pag. 29.
& Anal.
pag. 7.

Respondi, neutiquam: quia si vacuati sanguinis quantitas ex opposita, causa est leuaminis, non sectionis ratio, Cur ut è directâ fluebat sanguis, non leuabatur dolor ad fluxi proportionem, sed augebatur, sicut ex opposita quando dolor leuabatur, prout vacuabatur antequam iusta quantitas sanguinis vacuata ex toto dolorem leuaret? his nihil respondens, oratione prima pag. 29.

Regerit & quærit; *Si primò per oppositam tres, aut quatuor uncias eduxisses, tum alias decem, aut duodecim per eiusdem lateris basilicam, nonne eadem curatio contigisset?*

Respondeo quod non, quia quatuor uncie ad reuulsionem non suffecissent, nisi Erasistrateo, & illi qui octo sanguinis uncias directâ sectione sufficere asserit ad

reuellendum & à parte vacuandum. & reuera talis opposita vacuatio redoleret quid ardelionis, interim etiam talis vacuatio aliquatenus sanguinis impetum à parte affecta retraxisset, & sequens directa sectio minus fluxionem proritasset, ergo quod cupit sincerè

Dicam me in consultationibus, maluisse consultatium iudicium expleri quàm meum, atque ideo cum praxis hæc ut noua (etsi antiquissima) iactaretur, & calumniam agentem exponeret, multumque intersit medicum suam sibi famam innocentem etiam ob publicum bonum retinere, malui, inquam, communi opinioni, etsi erroneæ, ad tempus seruire, ita tamen ne nocerem; cum igitur directa sectione adstantes & ægri experti aliquando fuissent directa sectione dolorem augeri, ad oppositam turò me contuli. Crudelis sanè est & detestanda peruicacia, mutare sententiam nolle, ne non ante sapuisse videamur.

Non sic egit medicinæ parens Hippocrates, qui in pleuritidis principio fomentis usus, & his non leuari sed augeri malum videns, fluxionem proritari coniectas, non erubuit illis reiectis ad venæ sectionem

*De vict.
rat. in a-
nt. 2.*

Anionem se conferre, & pudebit, aut ardore
 erit, qui detractis aliquot sanguinis
 vncijs è directo cum doloris exacerba-
 tione in melius sententiam mutabit? *At Gard. a-*
si amplius detraxisset dolorem leuasset. Indo- *rat. 1.*
 ctus es, Heurni, qui post fomenta & dire- *pag. 29.*
 ctæ sectionem ad oppositam recurris; In-
 doctus es, inexpertus, & leuis ô Hippocra-
 tes, si Gardino credis, balnea continuas-
 ses & fomenta calidiora adhibuisses Ana-
 xioni & dolorem leuasses; docuisti nos
Omnia secundum rationem facienti & non *Aphor.*
proficienti, non oportet ex alio in aliud tran- *52. sec. 2.*
sire. Sic est, at sic peruiaciter agere, non
 est rationem cum experientia coniungere,
 sed iuniores medicos ad peruiaciam ad-
 hortari, & desipere: *ubi sensus viget ibi de-* *Arist.*
ficit ratio cum ostentatione - His & alibi *phys. 1.*
 scriptis abundè satisfactum puto eruditis-
 simo van Houtte, vt qui medicinam iam à
 multis annis exercuerit: atque his per trā-
 sennam deductis ad Gardini propositam
 querelam redeo &

Concludo-me non solùm, quod ante in
 Querela 7. probaui respectu azygotæ, ne-
 dum intercostalis, mamillaris, & thora-
 cica ad opposita reuellere, sed respectu op-
 positionis totius medietatis corporis ad al-
 teram,

In Paren-
thesi pri-
ma arti-

Coment.
in lib. de
infirm.
Hipp.

teram; quæ ratio Gardinum latuit, vel dissimulater præterijt etsi eam dederim in explicatione motus critici: Quam rationem solam ausim ego omnibus Gardini sophismatibus & nebulis, ut firmissimum vmbonem opponere; Hanc enim tanti fecit magnus ille Scaliger, ut post multorum annorum experientias sic concluderet.

Finem in quem intendimus hunc esse par est, prohibere sanguinis copiam ne ad malè affectum currat locum: Ergo ab opposita parte sanguis detrahendus, nam si dolor in latere sinistro sit, aperta ibidem vena plus trahit à dextro in sinistram, quam dextra incisa in sinistram, plus enim humoris est inter circumferentiam dextram & doloris locum, quàm inter eandem locum & circumferentiam sinistram: Vnum habent quo perfugiant non prodesse quoniam nulla sit, ut appellant, colligantia; at

Nos dicimus non nunc agere ut quod influxit detrahamus; neque enim magni momenti est, neque quisquam prima statim die mortuus est, sed post multam affluxionem, quam tollit vena contraria remota, vena autem eiusdem lateris, non solum non tollit, sed etiam trahit ad locum malè affectum. Itaque toto post facto fluxu, ex eadem parte quoque detra-

Q U E R E L A V I I I. 251

detrahimus; Ac de ratione quidem hac, de experientia quid dicamus facile in promptu est.

Iam duodeuiginti annos non nisi unum vidimus ex eadem parte incisa vena euasisse: Et sanè corpus erat athleticum, ut etiam magis miraremur. Verum scimus multos etiam sine phlebotomia sanos factos: At plus octoginta redeimus in comentarium quinto ab hinc anno, qui omnes eo curandi genere extincti sunt, cum plus quingenti his duodecim annis euasisissent, quibus in aduerso cubito vena aperta fuerat. Ecce quam validè & ratione & experientia nostram sententiam confirmat Scaliger, vndè concludere hic iterum iure meritò possum, non benè con- cluisse Clarissi. D. Remigium.

Speculatores sunt, non practici, qui in pleuritiside venam lateris sani incidunt.

Q U E R E L A I X.

Querit Gardinus orat. prima pag. 19.

Dic ergo ubi vidisti Gardinum non opportunè secuisse?

Duaci
ano 1633.
Sept. 3.
defenden-
te Ioanne
Baptista
Doulcet
Insulens.

Similiter quærebat in decreto, ubi cum quinquaginta circiter sanguinis vncias quinque sectionibus è directo vacuatas nil profuisse, sed ægrum
sexto

sexto interiſſe ſcripſiſſem, docet Gardi-
 nus nō ideo eueniſſe, quod reuulſio ex op-
 poſito non præceſſiſſet, ſed quod nimium
 ſanguinis eduxiſſent medici cum quibus
 conſilium inieram & dum nimium ſecas,
 inquit, necas & vitam cum ſanguine fundis,
 & præſtitifſet in hoc caſu, poſt octo, aut nouē
 vnciarum euacuationem, maturationem cun-
 ctando, præſtolari, & poſt per puris expecto-
 rationem perficere curationem. ad hæc reſ-
 pondi in apolog. dum Gardinus non quo-
 modo & quantum opus eſt vacuat, ſuf-
 focat;

Nempe ſic agit contra Hippocratis,
 Galeni, Fernelij, Fuccij, Hollerij, Ron-
 deletij, Laurentij, Dureti (quos medicinae
 primates appellat) decreta, qui in pleuri-
 tide ſanguinem ducunt dum color mute-
 tur: Ipſe Galenus in acutis paſſionibus,
 & vehementibus doloribus ad animi de-
 liquium excluſiuè ſanguinem duxit, &
 cotulas ſex protinus detraxit κοτύλας ἕξ
 id eſt vncias quinquaginta de Curandi
 R. per V. S. cap. 12. λίſſας 5. cap. 14. &
 erit qui dicat tantos viros ſic agentes æ-
 gros iugulare?

Conſultius itaque erit materias morbi-
 ficas reuellere & diſtrahere, quam pati
 con-

congestas ægri discrimine ad suppurationem verti, ne ægri, vel propter multitudinem & perniciem ante maturationem opprimantur, vel empii fiant & suppurati, vel repente suffocentur, pure per aortam in vitæ fontem affatim irruente, quod plerisque accidit, & nuper id post undecimum diem observaui in religiosa apud Urbanistas Audomar. Francilca Poulain, quæ suffocata est repente maxima etiam puris quantitate paulò ante mortem per os reiecta: huic è directo quater secta vena fuit, quod illa affinem medicum haberet, qui sectionem oppositam ita infamabat, vt asinorum doctrinam esse proclamaret, ipsaque religiosa eo errore preoccupata, oppositâ sibi secari timeret.

Difficilis sanè est euētus pepasmi pleuriticæ materiæ, quoniam fortunatior periculo non vacat, vt expectoratio, difficilior cum per vrinas traducitur, calamitosus dum per intestina viam quærit, sic docente Hippocrate & Auicenna, quod testatur Anaxionis historia cui concoctio-
 nis signa undecimo tantum apparuerunt, & quidem debilia de ipso scribens Gale-
 nus; *Permutatur ergo rarò faustè nisi citò*
ineunte morbo per sputa breuietur: addo &
quidem

Cap. de
pleur.

Lib. de
Cris. 2.
cap. 8.

Aph. 11. quidem laudabilia, vt voluit Hippocrates,
lib. 1. & quippe illo teste transposita sincopem mi-
prog. lib. natur in corde effusa, coma, aut phrene-
2. n. 13. tim in cerebro. Areteus de infœlici suppu-
 ratione perpetuo sollicitus est & quia, in-
 quit, *pulmo rarus & calidus ad seipsum tra-*
hit proxima, unde subito pereunt, si hæc pe-
Hipp aph rricula euaserint empyici fiunt & paulatim
16. sec. 7. contabescunt, porro à puris sputo tabes.

Qua consideratione moti præstantissi-
 mi medici, etiam pleuriticis qui in prin-
 cipio sanguinem spuunt, sanguinem mit-
 tunt, nec ideo *carnifices dicendi sunt*,
Propos. 9. quod ait Clarissi. D. Remigius, Rectè
thesis im- enim sanguinem spuuntibus vena incidi-
pressa tur, quoniam is viam periculosam affe-
Duaci ctat, satius est enim è brachio decem san-
anno 1633. guinis uncias detrahere, quam vnâ per-
mense No- os vacuari: Nūquid in hæmorrhagia san-
uemb. ... guis mittitur licet viam ita periculosam
defenden- non sequatur? Nisi igitur exiguus fuerit
te M. loã. dolor, & nulla aut admodum parua febris
Preu- comitetur pleuriticum, & nulla plethora
dhomæ. quæ fluxionem ad partem affectam mine-
 tur, etiam sanguinem à principio, spuente
 pleuritico, vena ex opposito secanda est.

At verò si pleuriticus nil spuat, spiritum
 vix ducat, & cætera pleuritidis symp-

tomati

tomata vrgeant, nunquid octo, aut nouem vnciarum vacuatione arui satisfaciamus? obseruo omnes medicos contra facere.

Quibus perpenſis Gardini conſilio valere iuſſo, Hippocratem & Galenum ſequemur duces, quiſſe experientia edocti ſumus, omnes ferè pleuriticos, opportunè adminiſtrata reuulſione, citò & tutò citra ſuppurationem ſanatos. Rectè itaque docui, dum quis non opportunè ſecat, id eſt, non quomodò & quando, & quantum opus eſt vacuat, ſuffocat: Quod Galenus Eraſiſtrato & Stratonì de puella Chyenſi & Critone, quos defectu ſanguinis vacuati ſuffocatos dicit, exprobrat.

Prudenter itaque faciunt, qui præcipiti occaſioni ſeruientes (circa quam, inquit Galenus, *vides plerumque medicos, non modo vulgares, ſed etiam præcellentes aberrare*) in principio ſanguinem ad plures vncias detrahunt, Querelam concludat Iul. Guaſtauius in Piſano gymnaſio & nunc docens, doctiſſimus medicus & philoſophus; Quod ſi, inquit ille, *ut Galenus* 9. *demerent aliquando hodierni medici in morbis nonnullis, qui interdum, dum quinque aut ſex vncias demunt, maximè inualeſcunt,* debet

*Comens.
in aph. 1.
lib. 1.*

*Locor.
Med. cap.*

debellarentur protinus, nec redderentur incurabiles, Audacius igitur sanguinem euacuantem miras aliquando perficeremus curationes; sed cauti & infamia metu, nimirum timidi sumus, ne quem non seruauerimus (ut ait Celsus) eum perdidisse existimemur. Quis ergo non benè secat? qui quocumque tempore etiam in principio, directam semper secat. Quis suffocat? qui octo aut nouem sanguinis vncias dum fudit, phlegmonis maturationem expectat, quod faciendum docet Gardinus.

Q V E R E L A X.

Orat. quodli. i. pag. 26. declamat.

Temerè peccas & enormiter, dum me reprehendis, quod in pleuritidis plethorici corporis principio, dicam conuenire reuulsionem & euacuationem à loco affecto: Primò per venam cruris si magna sit plethora, & pleuritis sit omnino in suo principio, tum per basilicam eiusdem lateris. & sic insurgis.

In principio à parte affecta vacuare ab omnibus temerarium censetur, nec, quod dicis Galenus id asserit, malè citas, non dicit a, sed per, in quo est magnum opera pretium.

Non.

Non negat Gardinus sic se scrip-
 se, vbiq̃ue enim gloriatur se id
 peragere, nodus est in citatione,
 locus Galeni ad verbum reddendus & ex-
 plicandus.

Dico igitur, quod in principio pleno
 corpore à parte phlegmone tentata va-
 cuare temerarium censetur, per Canon. 9.
 & 11. & si candidè egisset, non detortè
 interpretatus argumentum meum de voce
 à, vel per litigasset nodum in scirpo quæ-
 rens, quæ voculæ à Galeno sæpè pro eo-
 dem sumuntur, sicut ex & à 7. sententia
 articuli 2. sed ad rem;

Postquam Galenus incipientis oculi
 phlegmonis, in quo non solum venæ ca-
 pillares distentæ & sanguine turgidæ ap-
 parent, sed etiam communes & sangui-
 fluxæ, ideoque cum plethora, curatiuū sco-
 pum edocuit influxi à parte vel ex parte
 euacuationem, vel abeuacuationem, *siqui-
 dem partis erat immoderata repletio*, & duo-
 bus modis id fieri, vel per humoris ex aut
 à parte retrogressionem & euacuationem,
 vel euacuatione per partem ipsam, per &
 à diuisiuè incommoda declarat art. med.
 cap. 25. inquit,

R

Si

• Ex par-
te eua-
cuemus.

Si igitur corpus vniuersum plenū fuerit
 ἔκρη διὰ τῆ πεποιθότος τόπῃ ἐκκεῖν per locum
 patientem non oportet vacuare; docet autem
 modū, Nam si scarificationibus, aut sectioni-
 bus sensibiliter ἐκκενώσομεν * plus ratione ex-
 citati doloris attrahemus, Si verò calfa-
 cientibus dispergere tentabimus, plus erit
 quod vi caloris ad partem attrahemus, quam
 quod dispergemus, ratione cuius non licet
 ἀποκινῶσθαι, aut sicut Aldi codices habent τὴν
 ἐκ τῆ μέγας κένωσιν instituire, nempe huius
 periculi plethora statuitur, ex hypothesi.

Hic igitur ἀποκινῶσις id est à parte vacua-
 tio, idem est quod ex parte, vt supra dixit
 * ἐκκενώσομεν cucurbitulis, quod interpreta-
 tur ante διὰ τῆ πεποιθότος τόπῃ ἐκκεῖν per
 partem, sed missis grāmaticalibus argutijs
 Videamus (in quo nodus latet) num ru-
 tius humor influxus à parte per retroces-
 sionem, quam ex parte, aut per partem
 euocetur corpore pleno.

Quod si voluerimus, inquit, quod influ-
 xum est retrorsum agere παλινδρομαῖν ἀνα-
 κλῆν id est, ad fluxionis fontem reuellen-
 do in contrarium euacuare, corpus plenum
 non admittet: Ad hac igitur ambo (vtrum-
 que diuisionis membrum eodem periculo
 infamans) totum corpus κένωσαι oportet.

• ἢ ἀν-

ἢ ἀντισπᾶσαι πάντως ἕως ἄλλα χωρία τὸ ἐπιρ-
 ρεῖν τῷ πεποισῶσι aut omnino ad contraria re-
 uellere loca, quod influit ad partem.

Ergo, si Galeno credimus, corpore ple-
 thorico in principio phlegmonis, maxi-
 mé si humor fuit, neque à parte, neque
 per partē, neque ex parte influxi humoris
 vacuatio facienda, priusquā totū euacua-
 ueris & fluētē ad partem humorē reuul-
 seris ἕως ἄλλα χωρία ad omnino contraria,
 id est, ab vna corporis parte ad aliam, à
 dextra ad sinistram, quæ in toto contraria
 est, sicut à superiore infima: sicque facien-
 dum præcipit Canon 7. & 9. & qui contra
 agit, temerariè agit arti Galenicæ dissen-
 tancè. Iudicet ergo lector si Galeni textum
 malè citauerim, & illius sensum non sim
 assequutus. *Maître Galene*, hic ait Gardi-
 nus: Sed liceat mihi hîc Gardinum affari
 verbis quibus Erasistratum Galenus: *Quid* Nat. fa-
ita rhetoricè sine demōstratione, ô Gardine, cult. lib.
transcurris? dic aliquod dogmatis vitium, quo 1. cap. 16.
vel tibi veterem opinionem reprobanti creda-
mus, vel te hanc minimè intelligentem ab
errore reuocemus;

Increpat: Egone dum sanguinem à la-
 tere reuello & euacuo, cucurbitulam super
 pleuritisico latere applico? egone per ipsum

R 1

locum

locum affectum sanguinem renello & euacuo?

Equidem scio Gardinum nec cucurbitulas applicare, nec octo vnciarum vacuatione, quod gloriatur, ob anastomoseon impotentiam per partem affectam, aut ex parte affecta influxam materiam vacuare & impactam,

Sed quia toties iactat id se perficere, ideo concessio quod per prætenſas anastomoses vacuet, dico quod à parte, & ex parte, & per partem affectā vacuet. Enim- uerò ex Galeno docemur phlegmonem pleuriticum fieri ubi azygotæ apices terminantur, ad quem locum Gardinus peruenire docet intercostalis, mamillaris, & thoracicæ apices eiusdem lateris, & ibidem anastomosi coire & vniri, ita vt ex his in illas, & ex illis in has mutuus sit refluxus, per quos apices gloriatur se fluentem & influxum per azygotam ad locum affectum, id est, per azygotæ apices extremos sanguinem vacuare, attracto nempe sanguine ex locis ibi vacuis & apicibus azygotæ per apices intercostalis, mamillaris, & thoracicæ: Nunquid ergo qui sic vacuat (quod & demonstratum est in fine articuli 5.) ex loco affecto & per locum affectum vacuare censendus est? sic sanè est,

Cap. 4.
lib. de in-
equal.
temp. &
therap. li.
5. cap. 2.

est, Nam illo, inquit Galenus, qui in extremitate vena (scilicet mamillaris, thoracicæ) est, vacuato, continuo succedet alius (scilicet ex finibus azygotæ illis anastomosi coniunctis) propter totius corporis repletionem, atque ita (quod temerarium est) fluxionem augebis & dolorem.

Sed & citra plenitudinē necessitate vacui & continui geminabitur fluxio ratione debilitatis partis affectæ, doloris, & caloris trahētis, sic docentibus Galeno & Hippocrate de pleuritide agentibus, dolorem, inquit Hippocrates, vehementem exhibet pars affecta & percalefit, & per caliditatem attrahit à vicinis venis & partibus: Remotæ autem partes & oppositæ potentes ad illam mittunt.

Confectum igitur est, in corpore pleno & non pleno etiam ex doctrina Galeni, nec à parte ipsa, nec ex parte, nec per partem ipsam in phlegmonis principio esse vacuandum.

Sed contra suprapositam vacui & continui necessitatem obijciunt quod Celsus scribit: Vena sectio proximum locum primum exhaurit, ex ulterioribus eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, ubi is suppressus est, quia non trahitur ne venit quidem.

R 3

Hanc

Art. med.
94. cap.Lib. de C.
R. per V.
S. cap 8.
& ther.
lib. 13-
cap. 5.
Gal. lib.
nat. fa-
cult. 3.
cap. 13.Lib. 1.
cap. 10.

*Stat. fa-
sult. lib.
2. cap. 1.*

Hanc obiectionem nullius esse momen-
ti facit, quod ait Galenus; *Si quid venis
effluit duorum alterum sequitur, aut va-
cuum locum ex templo fore, quod non patitur
natura, aut quod continuum est affluxu-
rum esse, abeuntisque locum implere, atque
ita vacuatis in loco affecto venis per præ-
tensas anastomoses, necessariò à potente
& sana parte sanguis adueniat necesse est.*

Dicent 2. vacuatis venis vsque ad locum
affectum, non necessariò qui ulterius est
sanguis sequetur, quoniam venæ vacuatae
vt molles concident in seipsas ad vacuati
proportionem, quæ fuit Asclepiadis ratio,
& sic valebit obiectio Celsi, *si non ultra
trahetur ne venit quidem.*

Dico 1. Istas vasorum concidentias non
fieri nisi inanito toto (vt in hecticis) nec
illas impedire consecutionem, quia non
sola ratione vacui, sed & continui affluit
sanguis, ad quam & concidentia non
modo non obesset, sed prodesset si Ferne-
lio credimus.

Dico 2. Celsum sic scripsisse: *Ex ulte-
rioribus autem sequitur quatenus emittitur,
ubi is est suppressus, ne venit quidem, id est
quando vena clauditur, non trahitur, nec
amplius à longinquis partibus sequi-
tur;*

tur; Quamdiu autem aperta est vena & emittitur, eatenus è distantioribus semper sequitur, *ita vt* (quod docet Fernelius) *Therap. lib. 1. cap. 3.*
patente via vniversus cum anima excidas:

Vnde rectè Celsus dixit, *cum sistitur non trahitur, non tractus ne venit quidem*, at cum non sistitur clausa vena, quia trahitur venit & sequitur quamdiu emittitur ratione vacui & continui.

Quod si sistatur antequam sequatur is qui in loco affecto est, defectu quantitatis sufficientis, à directè secantium scopo aberrabit, & quod docuit Rôdeletius proritata fluxione nocebit, nec partem onere pressam leuabit.

Sed his calamitatibus occurrit Fernelius. *Cum pars laborans, inquit, magis quam cetera exinanita fuerit, si ad penuriam usque detractum sit, vix denuò alia humorum fluxione conflictabitur, quia, inquit, distantes indigentia auida proprium sanguinem elabi non sinent, nec pars affecta, nisi dolor aut calor restet vehemens, ab illis quidquam eripiet. Verum hæ rationes nihil omninò valent.* *Lib. 2. therap. cap. 5.*

Quomodo enim distantes in opposita corporis parte erunt indigentia auidæ, si ab his opposita vacuatione nil attrahitur

quod docent omnes directā perpetuo secā-
tes? omnia enim erant plena; At quomodo
sanguinem retinebunt, quem Galenus do-
cet illas continuò à se ad partem morbo-
sam & imbecillem propellere, siue quan-
titate, siue qualitate sola peccet? Si igitur
pars affecta magis quam cæteræ partes &
ad penuriam inaniatur, ratione vacui &
continui, sequetur is qui in opposita par-
te æstuat, parte affecta dolore & calore
ipsum etiam attrahente. Fatetur sic esse
ipse Fernelius *propter eam, inquit, quam
natura seruare cupit analogiam & in toto
corpore æquabilitatem, inanita & indigen-
tes trahant ex plenioribus, & pleniores illis
subsidio veniant, copiaque grauata in va-
cuas illas onus suum deponant necesse est.*

*Therap.
lib.2.cap.
3.*

Iudicet hîc lector si temerè scripsi, te-
merariū esse in pleuritidis principio cor-
pore pleno ab affecta parte, quod gloria-
tur se agere Gardinus, vacuare, non retro-
cessione materiæ, sed propriissima ex par-
te & per partem euacuatione.

QVE

Q V E R E L A X I.

Oratione 1. pag. 31.

Falsum est, inquit Gardinus, quod molior motus contrarios, dum vno respectu, ex remoto termino à quo reuellere me dico, & ex eodem proximior euacuare doceo.

R Espondeo quod is qui affirmat (quod passim iactitat) se vna eademque sectione à loco affecto reuellere, deriuare, & euacuare exactè loquendo, is, inquam, si Galeno credimus, vna eademque sectione, vno eodemque tempore, motus contrarios molitur & esse affirmationem nugationi simillimam, si reuellere sumatur in proprio significato, sicut & deriuare & ab affecta parte euacuare, quæ passim confundit Gardinus, quippe ἀντιστροφῆς distantiam contrariam connotat, ita vt vicinior dari possit ad deriuandum & ab affecta parte vacuandum, παροχέυσεως viciniam non contrariam, sed directam ita vt proximior dari non possit per venæ sectionem: Quomodo igitur vno & eodem tēpore vnus & idem terminus ad quem, potest esse proximus, & remotus, directus & cōtrarius, termino à quo? implicat sanè vnum eundemque

terminum esse remotum & proximum, oppositum & directum, respectu eiusdem termini.

*Therap.
lib. 2. cap.
8.*

Deinde, reuulsio præcedere debet derivationem & à parte affecta vacuationem per Canon. 9. quomodo rursus idem secundum idem vno eodemque tempore sequi potest & præcedere? id nouerat Fernellius, *Opportunè, inquit, derivatio administrabitur, quum reuulsione præmissa fluxionis impetus & ardor iam resederit, neque denuò recentis & inopinati suspicio erit.*

Neque verò facit ad rem quod media extremis sint contraria & extrema medijs, sicut in moralibus liberalitas & prodigalitas auaritiæ, quia illa sunt æquè contraria respectu duntaxat excessus & defectus æqualiter vitiosi & æquidistantis; At in reuulsione non duntaxat contrarietatem spectamus particularem & qualemcumque, sed vniuersalem respectu totius coniuncta distantia per Canon 2. tum & reuulsio præcipuè partem mittentem spectat per Canonem 6. Derivatio recipientem, Basilicà itaque eiusdem lateris est contraria directæ pleuræ, si duntaxat oppositionem spectemus qualemcumque, aut particularem, quæ à Galeno damnatur in reuul-

reuulsione locali, per Canon. 2. nisi vniversalis vacuatio præcesserit.

Enimuerò quia ad contrarietatem reuulsuam adiungenda est distantia, ita vt proximior detur ad deriuationem, & ab affecta parte vacuationem, ideo illa eiusdem lateris sectio non dicitur contraria sed directa, respectu enim pleuræ nulla vena proximior secari potest quam basilica directa per Canon. 4. vnde talis sectio non potest dici reuulsio, sed per Canon. 10. deriuatio, & talis à Gardino allata mixta vacuatio non est reuulsio per Canon. 9.

Ex quibus concluditur etiam, Clar. D. Remygium non benè sic conclusisse. *Manifestum est humorem, qui à vena caua per costarum venam ad pleuritidis locum defluit, redeundo à pleuritidis loco per costarum venam in venam cauam, trahi in contrariam partem, siue in aduersum, siue è contrario quam ante deflueret, quæ conclusio niti- tur ratiocinatione Christophori à Vega, qui etiam ex sola contrarietate reuulsio- nem metitur & sic ratiocinatur: Locus scis- sionis directæ contrarius est parti inflamma- ta, atque ea ratione ad ipsum tractio reuul- sio est, & contrarietatem extremorum ad medium nihili faciens, inquit, contrarius*

Defendē- te Fran- cisco de Viennes Paulensi Aprilis 30. Anno 1632. Du- aci.

Art. med. lib. 11. sect. 5. cap. 1.

autem

autem est in locorum differentia, quæ est dextrum & sinistrum, quod sic probat, cum etenim sanguis ab inflammata parte in venam cauam recurrit (scilicet refluxu per azygotam non anastomoses prætēlas Gardini, qui hanc contrarietatem allegare non potest) inflammatione in dextro latere consistente, à dextra parte in sinistram partem agitur (nempe à phlegmonis loco ad anastomosim originalem azygotæ) deinde cum mouetur à vena caua & in locum scissionis ducitur (nempe ex caua ab ostio azygotæ per subclauiam eiusdem lateris & axillarem ad locum scissionis basilicæ eiusdem lateris) iam à dextra in sinistram & ab interiori ad exteriorē: est igitur Reuulsio.

Nos verò, neque isto sophismate scissionem è directâ basilica reuulsionem esse dicimus, nisi forte sit reuulsio localis, quæ (præter quod damnatur à Galeno) nisi præcedat euacuatio plenitudinis, reuulsionis nomen non meretur, & locum non habet in reuulsione vniuersali, de qua agimus, & ratione pleuritidis disputamus; Non enim, quod & hic supponere debet cum Gardino, natura ratione agit & respectiue, sed edocta motu prædestinato, adeo ut qui sic in principio secant totam san-

Q V E R E L A X I. 269

sanguinis æstuantis molem ab opposita parte sana in debilem attrahant. Quod & imposuisse videtur Iouberto, qui eadem *Parad. 11. decad. 1.* sectione reuulsionem & deriuationem hoc pacto fieri putat, ita vt non eodem tempore, sed diuersis temporibus hæc fiant, quasi prius vacuetur is sanguis qui influebat prima sectione, & eo vacuato is qui influxit sequenti sectione medici voluntati & phantasie obaudiente sanguine: Nec melius Sanctorius docet, *quod reuulsio fieri potest per proxima*, allegans Galeni factum th. 5. cap. 14. vbi applicatione Thapsie, futuræ coronali, reuellit ab intima cerebri parte ad pericranium, nisi de locali reuulsionem intelligat. *Cōment. ad part. 6. cap. 89. art. med.*

Q V E R E L A X I I.

Oratione prima pag. 31. Scribit Gardinus. *Falsum est quod non detur morbus in fieri, cuius nihil adhuc factum sit, falsum est quod non detur morbus imminens.*

DIco primò, morbum in fieri cuius adhuc nil est factum, quem etiam imminensem vocat, non esse morbum, sed esse in suis causis latentem morbosam diathesim necdum morbi fini-
tionem

tione comprehensam, sicut glandem quercum non dicimus, quod quercus his constet membris, sed duntaxat quercus futurae conceptum, genituram, seminium.

Dico secundò, morbum in fieri, esse morbum iam incipientem, qui morbi finitione comprehenditur, & extra suas causas actu positus est, quem praesentem agnoscimus, licet non omnimodam perfectionem & absolutionem sit assequutus,

Antich.

pag. 90.

Gardinus morbos paulò post futuros videbat ut absentia, si quis praeter prophetam absentia videre potest ut futura, & ne sint prouidet: Nos contrà illa ut morbi seminia, & antecedentes causas praesentia consideramus & illa destruimus, & sic prouidemus, ne suam generationem & finitionem habeant.

Pleuritidem imminensem pag. 35. orat. 1. eam definit, (si quod non est, esse definiripotest) cuius causa interna (scilicet materialis) nulla est in motu adhuc (scilicet lationis) in procliui tamen est ut moueatur.

Nos contrà, pleuritidem talem in futuro contingenti absolutè ponimus, & imminensem eam dicimus, quæ est paulò post futura, nempe cum humores nati apti eam facere mouentur, indeterminatè

tamen.

tamen. Hanc pleuritidem in fieri duntaxat
 vocat Gardinus & definit, *Pleuritis in fie-* Orat. 1.
pag. 35.
ri est dum eius causa sanguis nimirum est in
motu, & actu versus latus fluit, quod ex
lancinationibus per artus in via & punctiun-
culis, tensione atque gravitate presentiscis.
Pleuritis illa demum facta est, quando, & Pag. 35.
quatenus sanguis in latere iam collectus est
cum tensione eiusdem loci & gravitate, &
stabili dolore.

Nos contra cum Galeno, dicimus eam
 pleuritidem non modo genitam, sed omni-
 modam habere absolutionem, & quamli-
 bet genitam dicimus quamprimum acti-
 onem partis affectæ lædit cum sensili do-
 lore etiam qualicumque & quamvis in-
 stabili & parum duret. *Contrarium enim* Therap.
lib. 2. cap.
3.
sanitati affectum à quo lædi actionem dici-
mus, morbum tantum appellamus, siue diu-
tius, siue momento duret.

At nunquid sunt morbi in fieri dunta-
 xat, & qui in ipso fieri essentiam suam
 habent, qualis illa iam à Gardino descrip-
 ta pleuritis in proclivi ut adueniat?

Litem dirimat Galenus. *Exactè, inquit,* Lib. de
sympt.
diff. cap.
1.
loquenti (quod Doctorem decet cathedra-
rium) affectus passio iam est facta, non au-
tem qui adhuc sit; Atqui definiente eodem,

mot-

morbus est affectus præter naturam qui actionem primò per se lædit, ergo quæ adhuc sit passio siue est in fieri, non est morbus:

*Therap.
lib. 2. cap.*

2

Hinc sic conclusit: Ergo nec qui morbum, esse motum præter naturam dixit, intellexit quid diceret, neque is qui mutationem esse ab eo quod secundum naturam est, in id quod

*Therap.
lib. 2. cap.*

2

præter naturam est: Quia, inquit, quæ corporibus accidunt etsi millies sint alterata, nocere profectò actioni non possunt, quamdiu à quibus fiebat naturam suam tuentur: vnde sequitur

Humores quantumuis commotos in via morbos dici non posse, sed neque in parte contentos, vt podagrica seminia, si actionem non læserint, quod malè docuit Paracelsus lib. 2. de pod. Rectè igitur sic concludo,

*De simp.
diff. cap.
11.*

Affectus in fieri, sunt morbificæ diatheses & parascæue, non morbi: quod latè sic explicat Galenus. Cum morbus sit affectus præter naturam qui actionem lædit, morbum autem præcedere potest affectus alter, qui etiam præter naturam sit, non tamen secundum suam ipsius finitionem actionem labefactat, sed morbi interuentu talem affectionem non morbum, sed causam quæ morbum præcedat appellamus: Quotquot igitur

tur affectus precedunt ij morbi non sunt, nec statim quidquid est in corpore prater naturam morbum appellabimus, sed id quod primum actionem vitiat malum.

Morbum igitur medici rectè imminere opinantur, eum scilicet, qui paulò post futurus est (etsi nondum sit) nisi impediatur, & qui imminet morbus apud medicos sæpè non generatur, quia causæ eius destruuntur, & seminia, sic græcis imminencia sunt μετ' ολίγον μέλλον paulò post futura, & hispanis *el futuro diuiden en dos, uno imperfecto que sera presto, otro perfecto que tardara mucho à venir*, hinc dicimus quod qui morborum antecedentes causas destruxit, plethoram scilicet πυρεσος παρασινών cacochymiam, non morbum sed morbi futuri seminia destruxit, vel morborum causæ pro morbis accipiendæ, aut morbos substantias esse cum Paracelso, non qualitates cum Galeno, statuendum est. Nec plures Galenus quam tres sanguinis mittendi scopos edocet ἢ παρόντος, ἢ προσδικομένου, ἢ ἀρχομένου presentis, futuri siue paulò post futuri, & incipientis:

Nam phlegmonis in fieri, siue incipientis & qui in generatione adhuc est, triplex, inquit, est indicatio, velut in reliquis morbis

S

qui-

quicumque in gignendo adhuc sunt, necdum
absolutionem nacti, quod enim eorum gene-
ratum est, ad medicina partem quæ morbos
curat, subiicitur, quod in generatione adhuc
est parti quæ futurum morbum praeauet, at-
que ideo diximus non simplicem, sed compo-
sitam esse totam de ijs agnitudinibus, quæ in
generatione adhuc sunt, medentis sollicitudi-
nem, ex ea scilicet quæ prouidet, & ea quæ cu-
rat. Sicuti etiã si quis phlegmone adhuc labo-
rare non cœperit, sed tamen appareat iam sub-
esse in corpore genus aliquod eorũ quæ phleg-
monem excitare possunt, talibus omnibus sola
prouisio indicatur.

Ex quibus docemur affectum, qui in
generatione adhuc est vel in fieri, esse iam
morbi finitionem adeptum, & morbum
præsentem esse & incipientem, qui in fieri
ideo dicitur, quia omnimodam absolutio-
nem ad quam tendit, nondum est assequu-
tus, ergo cum primũ incipiunt morbi,
tunc demum sunt, & sunt partim in fieri,
partim in facto esse, & tandem suis sti-
pati symptomatibus perfectionem suam
assequuntur, materia itaque coniuncta
quæ adest morbo in facto esse, curatio-
nem postulat, influxura verò & influens
ut morbi materia antecedens, prophila-
xim.

axim, sicut si phlegmone adhuc omnino non coeperit, sed adsint causæ quæ illum excitare natæ sunt.

Ergo ad mentem Galeni pleuritis vel est imminens, vel duntaxat in fieri, vel pauld post futura (quæ sunt synonyma) & prophiliaticæ subijcitur, vel præsens incipit esse cum doloris sensu & actionis læsione se manifestans, eaque partim est in fieri, partim in facto esse, quia ut loquitur Galenus *in gignendo adhuc est, nec suâ absolutionem assequuta*, licet suam habeat finitionem & competat illi pleuritidis definitio, atque ideo partim prophiliaticæ, partim curatiuæ subijcitur, vel absolute est in facto esse, & curatiuæ omnino subijcitur.

Quibus causa materialis sic respondet: Humor vel est totus in parte influxus, in qua mouetur motu alterationis, & agit quidquid agere aptus est cum pleuritis tota est in facto esse, vel humoris pars influxit & alia adhuc influit, estque in motu lationis ad illam, & maior pars adhuc restat fluxura, sicut in pleuritide incipiente quæ sic partim est in fieri, partim in facto esse: vel humor duntaxat est in potentia ad fluendum & motu æstuat indeter-

minato in maioribus venis, estque materia antecedens pleuritidis, vel futuræ vel imminæntis.

His præterea respondet fons, siue terminus à quo huius materiæ morbificæ, qui est vt plurimum lacunæ regio superior circa cor & hepar, via ad terminum ad quem scilicet azygota & eius propagines per quas fit materiæ latio, quæ antecedens vocatur, terminus ad quem, id est, lationis pars affecta, in qua mouetur motu alterationis, & fit causa coniuncta, hisque tria connotantur tempora, præsens, præteritum, & futurum: Concludo igitur ex doctrina Galeni, morbum imminæntem, aut duntaxat in fieri, & cum qui in procliui est vt adueniat, & cuius causa in motu adhuc est & in via ad terminum, non esse morbos, sed tantummodo antecédentes morborum causas: similis sanè fuerit Gardinus imperitæ multitudini, quæ dum vomentem vident, febrim vomuisse dicunt, vel, quod peius est & Galenico Doctori indecorum, in Paracelsi hæresim labitur, qui morborum curationē nil aliud esse asserit, quam seminum ex *iliastro* aut *cagastro* euacuationem & curationem, quasi morbi essent substantiæ quædam, non quid-

*In laby-
rint.med
errans
cap. 8. &
11.*

Q V E R E L A X I I. 277

quiddam præter naturam corpori accidēs. Malè igitur Gardinus morbi causas cum morbo ipso confundit, causam cum effectu, & morbum cum eodem Paracello, *Lib. 2. de podag.* corpus & substantiam esse docet, quem ut Galenicum & philosophum nosse oportuit contraria sub eodem genere poni: & cum sanitas à Galeno in qualitatis genere ponatur, similiter & morbus sub eodem genere collocandus fuit. *Gal. lib. 5. Ther. cap. 3.*

Q V E R E L A X I I I.

Oratione quodlibetica 1. pag. 39.

Insurgit sciolus & balbutit me euacuationem malè diuidere in euacuationem simplicem, auersionem specificam, reuulsionem, & derivationem, prætexens quod Galenus faciat auersionem genus reuulsionis & derivationis. Ad quæ

Dico Galeni definitionem esse bonam, quia auersio æqualiter de vtraque prædicatur ἀποτρέψαι ἢ καὶ ἀποσπῆσαι τὸ αἷμα πρὸς ἑτέραν μορφήν hic igitur definitur auersio qua sanguis conuertitur & auertitur ad alias partes, estque euacuatio electiua, subdit species duas ποροχέτιναι τε καὶ ἀνσίσπαι.

σει, vtriusque autem postea sic connotat
specificas differentias, deriuatur quidem
ad vicina loca παροχετεύσῃαι μιν ἐν εἰς τῆς
πλησιόν τόπων, reuellitur ad contraria ἀντισ-
πᾶσαι ἢ ἐπὶ τῆς ἀντικειμένης, huic contrarie-
tatem remotam, illi rectitudinem vicinam
tribuens ἀντισπᾶν μιν κελύων εἰς ταυανσιᾶ:
παροχετίνειν ἢ εἰς τὰ πλαγία, hic lateris eius-
dem rectitudinem, ibi contrarietatem cō-
notans. Nil certè clariùs quam reuulsio-
nem & deriuationem esse auersioni pro-
ximè vt proprio generi subiectas species:
rectè sic etiam Sanctorius coment. ad part.
6. cap. 89. art. med. quæst. 107. *Auersion est
genus quod predicatur de reuulsione & de-
riuatione*. Sed quæ contrà opponit au-
diamus.

Thetap.

lib. 4. cap.

6.

Orat. 2.

pag. 4.

Primò Galenus, inquit, auersionem loco
citato semel sumit genericè, semel specificè,
ergo possum idem facere.


Secundò sic diuisi euacuationem generi-
cam vt singularum specierum tales dederim
definitiones, vt vnius definitio alteri defi-
nito vnde quaque quadrare nequeat, vel sic,
vt nullas ex his definitionibus alteri definito
applicare possis.

Ac primò. Dico Galenum loco citato
non sumere auersionem specificè, vt patet

ex definitione, vbi auersio genus est cum sibi proximè subiectis speciebus, sicut dum dico animal vel ratione vtitur, vel ratione non vtitur, vbi animal non sumitur specificè, sed genericè.

Ad secundum, dico diuisionem illam Augei stabulum esse, quia euacuationis genericæ proxima species, non est sanguinis euacuatio simpliciter à Gardino hic definita, sed est speciei eius species, scilicet phlebotomiæ, quæ cum socia sibi purgatione pro genere proximo habet euacuationem illam genericam: Phlebotomia autem vt subalterna sub se species proximas comprehendit, euacuationem illam simpliciter, & auersionem: sub hac vt subalterna reuulsio & deriuatio species sunt proximæ: Auersio verd illius specifica, vt patebit ex definitionis explicatione, est reuulsionis quædam differentia.

Ex quibus patet Gardinum omnia cōfudisse summa imis miscuisse, malè diuisisse, specialissimas species subalternis æquasse, quod patet ex sequenti linea prædicamentali.



R Estat examinemus, an quod iactat, auersionis specificæ ab ipso confictæ definitio talis sit, quæ reuulſioni non conueniat, ut id demonſtret miris modis se torquet, pag. 40. oratione 2. *Auersionem specificam, inquit, uoco sanguinis deductionem ulterius factam aliâ, quam eò, quò alioquin fluxisset, ulterius, inquam non repedando, sed ulterius fluendo: hanc nititur probare exemplo, ita, inquit, sanguis qui ex lacuna fluere in pedem dextrum (scilicet per iliacam dextram) auertitur in crus sinistrum (per iliacam sinistram) si per venam sectam in pede sinistro vacuetur, in quo opere non cogitur ut sic ex crure dextro sanguis reuerſi sursum ad iliacarum bifurcationem, sed id sanguinis quod*

quod ad ipsum crus dextrum fluere posuisset ex lacunari, impeditur ad ipsum crus dextrum fluere, ob sectionem in sinistro pede factam, ad quod crus sinistrum sic sanguis deducitur ille per auersionem ex lacunari, atque per locum sectionis foras.

Vno verbo missis ambagibus & pleonasmis, est sanguinis ex lacuna in dextram tibiā fluentis & fluxuri in sinistram tibiā deductio, secundum primam ipsiusmet definitionē, quæ deductio reuulsio est.

At aliud omnino est reuulsio, nam aio, inquit, quod est sanguinis ex opposita parte, quo fluebat, per eundem alueum in quo erat, & per quem fluebat ad oppositam partem retractio. Addo ut si per venæ sectionem in crure sinistro factam sanguis qui erat & fluebat in pedem dextrum per venas crurales dexteras retraheretur ad iliacarum bifurcationem usque, ea foret propriissima reuulsio, nempe quia qui ab iliacarum bifurcatione fluebat ad dextrum pedem sanguis is retrahitur (à pede scilicet aut crure) per eandem iliacam (scilicet repedando) ad istam bifurcationem.

Euacuatio verò illiusmet sanguinis (scilicet sectione oppositæ pedis reuulsi usque ad iliacarum bifurcationem) quæ tunc fit ab hac bifurcatione ad locum sectionis, aliquid respicit

resipit de auersione & aliquid de reuulsione, non tamen propriè est reuulsio, quia nunquam hæcenus fuit in his sinistris venis (scilicet non fluxit à sinistra iliaca ad dextram, quia supponit illum venisse à lacuna) dicitur tamen eatenus reuulsio, quatenus est continuatio retractionis facta ex crure sinistro.

Dico primò, hanc reuulsionis definitionem damnare reuulsiones Galeni in sistendis hæmorrhagijs aphor. 22. & 9. articuli 2. & ipsius Gardini reuulsionē è directo per prætensas anastomoses, tum & per saphenæ sectionem: nil enim reuulsionibus istis retrocedit repedando.

Dico 2. Auersionis specificæ definitionem competere reuulsioni sanguinis fluxuri, per Canon. 7. & 8. porro quod Gardini definitio malè supponit, Reuulsio non est sanguinis duntaxat influxi, sed etiam fluentis & fluxuri ad contraria retractionis, dat rationem Galenus; *Therap. 22. cap. 3.* Primùm namque in eo error est, quod non omnis differentia addita generi ad speciei constitutionem aliquid conducit, sed quæ ex generis propria diuisione nascitur, quippe hæc demum differentia sunt quæ species constituunt, reliquæ omnes alienæ.

Sic cephalica dextra fatente Gardino auertit

auertit specificè, & basilica dextra ab omnibus propaginibus subclauix oppositæ. Sic ab humero, à manu, & cubito dextro reuellit basilica sinistra, & à crure dextro sectio sinistri, quas in contrarium retractiones reuulsionis nomine comprehendunt post Galenum omnes medici, qui de reuulsione scripserunt canonibus articuli tertij conformiter. Quin ipse Aristoteles, tractionem chyli quæ fit à splene ex porta per splenicis, reuulsionem propriè nominat, licet is humor nunquam ante in splenicis fuerit ὁ σπλὴν ἀνσίσπᾱ τῆς κοιλίας & secundum Gardini dogma pro ἀνσίσπᾱ debuisset dicere ἀποτρέπισαι vocabulo generis, loco speciei.

Sed & Hippocrates & Galenus retractionem humoris per eandem viam qua fluxerat non ἀνσίσπασιν vocât, sed ἐπίσπασιν apellât, ex vniuerso corpore natura per quas ante fluxerant δι' ἐμπροσθεν ἢ ἀναδόσις ἐνὶ τῷ ἐπίσπᾱσαι χυμῶς: Et venter ab hepate ἐπίσπᾱσαι φασίως vnde

Dico 3. erroneam esse reuulsionis datæ definitionem, in eo quod asserit sanguinem retrahi debere à termino ad quem fluxit repedando per eandem viam qua fluxerat, reducendo scilicet illum ad terminum

Lib. 3. de
part. animal.
cap. 7.

Nat. facult. 3.
cap. 13.

num à quo & inde foras, & rectè hic Santorius coment. ad partem 6. cap. 89. art. med. quæst. 110. *In reuulsione auersio humorum ad originem non est conditio perpetua.* Nam licet talis possit etiam fieri reuulsio, non tamè omnem reuulsionem sic fieri necesse est (qualiter nec omnia bruta quatuor pedes habere debent) talis sanè esset reuulsio (quam ipse reuulsionem maximè negat) quæ scèta basilica dextra, ex opposito latere influxum & fluentem adhuc sanguinem retraheret, qui à parte opposita (idest dextra) porente missus esset, vel qui à suprema lacunæ parte delapsus in crura, aut partes tegendas phlegmonem faceret. Nihilominus & vnius cruris ad alterum auersionem, reuulsionem cum Galeno & Fernelio, & præstantissimis quibusque medicis dicimus, licet sanguis vacuetur & retrahatur non repedando, & crepera ista ludibria vt falsa, & nullius momèti cōstanter asserimus destructione schematis illius demonstratiui figuræ 4. quo probare conatur auersionem specificam esse speciem euacuationis à reuulsione diuersam.

Ansich.
242-23.

Fluat, inquit sanguis ab a. 1. vsque ad b. 2. & hinc incipiat moueri versus e. 4. sece-

itur autem vena in f. 5. sanguis veniens ab a. 1. vsque ad b. 2. fluet à b. 2. versus f. 5. qui alioquin versus e. 4. fluxisset & sic per alium canalem qui est à b. 2. vsque ad f. 5. vertetur sanguis aliò, idest, per canalem à b. 2. vsque ad f. 5. deducetur sanguis qui alioquin fluxurus fuisset à b. 2. vsque ad e. 4. & erit illa auersio propria omninò distincta à reuulsione propriè sumpta, quæ sic cõponitur.

Fluat sanguis ab a. 1. per b. 2. ad e. 4. & secunda venam in a. 1. aut suprà refluet, reuertetur, reueniet, redibit, retrahetur, reuelletur sanguis per viam eandem per quam fluebat ab e. 4. per b. 2. versus a. 1. & illa erit propria reuulsio. quæ sanè erit reuulsio suprà infrà, & scilicet influxi, in priori fluentis & fluxuri, quæ definitione reuulsionis cõprehenduntur posita art. 4. pag. 28.

Dissolue Galene pueriles istas nugæ. Lib. 2. *Extrema Stupiditatis est, inquit, si adie-* therap.
ctis illis quatenus & hæcenus, nec qua ip- cap. 7.
si loquuntur intelligunt, Probatur ergo
quod hæc oppositæ cruralis, aut saphenæ
sectio sit fluxuri & fluentis sanguinis re-
uulsio. Primò ex definitione Galeni & re-
uulsionum differentijs per canon. 6. tum
celebriorum medicorum decreto, Ferne-
lij, Fuccij & aliorum quibus crus dex-

trum contrarium est sinistro $\kappa\alpha\tau\acute{\iota}\varsigma\eta\nu$. Oris-
basij Collect. lib. 8. cap. 19. item omnium
Arabum & Græcorum articulo 2. cita-
torum.

Secundò ex concessis, quippe asserit in
sua definitione sanguinem retrahi ad ilia-
carum bifurcationem, (qua confessione
contradicit communioni crurum inter se
à se negatæ) reuulsione propriissima op-
posita sectione, quod verissimum cum sit,
& totus ille sanguinis motus ab vno crure
ad oppositum fiat vno tractu continuò si-
ne interruptione ratione continui & va-
cui, sequitur totum illum tractum esse
reuulsorium donec sanguis foras prorum-
pat, interruptio autem debuit esse ex sup-
posito Gardini per *hactenus & quatenus*;
Motum hunc tractuum reuulsoriū vnum
esse & continuum probat machina hi-
draulica, siue fistula ænea bifurca (quæ
schema Gardini adæquat) qualem descri-
ab. sub. bit Cardanus & notatur figura 4. posita
in fine articuli 5. sit ergo vinum in *c.* vs-
que ad *b.* & *a.* & spiritu ducto ab *a.* traha-
tur primò, oportet vinum quod est ab *a.*
vsque ad *b.* deinde continui ratione seque-
tur continuò & is qui est in *C.* vno eo-
demque motu, vnde qui trahit per *a.* pro-
prijs-

FIGURA PRIMA:

Hæc, venarum totius corporis ad lacunam c. a. notatam, communionem ostendit per originales anastomoses.

Nempe omnium venarum ab utriusque pedis extremitatibus i. i. per iliacos ramos h. h. ad lacunæ fauces inferiores. a.

Similiter & omnium venarum à manuum extremitatibus per varias coitiones in eandem lacunam ad c. fauces superiores unionem.

Ostendit mamillarium ortum d. d. & eandem processum & ad umbilicum fines n. n. ubi epigastricis ramis occurrunt, quo loco occulta anastomoses præstenduntur.

h. h. Intercostales quæ tria aut quatuor ad summum costarum superiorum intervalla nutriunt, licet & aliquando illa ab azygota progenia nutriantur.

b. Azygota ingens ad lacunam paulo supra cor anastomosis & varia eius progenies. p. p. per costarum inferiorum intervalla dispersa, sicut & eorum fines o. o. ubi occulta anastomoses præstenduntur.

f. f. Thoracica exortus.

FIGURA II.

Ut cephalicarum per superiorem subclavia divisionem h. h. communio ad lacunam & rectitudo notatur sic & basilicatum f. f. per inferiorem ad eandem lacunam per h. h.

a. Lacuna ad cor anastomosis.

b. Azygota ad lacunam anastomosis.

c. Lacuna truncus ascendens.

d. d. Mamillares descendentes.

e. e. Intercostales.

f. f. Thoracica.

FIGURA III.

Azygota & venarum cum quibus sociatur delineatio:

a. Azygota anastomosis ad lacunam.

b. Pleuritidis locum adumbrat.

m. m. c. c. Azygota propagines.

d. d. Basilica & thoracica ade. per axillarem r. unionem ostendit & ad lacunæ fauces superiores n. coniungit & sic in sinistra parte. In dextra thoracica notatur k. & locus unionis i. At o. dextra basilica locum scissionis in flexu cubiti h. sinistra ostendit.

f. f. f. l. l. l. Thoracicarum progenies & earum fines ubi *** astericis, quo loco anastomoses occulta præstenduntur o. o. mamillariam exortus p. p. Intercostalium. q. q. subclavia.

FIGURA IV.




Schema est à Gardino confectum, quo lacuna partem inferiorem cum iliacis alucis ruditer adumbrat de qua Quærela 13. pag. 284.

FIGURA V.

Fistula est hydraulica de qua agitur Quærela 13. pag. 286.

II

FIGVRA PRIMA



...RELA X
...C. per b. retraher
...Gardius semper variu
...sestione in pleuritide
...torum: licet in hoc
...Trincauelli, ipse
...tius, propter ratione
...olum allatas, & propo
...sticet sektionen in cont
...tales sektionen reu
...specificas æquioca
...Galeni, Fernelij & alio
...olumina vocat, doc
...aus expresse eam se
...vocat. Oribas
...ssum in manu sic cu
...aribus, inquit, sed ex
...id facere me conspexi
...mutato, & ad alterum
...ad hæc? Scio, inquit
...aliquos (reuera nullos)
...sed cum cōtra sciolos ips
...tio, non ita exacte loqu
...tius Galeno, Oribasio,
...Fernelio, & omni schola
...tu Galene & sciolum
...turyio in contrarium Hipp
...dicitur, quid est ergo au

prijissime à C. per b. retrahere dicetur & reuellere.

Ipsò Gardinus semper varius, oppositæ *Analys* basilicæ sectione in pleuritide ab ictu re- *p. 11. pro-* uellit influxum: licet in hoc casu dire- *pos. 9.* ctam secet Trincauellius, ipso non infe-
rior medicus, propter rationes fortè à me
contra ipsum allatas, & propos. 8. opposi-
tæ cephalicæ sectione in contrarium re-
uellit, licet tales sectiones reuulsorias a-
uersiones específicas æquiuoca voce dicat,
contra Galeni, Fernelij & aliorum, quos *Cap. de* medicinæ columnina vocat, doctrinam: Ip- *pleur.*
se Heurnius expressè eam sectionem ve-
ram reuulsionem vocat. Oribasius Timo- *Collect.*
crati abscessum in manu sic curabat, non *lib. 8. cap.*
solum in manibus, inquit, sed etiam in cru- *10.*
ribus tale quid facere me conspexistis, & flu-
xionem commuto, & ad alterum crus reuello.

Quid ad hæc? Scio, inquit Gardinus, *Antich.* authores aliquos (reuera nullos) non ita pre- *lib. 2. 93.*
cisè loqui, sed cum cōtra sciolos ipsos, ut mihi,
non sit actio, non ita exactè loquuti sunt: at
quid exactius Galeno, Oribasio, Heurnio,
Celso, Fernelio, & omni schola Parisien-
si? doce tu Galene & sciolum & Docto-
rem, Auerſio in contrarium Hippocrati de- *Therap.*
ſignatus dicitur, quid est ergo auerſio ſpe- *lib. 14.*
cifica? *cap. 31.*

cifica? ipsamet reuulsio, nempe cui reuulsionis competit definitio.

Antish.

pag. 93.

Videndum, num gallica argutia plus valeat, scribit ergo: Auertere gallicè significat *destourner*, reuollere verò, *faire re-*

Lib. 6. de

morb. po-

pul. co-

ment.

tourner: dic Galene: *Sed hæc contemnenda exiliaque sunt, ut & cætera quæ de vocibus incolumi rerum veritate disputantur;*

Lib. 1. lib.

cap. 5.

Quemadmodum certè si quis integrum à toto separet is lingua græca est ignarus, sic: qui auersionem specificā ab Hippocratis ἀυσίονασι distinguit, is linguæ græcæ im-

Lib. 1. lib.

cap. 1.

peritum se prodit, nunc quantum ad rem sit adiiciam; Qui alterum docere vult, quæ ipse tenet, huic nominibus propter res uti opus est, quorum usu claritas quasi meta spectanda est, nam qui sic nominare quæque studet, ut qui discit clarissimè intelligat, is optimus praeceptor fuerit, & docendos ad suas scholas prouocare poterit. Sed ad rem.

Confecimus supra ex Hipp. & Galeno ἀυσίονασι καὶ παροχέτευεν utrumque ἀποσφύρι esse, idest abducere, deducere, vertore, retrahere, atque ita hanc vocem à reuulsione & deriuatione æqualiter participari, id latinè & græcè, galenicè verum sit, inquit Gardinus, gallicè non sic est, nam auertere, gallicè significat *destourner*, reuel-

reuel-

reuellere faire retourner, at nec ista quidquam faciunt.

Porro *destourner*, compositum est ex *de* & *tourner*; de *verd* gallicum, àvsi græcorum æmulatur, quod est *contra*, *aduersum*, & ita *destourner* competit omni auersioni, sic dicitur *destourner* à droite, à gauche, *primarium* *verd* significans *tourner*, significat gyrare, sicut *destourner* regyrare, aut degyrare, qui motus propriè cochleæ conuenit, & per translationem significat motus equorum in gyros, aut orbes, gallicè *voltes*, *vireuoltes* qui se font en *destournant* autant que l'on en a tourné. Hispana paraphrasis ad verbum *reuello* magis accedit, nam dicunt *buello*, & *rebuello*, quasi *reuello*: vbi *destourner* est *reuellero*, cœterum *destourner* gallis propriè significat *deriuare*, sic dicunt *faire couler l'eau par l'autre ruisseau, ou conduis saigniant la riuere*, Italus propriè *deriuare* la *acque*, Hispanus similiter, *derinar* *arroje de fuëre*: conformiter græco ὑψημῖνος τὸ ὑδὼρ ἡγεῖν παροχέουσας: Oribasius, *Rinare*, inquit, *Collat. lib. 8. cap. 18.* ὕχτιον est per rinos ducere παροχέον à riuis ad latera,

Ex quibus patere arbitror verbum *destourner* gallicè æquivalere latino *auertere*.

T

& græc

& græco ἀποτρέπειν quod est Galeno ἰπ-
 ραι τρέπειν, siue in directum, siue in con-
 trarium.

Q V E R E L A X I V.

Pag. 77. & 70. orat 4. ait Gardinus.
*Negas ullas ad pleuram accedere arterias, sunt,
 inquam, ad pleuram dispersæ penè omni-
 bus incubis venis tot coninges
 arteriæ.*

Assertum ut probet. Primò negat
 Vesalij tabulas esse bonas & ve-
 ras, & testibus oculis erroris infi-
 mulat.

Secundò, adfert authores qui ipsummet
 conuincunt: primò Riolanum, qui ait:
*Vena & arteria intra costarum spatia appa-
 rent. Sequitur*

*Lib. 8. Galenus: In ipsis intercostalibus muscu-
 adm. a- lis, proximè ad ipsius cuiusque costæ os arte-
 nat. riam comperies.*

*Lib. 9. Laurentius; Vena quas habet pleura pro-
 anat. cap. ueniunt ab azygota, pari arteriarum numero
 3. eas comitante.*

*Anat. lib. Spygelius inter utramque pleuram duo-
 3. cap. 9. decim arterias distribuit.*

*Anat. lib. Realdus Columbus, Inter pleura mem-
 3. cap. 3. branam*

Q U E R E L A X I V . 291

branam duplicem venae arteriaeque, ac nervi praterlabuntur, qui inter omnia costarum intervalla ducuntur. His citationibus asseri putat, quod negavi, arterias pleuram perreptare.

Respondeo primò, Anatomicas tabulas Vesalij quas ipsemet propria manu pinxit, esse veras, & bonas, nec illas se vivente retractavit, teste epistola ad Oporinum Anno 1555. & dico contrà, Gallos omnes ac Germanos, & Anglos Vesalij tabulas imitatos fuisse, & ut suas facerent nullius momenti figmenta addidisse, mendosas reddidisse, quas fortè vidit Gardinus, non genuinas, sicut conqueritur eadem epistola Vesalius.

Secundò. Ad authoritates dico Riolanum contrà sentire, nec dicere arterias pleuram perreptare, *sed intercostarum spatia apparere*, de Galeno postea.

Laurentius loquitur de pleura simul cum mesopleurijs, qualiter de intercostali agit. lib. 4. cap. 10. quam docet *tria, aut quatuor costarum intervalla, & musculos vi-* *Antrop.*
sinos alere, & Laurentius à Riolano etiam *lib. 1. cap.*
parvi æstimatur, cum corpora non disse- *40*
cuisse, credulum fuisse, notat ita ut P. Laurenbergius in sua Apollinis laurea, iactet

se bis mille errores in ipsius Laurentij anatomia ostensurum.

*Antrop.
lib. 1. cap.
4.
Lib. de
mot. mus.
oculi.*

*Riol. an-
trop. lib.
3. cap. 5.*

*Hecurnius
cap. de
pleurit.*

*Lib. 3.
cap. 13.
anatomist.
anat.*

*De loc.
aff. lib. 2.
cap. 4.*

Spygelius non dicit in pleuram, sed inter utramque pleuram, sicut Columbus, id est inter pleurā & periostrum, vel musculorum membranam, quos anatomistas parui facit Riolanus, furti eos accusans: Posteriores Carcanus Fallopij discipulus sic laudat, *Quidquid habet boni & veri Columbus à Vesalio furatus est!* & pleuræ duplicitem falsitatis accusat antropia,

nisi duplicitas sensu Columbi accipiat, ita ut membrana tenuissima quæ musculos intercostales contegit, pro altera pleura accipiat, sicut & periostrum quippe

Galenus ipse per proximè ad cuiusque costæ os, intelligit periostrum, nam & ibi nervi percurrunt, quibus itidem caret pleura, atque ideo, quod scribit Columbus, *in mesopleurijs sæpè fit pleuritis, non in ptenra*, qua sæpissimè afficeretur, si per eam arteriæ excurrerent, quæ à minima disten-

tione & parva mole gravissimè dolere potest. Hinc Galenus; *Arteria*, inquit, *maximè in musculis disperguntur, ideo nervosis partibus & membranis vix natura constituit arterias. Quinetiam membranas non pulsare, ut quibus partibus insunt arteria consentaneum est.*

Huic

Huic doctrinae conformiter Heurnius. *Cap. de*
Non est, inquit, in exquisita pleuritide do- *pleur.*
lor lateris pulsans, quia in hac membrana non
sunt arteria, sed subter illam excurrunt: Idem *Pract.*
est Altomari iudicium & Mathei Curtij, *cap. 5.*
In pleura non sunt arteria. Auicenna f. *In Mund.*
x. tract. 4. cap. 2. In ea, inquit, quae pura *anat. cap.*
est pleuritis, non est pulsatio, quoniam mem-
brum priuatum est multitudine arteriarum.
Ioubertus musculorum, inquit, intercosta- *Lib. de*
lium phlegmone vehementiorem causat dolo- *thor. aff.*
rem, ut voluit Rhasis, precipue quod pulsa- *cap. 8.*
torio maxime sit obnoxia, arteriarum nomine,
quibus membrana costas succingens destitui-
tur. Huic opinioni fauet etiam Vesalius, *Lib. 3.*
litem dirimat Galenus, is lib. 2. de loc. aff. *Fab. hñ.*
cap. 3. *cap. 12.*

Arteriae, inquit, sunt per intercostalia
vocata spatia & per crassas, laxasque laterum
partes extenduntur, ac in profundo magis de-
litescunt, ut succingentem costas pleuram
haudquaquam attingant & *lib. de venar.*
dissect. cap. 9. Quae thoracem alit vena hanc
videre est per spinam sine arteria descendere.
Iudicet hic lector an supina anatomiae ige-
norantia (quod ait Gardinus) scripserim
primariam pleuritidem non fieri per arte-
rias, quod pleura nullae percurreret arteriae.

Impactum in phlegmone sanguinem & in eo collectum synatrismum vena sectione retrocedere in venas negat Ober-tus, & vitij arguit derivationis definitionem, contra contendit Gardinus, collectum in phlegmone, aut impactum vena sectione vacuari posse & retrocedere. Antich. pag. 93. & propos. 2. & passim dum putrem ex parte humorē euacuat, reuellit, retrahit, derivat.

Gardini opinionem tutari videtur Clarissimus D. Remygius & Collegæ suo fauere, thesi defensa à M. Ioanne Doulcet Insulensi Anno 1633. Septembris 3. docens. *In validarum phlegmonum initio impactus humor sanguinis fluxū facile sequetur.*

At ego cum Galeno & celebrioribus medicis dico fluxilem duntaxat sanguinem posse vacuari. Sic Ioubertus, Fernellius, Sennertus & alij Derivationem sanguinis fluxilis euacuationem non impacti

Thesi excusa. Autum indicans vena sectionis, statuit vitium vehementis sanguinis fluxilis.

defendēta Doctrinæ nostræ fundamentum datur soli dissimum artis med. cap. 95. Postquam enim incipientis phlegmonis in oculo co-

mitan-

mitante plethora curam docuit Gal. esse humoris ex parte euacuationem, atque ob plethoram totius, prius quod superfluum erat ad contraria loca reuellendum suasisit, postea quod reliquum erat extremis venis contentum & in spatijs inani- bus effusum, vacuandum esse, tum discussivis, tum digerentibus, *et si*, inquit, *hac via superfluum omne retrocesserit bene se res habet: At si fuerit aliquid in parte retentum, coniecturandum erit id lentum ac crassum existere* (fluxili nempe humore, vel reperiussio, vel digesto) atque ea ratione coactum, atque adstrictum, ut cum difficultate solui possit, in quo casu ad id veniendum est, ut per patientem locum euacuemus, quod scarificationibus, & digerentibus fieri docet, nam & ante Hippocra- tes docuerat ἐπὶ ζῶντα ἀντιστῆναι ἀντιστῆναι τοῖς ἐπὶ τῷ αἵματι, fluxilem scilicet reuellendo euacuare, renitenti & impacto cedere oportet, quia inquit, Galenus, nil ab eo remitti- tur sed fortiter impactus renitet, unde Iou- bertus & Guastauinius impacto sanguini scarificationem præscribunt: Crassiorem enim effectum sanguinem & impactum, inquit Sennertus, in venas refluere posse non assero, siue in extremis capillaribus sit, siue

Gal. art. Med. cap. 94.

Epid. 6, sect. 8.

De C. R. per V. Sott cap. 12.

Cap. 20.

de Repul.

extrauenatus.

Enimuerò, si in capillaribus extremitatibus venarum sanguis collectus lentus ac crassior effectus, atque ideo à natura alienus retrocedere non possit, extrauenatus certè vt exul & abdicatus, & per vacua, atque inania loca peregrinus, nullo modo in venas remeare potis est, & rectè

Cement. hic Sanctorius: *Valdè decipitur*, inquit, *Argument.* *gentius qui putat sanguinem extrauenatum posse iterum in venas resumì, quia sanguis extrauenatus statim naturam propriam amittit, quoniam vel in pus vertitur, aut putrescit, præterea sanguine extrauenato statim venarum ostiola considunt, vt nil sanguinis ingredi possit, & nunquam aperiuntur, nisi dum sanguis egreditur, attractus, aut expulsus.* Quod & nos etiam ex Galeni doctrina probauimus articulo 6. vbi pus à venarum apicibus attrahi posse negauimus, quod amicum sanguinem à medio-matrice lacuna trahere, succos verò excommunicatos vt inimicos repellere, didicerunt.

Sed contra hanc doctrinam sequentia obijci possunt, nempe quod sanguis à minoribus venis in maiores refluere potest, ergo & qui ex capillaribus in vacua spacia

tia propinqua recens effusus est, repellentibus per easdē capillares refluere poterit, & cum sāguinis motum sequi impossibile non videbitur ei, qui in corpore viuentē miram illam *ἐνρροίαν*, & humorum ex vna parte in aliam confluxum & *μετάσασιν* in angina, pleuritide, & alijs inflammationibus perpenderit: Quod si dicamus illos dūtātaxat humores, qui in venis minoribus sunt, refluere in maiores, reliquos verò qui iam venis exciderunt, insensibiliter discuti debere: Ad id certē spatium temporis sufficiens requireretur, vt in sugillatis & sanguine sub cutem effuso sēpē satis longum tempus ad *ἐκχυμώσεως* discussionē requiri videmus.

At verò cum videamus sēpē quasi in momento non solum variolas & morbillos & alia exanthemata & tubercula minora, sed & bubones euanescere, illa extravenatorum humorum retrocessionem persuadere possunt.

Ad quæ: Concedimus sanguinem à minoribus venis ad maiores repellentibus retrocedere posse, quamdiu is fluxilis fuerit & sanguifluarum venarum societate fruetur: Enimuerò in phlegmonis capillaribus impactum, retrocedere non posse

posse iam cum Galeno diximus, eumque vel diaphoreticis insensibiliter, vel scarificationibus sensibiliter euacuandū: multo verò minus is retrocesserit, qui in propinqua spatia quantumuis recens effluerit, nam præter ante allatas rationes, si verum est quod contra Erasistratum docet Galenus, arteriæ, quæ ad inflammata[m] partem pertingunt & ad intercostalia loca perueniunt, qua pollent diastole, extrauenatum pus, icores, aut sanguinem trahere non possunt, quod articulo 6. probatum est, multo minus venæ quæ motu illo carent.

Sanguis igitur quamprimum à venis excommunicatus est, ilicò acescit spiritu regente priuatus, hinc coaguletur, & impactus fiat necesse est, & continuò humorum à natura non rectorum proprio dissidio ad putredinem tendentium, fit humor alienus, quem natura abhorrens vt peregrinum, totis viribus à se depellit, nec sanguis amplius dici potest, sed saniei quid simile aut puri, qui in abscessibus partim coagulatus partim semiputris cernitur.

Neque propterea si is in venas refluxerit cōgeneum, aut vitalem quem amisit spiritum denuò receperit, quod nouam sanguinis transubstātionem per consueta sanguifi-

guificationis instrumenta pati necesse haberet, qualiter fortè in macrocosmo aquæ peregrinæ non ante ad montes terræ vbera in fontes perennes refluunt, & vitales fiunt, antequam emenso suo fato, deposita in hoc visibili mari peregrina immunditia, ad interni maris beatum perueniant elementum, vbi spiritibus vitalibus denudò imprægnatæ resuscitantur, ad nouam peregrinationem in bonum vniuersi sufficienter instructæ.

Exulibus igitur succis & excommunicatis emundatoria destinauit natura, tum & loca patentia, laxa & inania, simulque ignobilia, quemadmodum ventriculo intestina, hepatis cistim & inguina, lacunæ renes & vesicam, portæ lien, cordi axillas, cerebro ventriculos & partes circa collum, solidis partibus spatia inania & poros.

Quod ad *ἐκπρωται* illam Hippocratis cui totum corpus conspirat & confluit: Dicimus succos qui de loco in locum permeant, communicantes esse vt qui venis sanguifluis continentur nondum excommunicati: at abdicati, quoniam per spiritus motorios & vitales non reguntur quorum est humores quoquouersum eiere, decli-

Gal. nat. fac. 3. cap. 13. decliuiora loca proprio pondere semper petunt & ignobiliora, à potentioribus & nobilioribus partibus depulsi, & si quando, vt in arthriticis sæpè contingit, humor pedem inuadat, mox manum, id nouæ fluxioni referendum est; Dato ergo,

Hipp. de purg. humor. Quod pleuritis ab angina fiat & vicissim hæc ab illa, reuera ista non fient sanguinis in partem affectam abdicati & in parte affecta impacti retrocessione & conuersione, sed noua fluxione ex eodem fonte prorumente, vel si à parte affecta fiat conuersio, vt fieri potest, qui conuertetur sanguis is non erit impactus, sed is qui venis communibus contentus fluxilis, partes affecto loco vicinas vrgebat.

Dico 2. *ξύρροισιν* illam nil concludere aliud in variolis quam spirituum perspirationem, *ἀπορρόισιν ἀπορροίαν πνευματώδη* vel vt Alexandro Aph. lib. 2. prob. 42. *λοιμὴν καὶ σήπτην ἀπόρροισιν*, nempe variolarum exanthemata à spiritibus esse & eleuari citra materię sanguineę copiam; facile probatur exemplo quod in bullis cernere est à fermento aut sapone, quæ subita euaporatione subsidunt, non quod in materiam siue corpus à quo prodeunt spiritus remeant, sed quod dissoluti pereant,

Q V E R E L A X V. 301

reant, sicut in morbillis, quæ spirituum est
natura & flatuum pestilentium, *Galeno*
lib. 1. de diff. Feb. μίανμα λιμῶδες καὶ σήπι-
δινῶδες, qui tinguntur coloribus substan-
tiarum à quibus prodeunt, & potentibus
donantur atque excellentibus virtutibus,
sic rubra à sanguine, flaua à bile, nigra à
melancholia esse dicuntur, τὸ μὲν χρῶμα-
τῶν χυμῶν ὁμοίᾳ ἀνθίων.

Hipp. de
pur. hum.

Insuper & citra ullius materiæ cor-
poreæ affluxum solo venenato animalium
spiritu, caro læsa in tumorem attollitur ci-
tissimè, & adhibito alexicaco etiam ce-
lerrimè subsidit, spiritu virulento discussio,
nulla relicta nota: Sic etiam ex contusio-
ne ortus in fronte tumor, discussio repen-
tè soluitur nullo relicto vestigio.

Cum igitur variolæ iam apparentes,
quas *Auicenna* & *Arabes* alices vocant,
occurso aëris frigidioris euanescent, illis
solūmodo incipiētibus, id accidere posse
certum est, dum corporeā materia non-
dum venis excessit, sed spiritus tantum,
qui cutem tingere & in tumorem eleuare
potis est: Neque enim quisquam vidit va-
riolas iam formatas cum collectione &
humore impacto & extravasato retroces-
sisse ita ut nulla restarent vestigia. Enim-

uerd

Nat. fac.
3. cap. 13.

uerò et si Galenus doceat non spiritus mor-
dò & excrementum, sed etiam nutrimen-
tum ab vltima corporis parte eo, vnde ve-
nerat, rursus posse deferri, id de contentis
in venis succis, & potentia alimentis, quæ
adhuc à natura reguntur & cum toto cõ-
municant, intelligendum est.

At dices; Moriuntur ferè quibus id con-
tingit, ergo signum est materiam morbi-
ficam retrocessisse.

Dico nequaquam, sed arguit non suffi-
cienter propulsatam intus latentem, ægrum
iugulasse, quod accidit in omni ferè crisi
imperfecta in morbis deleterijs & pestife-
ris, è quorum numero sunt variolæ, quip-
pè veneni pestilentis potentia in spiritu
maximè viget, qui si foras omninò non
protruditur, quod eius intra remanet, re-
liquos spiritus & humores deleteria labe
ita inficit, vt cordis facultate subitò deui-
cta, ad extremas partes & destinata emun-
ctoria venenum amplius depellere nō pos-
sit, & sic incipientes tumores subsidunt,
& spiritus venenati simul cum bonis il-
corde in auxilium reuocati in omnes cor-
poris partes, easque nobiliores & impoten-
tes, quas perpetuò aggrediuntur, debac-
chantur; spiritus sanè retrocedere posse
facile

Q U E R E L A X V. 302

facile concedimus, quod his non sicut corpulentiori substantiæ, patentes viæ ad refluxum requirantur, & ab arterijs docente Galeno facile assumantur.

Non ergo variolæ repente subsidentes impacti & abdicati humoris in venas, à quibus exciderunt, retrogressionē concludunt. Fatemur tamen exilibus venis contentum sanguinem, & partem affectam circumfluitantem venæ sectione retrahi & euacuari posse, quod puto voluisse D.

Remygium in phlegmonis validi initio fieri posse: & credo illum per impactum ut

Thesi excusa anno 1635.

Galenī verbis utar conculcatum intelligere, qui fluxilis adhuc est, nam & docet,

Mart. 24. defend.

quod *vena sectio tantum vacuat humorem antecedentem qui in venis est, non coniunctum*, impactum aut abdicatum, quem vel

Martino de Lānoy Iprensis

scarificationibus vel dispergētibus & diaphoreticis vacuandum docet Galenus.

Querelas omnes Doctissimi L. Durētī

iudicio concludam, *Reuulsio est humoris,*

Comentā in lib.

quo non expedit, ad loca & per loca lege natura

Hipp. de

sura incommoda fluentis in contrarium auer-

hum. pura gād. n. 11.

sio. Reuellimus autem vel ex inferioribus ad

superiora, & contrā, vel à dextris ad sinist-

ras, & contrā.

QVÆ

QVÆSTIO MEDICA.

An in Variolarum curatione vena sectio conueniat.

Variolarum curatio vt & aliorum morborum, triplici medio perficitur, Chyrurgia, Pharmacia, Dieta, postremis vires ægri conseruare, & putridæ, venenatæque materiei resistere, & concoctionem eius promouere, atque eandem concoctam alexiterijs ad corporis ambitum propellere intendimus: Vnde pluribus medicis consultum videtur, spre-
tis chyrurgicis & purgantibus remedijs, in solis alexiterijs ægri salutem consistere. Attamen quia variolarum materia, vel qualitate sola naturam stimulat, vel simul copia grauat, & quod sæpè accidit comitantur obstructions & primæ regionis colluies, quæ alexiteriorum ministeria impediunt, manifestum fit, medicum & obstructions soluere, & colluuiem illam laxante pharmaco, aut leniente eluere, oportere, & cum magnus sit morbus, acutus & præceps, magno remedio indigere, qualis vena sectio ab Hippo-

crato

crate & Galeno statuitur.

At verò error popularis ita inualuit, ut si quis medicus in variolis venam secuerit, ægrum iugulasse credatur, & temerarij ne dicam nefarij nomine proclametur, qua consideratione nonnulli medici, dum nimis honori suo consulunt, sibi cōmissos ægros in sanguine (cum clinicorum & mulierouularum assensu, quarum gratiam & linguas aucupantur ad famam) suffocari malunt, quam debito remedij genere, dubiam curam tentare, *Extremis morbis Hipp. aph. extrema remedia opposcentes: Ne quem, quod 6. lib. 1. ait Cellus, non seruauerint perdidisse credantur.*

Siquidem horum alij inueteratâ hæresi contumaces errori insistant, ne non ante sapuisse videantur. Alij ignorantia supinâ segnes & otiosi, satis habent si quod à præceptoribus didicerunt, continuò id verum esse sibi persuadeant, ita ut ne vel latum vnguem ab ea doctrina recedant, atque eo sopore graues, aliter practantium rationes fastuosè eludunt, nec doctorum libris inuigilantes ab errore se remocant, sed ut occæcati asini, molæ rotam vertentes eisdem passus semper calcant, & in æternum errant.

V

Ego

Ego verò etsi famæ meæ non minus
quam cæteri consulere debeam & velim,

*Persius in
Sat. 1.*

neque enim mihi cornea fibra est

Laudari ut metuam,

tamen spretis clinicorum & muliercularum linguis, in variolis sæpè occasione datâ fœliciter venam secui, nonnunquam & lenientibus pharmacis ventrem subduxi, propter solidissimas rationes, quas qui venæ sectionem infamant, per socordiam non satis examinasse, vel non intellexisse, vel, si vtrumque præstiterint, in agendo parum solertes fuisse, & plus suis oculis, quam ægri salutis consuluisse necesse est.

Pernitiosum itaque errorem in hac civitate, & Morino tractu popularem iam factum, qui non solum è vulgo plurimos, sed etiam optimates & nobiles suffocavit, dum compendiosè refutare aggredior, multa consultò præterire habeo, quæ medicum agentem nosse cōfido, hæc quippe ὁστέρκτοι τέκτων, neque enim de variolarum causis agam, sitne novus morbus, an non, nec de eius differentiis, & materia ex quâ, ut quid à morbillis differat, neque de pharmacis ad earum curam pertinentibus, nisi quantum opus fuerit ad demonstrandum in illarum curatione venæ
sectio-

QVÆSTIO MEDICA: 307

sectionem tutò administrari: Atque ut ab earum definitione occipiam,

Variolæ sunt efflorescentiæ aut pustulæ rotundæ, pruriginosæ, varij coloris, febre synochâ putri comitatæ, vi expultricis naturæ ad cutaneam regionem propulsæ: Cû verò adeo notæ sint vel cuilibet è plebe, illud medicis in hac curatione maximè dubium videtur, an venæ sectio, & purgatio tutò adhibeatur; Quod ut breviter demonstremus quatuor hîc præmittimus hypotheses. Itaque

Supponendum primò, materiam ex qua variolæ fiunt esse sâguinis massam (prout quatuor humores comprehêdit) cum propriâ & particulari ebullitione atque putredine in maioribus venis, siue sanguinis menstrui malitia, siue cœli contagium, siue esculentorum potulentorumque vitium hanc suscitavit, siue horum aliqua, aut omnia simul.

Supponendum 2. In variolis, sicut in alijs morbis humoralibus, dari materiam proximam & coniunctam, sicut antecedentem & remotam, illam extremas venas & capillares occupare, hanc in lacuna & venis communibus circa principes partes ebullire.

308 QVÆSTIO MEDICA

Aulcon. nat. lib. 4. f. 1. trac. 4. cap. 6. Supponendum 3. Cum variolæ per modum *ἡρίων* fiant, illas febrem synocham putrem antecedere & comitari, quod enim secernitur euictæ materiæ putridæ pars est, à centro vi expultrice ad cutem propulsæ.

Supponendum 4. quod variolarum materia ex qua, tanta sæpè copia simul putrescit, quod licet vniuersi corporis cutis ijs defœdetur, & vniuersali phlegmone afficiatur, tamen maior pars in maioribus venis remanet & principes partes etiam afficit, quod tantæ moli propulsandæ impar sit natura; quod & docuit Auicenna, in quibusdam enim, quorum corpora à morte dissecuimus, obseruatum est asperam arteriam, pulmonem, iecur, lienem, intestina, vterum ea labe scatere, vnde & in vtero fœtum ante matrem variolis extinguui notauimus.

Lib. 4. fen. 1. trac. 4. cap. 6. Vnum est quod contra has hypotheses obijci potest, variolas etiam citra febrem fieri, quoniam Auicenna affirmat variolas esse ante febrem, aut illi succedere, & melius esse vt febrem antecedant, quam subsequantur: quod etiam docet Mesues, quandoque cum synocha putri, quandoque ebullitionem sine putredine esse, in quâ grossum & subtile quod est in sanguine, sine

QVÆSTIO MEDICA. 309

sive à menstruis sit, sive à malis nutrientibus, prouocatum, sequestratur à puro eius, quemadmodum videre est in vinis nouis ebullientibus ex propria caliditate & maxime exteriori reseruata in eis, in quibus fex & spuma sequestratur ab eis ut superflua, illis remanentibus depuratis, eodem prorsus exemplo Lib. 4. f. tract. 4. cap. 6.
Auicennæ vsus.

Nos tamen cum Auenzoare & Rhafi variolas perpetuè febrem antecedere, & comitari dicimus, modò mitiorem, modò ferociorem ad materiæ ebullientis proportionem & qualitatem, quippe cum variolæ ex hypothesi 3. per modum *xpiotus* fiant, continuè intelligimus ebullitionem in venis maioribus, quæ citra febrem fieri nequit, & putridæ materiæ partem iam à naturâ victrice secerni, neque enim non corruptum natura separat, neque hæc fiunt à materiæ putrescentis & ebullientis calore proprio vt in musto, nam docente Aristotele 4. meteor, & tuberculorū & pituitæ & talium maturatio à naturali calido fit, sicut & secretio: & licet pueri, & iuniores, qui vt plurimum validius exercentur & sunt animosiores, variolis capiantur, nec febricitare videantur, tamen febrem ad materiæ putrescentis proportionem ad-
V 3
fuisse

310 QVÆSTIO MEDICA.

fuisse necesse est, aliquando ita mitem, ut de eâ non conquerantur, donec variolis erumpentibus, superueniente symptomaticâ febre ex cutis inflammatione, tensione & suppuratione, ægrotare se dicunt.

Vnde conficitur, non perpetuò verum esse quod scribit Auicenna: Quippe contra signum bonæ iudicationis est, si præcedente eas febre natura earum materiam secernat, & febris mitescat, hinc docet Hippocrates, *A bubone febres omnes mala exceptâ ephemerâ*, quod & in omnibus pestilentibus tumoribus verum est, è quorum numero sunt variolæ. Si igitur post variolarum apparitionem febris subsequatur, & symptomatibus grauioribus excelsat, id est augeatur, impotentis naturæ & imperfectæ crisis signum erit, erunt enim

Hipp. ap. προκρινόμενα ὄμως, & verò τὰ κρίσιμα μὴ κρίσιμα, si cum funestis symptomatibus partium, vnde manant & quo feruntur scilicet interiorum & nobiliorum, coniuncta fuerint τὰ μὲν θανατώδεια, si verò citra lethalia illa symptomata humoris morbifici pars intrò remaneat, erunt εὐκρίσιμα, eruntque sic lethales variolæ, aut difficilis iudi-

Hipp. aph cii, cōtrâ verò κρίσιμα κεκριμένα ἀρτίως si cum illarum eruptione febris mitescat. Con-

stans:

QUESTIO MEDICA. 311

Stans igitur sic hypothesis variolas semper febrim synocham comitari.

His sic dispositis. Dico venæ sectionem variolis incipientibus tutissimè & necessariò aliquando administrari, seruatis à perito & solerte medico seruandis. Ita sentiunt omnes Arabes, qui etsi quartum inclusiuè diem præfixerint, tamen cum eiusdem speciei morbi celeriores sint motus & urgentiora symptomata, securius Galeni videtur consilium, *neque enim inter morbi initia aliquod remedium eiusmodi eniungere oportet, desumpto à numero dierum scope, quarto scilicet, sed quod censuit Hippocrates ocysus est exequendum, nam vel statim ab initio priusquam in partem aliquam cōfirmantur humores scilicet nobilem, medicandū.* Arabes sequuntur Gordonius in lib. 12. cap. de variol. Tornamira tract. de feb. cap. 27. Guarnerius tract. de peste cap. 6. Albert. Anglicus lib. 7. th. cap. de variol.

Primò, ratione plethoræ cacochymicæ, huius morbi materia, tum ratione febris, sic nos edocente cum omnibus Arabibus Galeno. *Saluberrimum est in febribus venam incidere, non continentibus modò, verum etiā alijs omnibus quas putrescens humor cōcitat, ubi præsertim vires & ætas non impediunt.*

Coment.
in 4. de
rat. viā.
in acut.

Aph. 20.
sect. 2.

Auicēnas
lib. 4. f. 1.
tract. 4.

cap. 6.
Mesues
summa 2.

part. 1.
sect. 2.
cap. 6.

312 QVÆSTIO MEDICA.

therap
c. 15. *Leuata namque, quæ corpus nostrum regit, natura exonerataque eo quo velut onere premitur, facile quod reliquum est euincet, atque officij sui non oblita concoquet quodcumque est habile, & excernet quodcumque externi natum est; ut igitur hæc citius eueniant (ecce quomodo crifim acceleret venæ sectio, non remoretur) melius est circa principia euacuare, quo minorem factam materiam facilius natura possit concoquere.*

uicinas
4. fen.
tract. 4.
6. Venæ sectio igitur ex Galeni mente in variolarum principio rectè administrabitur, dum lassitudinem spontaneam inducunt & grauant, materia in lacunâ & maioribus venis adhuc stagnante, quæ eo loco agitari iudicatur dolore dorsii è longitudinæ spinæ, & iacendi in dorsum procliuitate,

h.
le Quippe nisi vacuetur eius pars, quæ operi subleuando satis sit, natura oppressa multitudine impar erit, nec crifim adæquatam assequetur: remanente igitur parte materiæ, cordi angustia cum lethali sincope accidet & suffocatio, vel si potens fuerit à se ad ignobiliore partes propellere, quoniâ & multitudine & ferocia valet, non solum cutaneas partes, vnde salus speranda videbitur, occupabit, sed etiam in-

ternas

ternas nobiliores adoriatur, & phlegmone lethali expugnabit, ex hypothesi 4.

In cerebrum namque irruens, fulgoribus, lachrymis, tinnitibus, capitis dolore se prodet, hinc tremores, timores, stuporem, deliria, motus convulsorios excitabit. Si œsophagum occuparit; difficilem deglutionem & anginam lethalem inferet; si pulmonem tussim, dispnoeam, pectoris angustiam, peripneumoniam: Vidi-
mus nuper cui in diaphragma per phreneticas elisa materia, intolerabilẽ cum sum-
mis doloribus respirandi difficultatẽ cum-
que delirio mortẽ attulit; At verò si hepar, aut lienem phlegmone infestarit; natura-
lem œconomiam peruertet, lepram aut le-
præ proximam intemperiem relictura, ad
renes propulsa cruentas vrinas ciet vt in
peste lethali, intestina verò deleteria, dis-
senteria afficiet, τὰ ὅλα πάντα omnia, si
autem hæc euaserint συνέπειæ hæc conse-
quentur aurium sonitus, surditates, lippit-
tudines, caligines, albugines, cæcitates,
foeda in naribus vlcera, tussis molestæ,
foedæ excreationes, quin & membrorum
stupores, resolutiones.

*Albert.
Angl. libo
7. cap. de
variis.*

Tot igitur tantisque malis, cur exone-
rata parte materiæ venæ sectione non oc-

curra-

314 QVÆSTIO MEDICA

Quicquid curramus? cum & hanc febrim comitetur
lib. 4. f. 1. synocha, cui omnes medici venæ sectio-
cap. 4. nem præscribunt, tum & angina & perip-
cap. 6. neumonia, ex qua vt plurimum intereunt.

Sed quæ in contrarium adferantur, au-
 diamus.

Obijcitur primò, Cacochymix tollen-
 dæ, quæ in variolis est materia, debetur
 purgatio, non venæ sectio.

Ther. 2. Respondeo primò frequenter hic adesse
cap. 4. plethoram, *in omni autem impura plenitu-*
dine, inquit Fernelius, *à vena sectione aus-*
picanda est vacuatio.

Respondeo secundò, quod etsi caco-
 chymix tollendæ debeat purgatio, ta-
 men quia in morbi principio, omnia sunt
 cruda, nec naturæ & pharmaco obse-
 quentia, purgatio omninò interdicitur
Aph. 22. per aphor. *concocta medicari & cruda non*
lib. 1. *mouere nisi turgeant,* potiori tamen ratione
 in variolis, quoniâ materia morbifica quæ
 proprio & peculiari motu à centro ad
 peripheriâ moueri nata est salubriter, per
 ventrem nisi lethali dissenteriâ euacuari
 solet, atque ideo ad venæ sectionem re-
 currimus, quæ his malis non est obnoxia,
Aph. 8. nec materiæ concoctionem expectare te-
6. 4. netur, quoniam turgentia commodè eua-
 cuat,

QVÆSTIO MEDICA. 315

cuat, nec naturæ motum periculosum, si-
cut purgatio, molitur, nec igneam quali-
tatem humoribus, qualiter cathartica, in-
uehit, sed æstum potius mitigare potis est.

Dicunt 2. variolæ ex hypothefi. 3. sunt
materiæ corruptæ pars, per modum *χρίσως*
vi naturæ à centro ad peripheriam pro-
pulsæ à nobilibus ad ignobiles, cauere igitur
medicum oportet, ne naturam in lau-
dabili opere interturbet, per aphor. *Ea Aph. 191*
quæ indicantur & quæ indicata sunt perfecte *sect. 4*
non mouere, neque nouum facere, neque pur-
gantibus, neque alijs irritamentis uti, sed fi-
nere. multo minus contrarios motus mo-
liri, quippe idem Hippocrates prohibet *μη De purg.*
τὰ ἐκκεχυµένα εἰς τὸ εἶναι ἀπολαµβάνειν, quæ *bū. aph.*
diffusa sunt, non sunt intrò reuocanda, *120*
quod maximè in variolis congruit.

Respondeo 1. verum esse variolas per
modum *χρίσως* fieri, sed non semper perfe-
ctè, maximè in principio, neque enim sūt
semper *περιμένα ἀρίως* vt habet aph. multò
minùs *ἐκκεχυµένα* quæ inquit Duret. sig- *In com. 10*
nificant humorem extrauenatum, ete-
nim ex hypothefi 4. statutum est variolas
non duntaxat cutaceum esse morbum, sed
sæpe maiorem & ferociorem materiæ par-
tem internas & nobiliores partes vrgere,
quoniam

316 QVÆSTIO MEDICA.

quoniam tantæ materiæ simul edomandæ impar est natura, cùm itaque variolæ hac consideratione sint per modum χειρίας imperfectæ, aphorismus contra venæ sectionē nihil concludit, quæ concoctiones nec expectat, nec impedit inceptas, sed illas promouet docente Galeno loco suprâ citato.

In hoc igitur morbo duplex occurrit cōsideranda materia, vna edomita ἐκκεχυµε-

Aph. 10.
sect. 1.

μένη ἐς τὰ ἔξω & per alium aphor. κεραιμένη ἀρτίως, partibus cutaceis & venis capillari-

Duret. in
cōment.
& Gal.
de morb.
p.

bus infixa, & impacta, vel etiâ extravenata nam id significat vox ἐκχύµωσις per γ. apud Hippocratem, & illa quæ in venis maioribus & circa partes principes adhuc æstuat indomita ἐς τὰ ἔσω.

In cōmēt.

De prima, inquit Duretus, Hippocrates dixit ἐκκεχυµωμένα non sunt intrò reuocanda, medicamento scilicet vomitorio vel deiectorio: de altera non item, docente Galeno, statim ab initio priusquam in partem aliquam confirmantur, humores vacuandos esse. Cum morbi inchoant si

q. de rat.
vict. in
acus.

quid mouendum videtur, moue: excipit πλη-

Aphorif.
29. sect. 2.
Hipp. de
purg. hū.
aph. 12.

ων οἱ πιπασμοὶ ἐκ τῶν χροῦων exceptis ijs humoribus, quorum concoctio in tempore expectatur & speratur edomanda, qualis

erit relicta à venæ sectione variolarum materia,

QUESTIO MEDICA. 317

teria, nam tardare in ijs nocuum est per aph.
10. sect. 4. idedque tantum materiz ve-
nz sectione vacuandum est, quantum o-
pus sit vt natura quod reliquū est facile se-
cernere possit, & quia purgatione nō licet,
nam & cathartica hic non quā expedit
nec qualia conferūt vacuare possunt, cru-
da nimirum sunt, neque per loca confe-
rentia, quia talia dum spontē fluunt hac
via lethalem dissenteriam inferunt. per
aphor. 2. sect. 4. & 21. sect. primæ.

Ergo quæ edomita sunt per loca con-
ferentia educenda sunt quod maximè na-
tura vergit, & quā utiliter cōcocta spon-
tē euacuare solet. Quæ verò indomita &
indiscreta sunt, & quorum concoctiones
non ita possunt tempestiuè ex τῶν χροίων
fieri ad salutem, nec expectari, imò peri-
culum est ne in principem partem irruāt,
educenda sanē hæc sunt & vacuanda an-
te concoctionem, non per loca quibus hæc
concocta vacuare solet natura, sed per lo-
ca quibus salubriter ea cruda & turgen-
tia sæpē euacuare sponte visa est.

Quod videtur declarare Duret. inquit *in com.*
Cum humorum pepasmi expertium vis effera *lib. Hippo.*
purgandi celeritatem vel incunte morbo re- *de purg.*
quiras, ē corporibus nostris ducendi sunt per *humor.*
loca

318 QVÆSTIO MEDICA.

loca conferentia, reuellendo, deriuando, coe-
fundendo, artificio medici ad naturæ imita-
tionem comparato, quod & cunctando putref-
cant, & in suæ putredinis contagionem par-
tium naturam trahant, omnemque humani
corporis æconomiam labefaciunt, ac sympto-
matum grauissimorum ab inflammatione &
venenatâ qualitate & translatione morbificâ
metum inferunt.

Cùm igitur in variolis propter dictas
rationes, cruda materia non possit in
principio catharticis vacuari, & conco-
cta nisi per conferentia loca ad periph-
riam ducenda sint:

Nos quæ in principio incocta vacuan-
da sunt, venæ sectione tutò vacuamus, &
aphorismis satisfacimus, quoniam eos
succos qui principibus partibus ruinam
minantur vt turgentia & quæ non satis
tempestiuè concoctionem admittent, &
quantitate ac malignitate naturæ insul-
tant & circumcircà vagantur, quò duc-
re expedit, & qualia conferunt per loca
conferentia quantum fieri potest in prin-
cipio salubriter reuellendo & confun-
dendo vacuamus.

Quippe si natura in variolarum prin-
cipijs cum materiâ indomitâ turget &
urget

QVÆSTIO MEDICA. 319

urget narium hæmorrhagia eam salubriter vacuat, & materiæ peccantis parte se liberat, neque inde sequantur ἀπρίσται, cur venæ sectione eam materiam coëffundendo, & à principibus partibus reuellendo naturam imitantes nō subleuemus? Equidem epidemiorum historijs & quotidianâ experientiâ nos tuemur. In Metone hæmorrhagia die quinto sine coctionis signis morbum soluit, cum quarto cœpisset fluere. In Pericle, cui ex sinistra nare sanguis primâ die multus profluxit. Idem contigit in virgine Larissâ, quæ sexto die (qui, inquit Galenus, nunquam fideliter iudicat) largæ hæmorrhagiæ à febre liberata est, & in tantum effecit, ut parte oneris per nares vacuatâ menses illi fluxerint.

Ratum igitur sit, posse medicum tutò variolis incipientibus à cubitu flexo sanguinem fundere, ut à principibus partibus potentiùs & celerius (quod præcipit Galenus) reuellat, nisi fortè menses, aut hæmorrhoides suppressæ, saphenæ sectionem suaderent.

Porro cum transactis aliquot diebus erunt copiosæ in corporis ambitu variolæ, tunc reuera in opere natura turbanda non

est, nisi, inquit Mesues, repletionis signa

Primo opus
comēs. 30
egro. 7.
Epid. 30
comēs. 30
egro. 6.
comēs. 30
Epid. 30
egro. 10

Coment.
in 2. de
reg. acut.

Summa
2. part. 1.
sec. 25. 69

magna

magna perdurent, dico ego nisi grauissima
 etiam symptomata eam prudenti medico
 Aph. 16, suaserint: *extremis morbis extrema reme-*
 Lib. 1. *dia apponenti: Et licet Galenus suadeat in*
morbis exitialibus, nil vlllo tempore mouen-
dum, & deploratos medicum attingere non
 In semit. *oportere, ne qua multis profuere remedia in-*
 Aph. 19. *famentur, tamen præmissa prognosi de*
 Lib. 2. *euentu & periculo, Celsi consilium Chri-*
stianus medicus melius sequetur, docen-
tis, præstare remedijs dubiam curam ten-
 Aph. 19. *tare, quam nil agendo ægrum certæ morti*
 Lib. 2. *relinquere, memores aphorismi Morborum*
acutorum nō omninò certæ sunt prædictiones
salutis aut mortis, quod testantur cum quo-
tidianâ experientiâ historiz epidemiorū.

Neque verò venæ sectione sanguinem
 ad centrum (quod putant) reuocamus, ni-
 si plenissima vacuatio instituat, quam
 hic cauemus: Quippe si lacuna microcos-
 mi mare est & centrum, ad brachia verò
 protensæ venæ riuuli ab ea longo tractu
 oriandi, nunquid qui per basilicam in fle-
 xurâ cubiti à lacunâ sanguinem nimium
 æstuantem, qui qua data porta ruit, euo-
 cat & euacuat, ad centrum ab extrema-
 tibus reuocat? Quin potius, ni caecutimus,
 à centro ad extremitates, à partibus inter-

QVÆSTIO MEDICA. 318

nis & nobilibus ad externas & ignobiles.

Age, dùm Galenus in Peripneumonia, sanguinis sputo, secoris, aut lienis phlegmone in lassitudine spontanea, cum in dorso lumbisue pungens dolor adest, basilicam aut mediam secari iubet, ipse ne à peripheria ad partes affectas sanguinem prolicet? an à lacuna euacuans ab illis reuellit? procul dubio reuellit; Adde quòd cùm extremis venis & capillaribus impactus sãguis, multo minus extrauenatus retrocedere possit, vt probatũ est querela 15. nisi fortè plenissima vacuatione, quæ hinc omninò vetatur & per aph. cum bona pra-
Lib. 4. 29
sanit.
tuenda
cap. 10.
meditatione facienda est, quod, venarum in-
visiones ad extremum nullo modo in hoc
morbo ducenda sint, non video cur in va-
liolæ principio venæ sectio damnetur,
quinimò & illis iam apparentibus, si ple-
thora & vrgentia symptomata eam indi-
carint, quoniam, inquit Mesues, maximum
fit auxilium, proprium & necessarium, repeti
potest si repletionis signa perdurent, sic etiam
docente Avicenna lib. 4. tract. 4. cap. 10.
Sanè medici Parisienses expertissimi hodie
sic faciunt, & iam apparentibus etiam for-
licet sanguinem mittunt.

Maximè verd eo remedij genere medi-

eus tutò vititur, quod in eius potestate sit, tantum quantum opus sit vacuare, dum purgantis medicamenti quantumvis benigni, fræna nec teneat, nec ad libitum, sicut in sanguinis vacuatione, moderetur.

At quæres, cur cucurbitulis & hirudinibus eam vacuationem securius non moliris, quæ etiam ad peripheriam sanguinem euocat?

Respondeo & his instrumentis venenatam illam labem tutò sic posse vacuari, si suo tempore talis fiat vacuatio: Quemadmodum enim qui iam in extremis venis & capillaribus abdicatus est succus, hirudinibus & cucurbitulis tutò euacuatur, quæ tamen incoctum & æstuantem à corporis centro, & principibus partibus vacuare non valent, sic venæ sectio in flexu cubiti materiam in venis maioribus fluctuantem & turgentem, antequam in principem partem irruat, & antequam edomita ad peripheriam propellatur, euacuat. Hinc Mercurialis benè distinxisse videtur scribens. *Magnopere utile est sanguinem mittere in variolarum principio, licet et quarto fieri possit, quando incipit ebullitio, ego ferè soleo adhibere cucurbitulas in omnibus, præsertim lumbis, naribus, poplitibus, &*

hoc facio, non solum priusquam appareant, sed etiam postquam apparuerint, quandoquidem hoc maximè confert ad attrahendam materiam ad extremas partes. Rectè, at verò cum tanta fuerit materiæ copia ut non solum totum corporis ambitum fœdare, sed etiam internas & principes phlegmone afficere cum grauissimis & funestissimis symptomatibus possit & infœlicissimis fructibus, idèd tutū imò necessarium ante cucurbitulas è cubiti flexu velocissimè plethoram illam cacochymicam euacuare, quod in phlegmone internas & principes partes affectante præcipit Galenus, sicut & Auicenna & Rhasis & Halliabbas præct. 4. cap. serm. 4. parte 4. Dico ego, inquit, quod cum variola & rubecola apparuerint signa à prima die usque ad tertiam phlebotomiam accelerare oportere, extrahaturque sanguis tantum ut desiciat quantitate.

Dico etiam pueris & iunioribus aliquando venam secari posse, etsi rariùs detur occasio, quoniam ut eorum corpora sanguinis minutione facilè exoluuntur teste Galeno ad Glauco. ita à putrilagine minùs periclitantur propter liberiolem transpirationem. Hinc corpora compacta neruosa,

X 2

& cu-

Mesnes
summa 2.
pars. 1.

sect. 2.

cap. 6.

Albertus

Angl. lib.

7. cap de

var.

Guarnier.

desider. 3.

de peste

cap. 6.

Lib 2. de

dist. acut.

324 QVÆSTIO MEDICA.

& cutis firmæ, omnium maximè cæteris paribus venæ sectione indigent.

Quæritur amplius, an purgatio variolis conueniat,

Ex præcedentibus satis liquet catharticis naturam hic nullo modo irritandam, neque in principio, neque in fine cùm consistunt, quia tunc maximè quiescendum:

Tem. 2.
gra. 7.

Attamen ventrem clisterio elui & primæ regionis colluuiem leniente emundari posse omnes consentiunt, & licet Auenzoar lenientium & mollientium medicamentorum vsum suspectum habeat, ne ab humore feroce vincantur: Auicenna tamen eorum vsum cum omnibus suprà citatis authoribus approbavit; Nempe, vt existimo, cùm in hoc morbo à centro ad peripheriam alexiterijs propulsanda sit materia, eaque omnia vt penetrantia obuia quæque secum rapiant, & colluuiem ad internas & nobiles protrudant partes, vel si non penetrarint ob colluuiem resistetem obstructionem nil efficiant, idèd ea vacuata, venæ sectio tutius peragetur; Lenientium autem vsum, quibus caruit antiquitas, scilicet mannam, cassiam, cum tamrindis & alijs astringentibus permiscet & eorum vsum securum reddunt, & verò

QVÆSTIO MEDICA. 325

verò vomitus etiam leui pharmaco posset etiam moueri, si natura ad id moueri videretur, nam & sponte in hoc morbo sæpè fructuosè contingit.

Insuper quoniam sanguinis missio sæpè necessaria est, & præceptum est eius faciendi occasio quia periculum est ne postea aded tutò fieri possit, satius fuerit medicamentum in posterum diem differre & clistere iniecto venam ilicò secare; & rectè monet Auicenna cùm magnus fuerit iam variolarum prouentus leniētibus nullo modo vtendum, sed Hipp. obaudiendum & omninò quiescendum.

*Auicenna
lib. 4. fecit
1. tract.
4. cap. de
var.
Hipp. aph.
10. S. 40*

*Aph. 2.
lib. 2.*

Hæc sunt quæ veritatis cultoribus nouellis proponenda censui, quæ rationi & experientię si cōsentanea inuenerint, Deo O. M. gratias agant, si verò non fuerint omnia sic demonstrata, meminerint illius Galeni χαλεπὸν ἀνθρώπου εἶναι μὴ διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, & si quis rationi & experientię magis conformia scripserit, ea lubenter amplectemur.

Interim monitos hic velim & Primates & Optimates, magna illa in variolis media in manu medici docti & solertis tutissima & efficacissima esse præsidia: Si verò Agyræ, è thermis, myropolijs &

ton-

326 QVÆSTIÖ MEDICA.

constrinis profluentes medicaſtri ijs vñ
 fuerint, non dubium quin infinitos fa-
 tis obijcient: nam rectè vetat parœmia,
 nec puero nec amenti gladium dederis,
 ſatiùſque eſt tales errori populari infer-
 nire, quam medicorum optima remedia
 infamare.

FINIS.



